

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN SVS WIFI

Evaluación de Extremidad Inferior Amenazada (Herida, Isquemia e Infección del Pie)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

TRES DOMINIOS CLÍNICOS WIFI

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
W - Wound (Herida / Úlcera) Profundidad y extensión de la lesión	☐ 0: Sin úlcera (sólo dolor isquémico en reposo), sin gangrena (0) ☐ 1: Úlcera pequeña y superficial en pie o pierna distal; sin gangrena (1) ☐ 2: Úlcera profunda con tendón, articulación o hueso expuesto; gangrena limitada a dedos (2) ☐ 3: Úlcera profunda extensa que afecta talón/retropié; gangrena extensa (3)	[]
I - Ischemia (Isquemia) Índice Tobillo-Brazo (ITB) o Presión en Dedo (PT)	☐ 0: ITB ≥ 0.80 / Presión Tobillo > 100 mmHg / PT ≥ 60 mmHg (0) ☐ 1: ITB $0.60 - 0.79$ / PTobillo $70-100$ mmHg / PT $40-59$ mmHg (1) ☐ 2: ITB $0.40 - 0.59$ / PTobillo $50-70$ mmHg / PT $30-39$ mmHg (2) ☐ 3: ITB < 0.40 / PTobillo < 50 mmHg / PT < 30 mmHg (3)	[]
fl - foot Infection (Infección) Signos infecciosos, eritema y toxicidad sistémica	☐ 0: Sin infección: Sin purulencia ni manifestaciones inflamatorias (0) ☐ 1: Leve: ≥ 2 signos locales; eritema ≤ 2 cm alrededor de la úlcera (1) ☐ 2: Moderada: Eritema > 2 cm; tejidos profundos afectados; sin SRIS (2) ☐ 3: Severa: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) presente (3)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: W (0-3), I Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):
(0-3), fl (0-3)) _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA**Estadio 1 - Riesgo Muy Bajo (W0-1, I0, fl0)**

Cuidado de heridas, control glucémico, descarga de presión. Revascularización no indicada.

Estadio 2 - Riesgo Bajo (W1-2, I0-1, fl0-1)

Desbridamiento local, antibioticoterapia, valorar estudios vasculares no invasivos.

Estadio 3 - Riesgo Moderado (W2-3, I1-2, fl1-2)

Interconsulta a cirugía vascular para revascularización, antibióticos IV, desbridamiento urgente.

Estadio 4 - Riesgo Alto (Isquemia Severa I3 / fl3 / W3)

Riesgo alto de pérdida mayor de extremidad. Revascularización urgente y desbridamiento quirúrgico.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación