

ESCALA CRIES DE DOLOR NEONATAL

Evaluación del Dolor Postoperatorio en Neonatos (≥ 32 Semanas)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

Nº HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CINCO INDICADORES CONDUCTUALES Y FISIOLÓGICOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
C - Crying (Llanto) Tono vocal y llanto	☐ Sin llanto / Llanto normal no doloroso (0) ☐ Llanto agudo, consolable (1) ☐ Llanto continuo e inconsolable (2)	[]
R - Requires O2 (Requiere Oxígeno) Oxigenación para mantener SpO2 > 95%	☐ No requiere O2 suplementario (SpO2 > 95% con aire) (0) ☐ Requiere < 30% de FiO2 para mantener SpO2 > 95% (1) ☐ Requiere ≥ 30% de FiO2 para mantener SpO2 > 95% (2)	[]
I - Increased Vital Signs (Constantes) Incremento de frecuencia cardíaca y presión arterial	☐ FC y PA iguales o menores que el basal preop (0) ☐ FC o PA incrementadas en ≤ 20% respecto al basal (1) ☐ FC o PA incrementadas en > 20% respecto al basal (2)	[]
E - Expression (Expresión Facial) Mueca facial y tensión	☐ Expresión relajada / neutra (0) ☐ Mueca presente (ceño fruncido, ojos apretados) (1) ☐ Mueca con quejido no intencionado (2)	[]
S - Sleeplessness (Sueño) Patrón de sueño-vigilia en la última hora	☐ Continuamente dormido / despierta normalmente (0) ☐ Se despierta a intervalos frecuentes (1) ☐ Constantemente despierto, inquieto (2)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 10) **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Sin Dolor Significativo (0 - 3 puntos)

Neonato confortable. Medidas no farmacológicas de confort (arropamiento, chupete, sacarosa).

Dolor Moderado a Severo (≥ 4 puntos)

Analgesia farmacológica indicada (paracetamol / bolus de opioide IV) más medidas de confort.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación