

# ESCALA FLACC DE DOLOR CONDUCTUAL

Evaluación del Dolor en Lactantes, Niños Pequeños y Pacientes No Verbales

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: \_\_\_\_\_

Edad / Fecha Nac: \_\_\_\_\_

N° HC / ID: \_\_\_\_\_

Unidad / Servicio / Cama: \_\_\_\_\_

Cirugía / Diagnóstico: \_\_\_\_\_

Fecha / Hora: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## CINCO CATEGORÍAS CONDUCTUALES

| Criterio / Parámetro                                                        | Opciones y Criterios de Puntuación                                                                                                                                                                                                                     | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>F - Cara (Face)</b><br>Expresión facial y mueca                          | <input type="checkbox"/> Sin expresión particular o sonrisa (0)<br><input type="checkbox"/> Mueca o ceño fruncido ocasional, retraído, desinteresado (1)<br><input type="checkbox"/> Barbilla temblorosa frecuente o constante, mandíbula apretada (2) | [   ]  |
| <b>L - Piernas (Legs)</b><br>Tensión muscular en miembros inferiores        | <input type="checkbox"/> Posición normal o relajada (0)<br><input type="checkbox"/> Inquieto, molesto, tenso (1)<br><input type="checkbox"/> Pataleando o piernas encogidas (2)                                                                        | [   ]  |
| <b>A - Actividad (Activity)</b><br>Movimiento corporal y posición           | <input type="checkbox"/> Acostado tranquilamente, posición normal, se mueve fácilmente (0)<br><input type="checkbox"/> Retorciéndose, moviéndose adelante y atrás, tenso (1)<br><input type="checkbox"/> Arqueado, rígido o con sacudidas (2)          | [   ]  |
| <b>C - Llanto (Cry)</b><br>Quejas vocales y llanto                          | <input type="checkbox"/> Sin llanto (despierto o dormido) (0)<br><input type="checkbox"/> Gemidos o sollozos; queja ocasional (1)<br><input type="checkbox"/> Llanto constante, gritos o sollozos, quejas frecuentes (2)                               | [   ]  |
| <b>C - Consolabilidad (Consolability)</b><br>Respuesta a medidas de confort | <input type="checkbox"/> Contento, relajado (0)<br><input type="checkbox"/> Tranquilizado con contacto ocasional, abrazos, hablándole (1)<br><input type="checkbox"/> Difícil de consolar o confortar (2)                                              | [   ]  |

PUNTUACIÓN TOTAL: [   ] PUNTOS (Máximo: 10 puntos (0 a 10))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): \_\_\_\_\_

## ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

**Relajado / Confortable (0 puntos)**

Sin evidencia de dolor. Mantener medidas habituales de confort pediátrico.

**Malestar Leve (1 - 3 puntos)**

Consuelo no farmacológico (distracción, arropamiento, presencia de padres).

**Dolor Moderado (4 - 6 puntos)**

Analgesia leve (paracetamol / ibuprofeno) más intervenciones de confort.

**Dolor Severo / Malestar (7 - 10 puntos)**

Intervención analgésica urgente (opioide IV / aviso a médico). Reevaluar en 15-30m.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación