

ESCALA DE DOLOR LANSS

Evaluación de Síntomas y Signos de Dolor Neuropático

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

A. CUESTIONARIO DE DOLOR (REPORTE DEL PACIENTE)

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Sensación de Punsadas / Hormigueo Punzadas o agujas en la zona dolorosa	☐ No (0) ☐ Sí (5)	[]
2. Cambio de Coloración de la Piel La piel luce moteada, enrojecida o rosada	☐ No (0) ☐ Sí (5)	[]
3. Sensibilidad Térmica Alterada La piel se siente anormalmente caliente o fría	☐ No (0) ☐ Sí (3)	[]
4. Crisis Ráfagas de Dolor Descargas eléctricas o punzadas bruscas	☐ No (0) ☐ Sí (2)	[]
5. Sensación de Quemazón / Ardor La piel siente como si estuviera ardiendo	☐ No (0) ☐ Sí (1)	[]

B. EXAMEN FÍSICO A LA CABECERA

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
6. Alodinia (Pincelado con Algodón) El roce suave con algodón provoca dolor	☐ No: Sensación normal (0) ☐ Sí: Alodinia presente (5)	[]
7. Umbral de Pinchazo Alterado Pinchazo con aguja 23G en zona dolorosa vs sana	☐ No: Sensación simétrica (0) ☐ Sí: Umbral alterado / hiperalgesia (3)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 24 puntos
(Neuropático si ≥ 12))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Dolor Nociceptivo Probable (< 12 puntos)

Mecanismos neuropáticos poco probables. Analgesia nociceptiva estándar (AINEs, paracetamol).

Dolor Neuropático Probable (≥ 12 puntos)

Mecanismos neuropáticos contribuyentes. Indicados gabapentinoides (pregabalina/gabapentina), ISRN, tricíclicos.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación