

ESCALA SOFA (SEQUENTIAL ORGAN FAILURE ASSESSMENT)

Evaluación Secuencial del Fallo Orgánico y Riesgo de Mortalidad en UCI

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CRITERIOS DE FALLO DE SEIS SISTEMAS ORGÁNICOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Respiratorio PaO ₂ / FiO ₂ mmHg y soporte ventilatorio	☐ PaO ₂ / FiO ₂ ≥ 400 mmHg (0) (0) ☐ PaO ₂ / FiO ₂ < 400 mmHg (1) (1) ☐ PaO ₂ / FiO ₂ < 300 mmHg (2) (2) ☐ PaO ₂ / FiO ₂ < 200 mmHg con ventilación invasiva (3) (3) ☐ PaO ₂ / FiO ₂ < 100 mmHg con ventilación invasiva (4) (4)	[]
2. Coagulación Recuento de plaquetas (x10 ³ /μL)	☐ Plaquetas ≥ 150 x10 ³ /μL (0) (0) ☐ Plaquetas < 150 x10 ³ /μL (1) (1) ☐ Plaquetas < 100 x10 ³ /μL (2) (2) ☐ Plaquetas < 50 x10 ³ /μL (3) (3) ☐ Plaquetas < 20 x10 ³ /μL (4) (4)	[]
3. Hepático Bilirrubina total sérica (mg/dL)	☐ Bilirrubina < 1.2 mg/dL (0) (0) ☐ Bilirrubina 1.2 - 1.9 mg/dL (1) (1) ☐ Bilirrubina 2.0 - 5.9 mg/dL (2) (2) ☐ Bilirrubina 6.0 - 11.9 mg/dL (3) (3) ☐ Bilirrubina ≥ 12.0 mg/dL (4) (4)	[]
4. Cardiovascular Presión Arterial Media y Dosis Vasopresoras (mcg/kg/min)	☐ PAM ≥ 70 mmHg (0) (0) ☐ PAM < 70 mmHg (1) (1) ☐ Dopamina ≤ 5 o Dobutamina cualquier dosis (2) (2) ☐ Dopamina > 5 o Noradrenalina ≤ 0.1 (3) (3) ☐ Dopamina > 15 o Noradrenalina > 0.1 (4) (4)	[]
5. Sistema Nervioso Central Escala de Coma de Glasgow (GCS)	☐ GCS = 15 (0) (0) ☐ GCS = 13 - 14 (1) (1) ☐ GCS = 10 - 12 (2) (2) ☐ GCS = 6 - 9 (3) (3) ☐ GCS < 6 (4) (4)	[]
6. Renal Creatinina sérica (mg/dL) o Diuresis (mL/día)	☐ Creatinina < 1.2 mg/dL (0) (0) ☐ Creatinina 1.2 - 1.9 mg/dL (1) (1) ☐ Creatinina 2.0 - 3.4 mg/dL (2) (2) ☐ Creatinina 3.5 - 4.9 mg/dL o Diuresis < 500 mL/d (3) (3) ☐ Creatinina ≥ 5.0 mg/dL o Diuresis < 200 mL/d (4) (4)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 24 puntos (0 a 24))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Disfunción Baja (0 - 6 puntos)

Mortalidad < 10%. Monitorización continua de constantes e indicadores metabólicos.

Fallo Moderado (7 - 9 puntos)

Mortalidad 15 - 20%. Soporte de órganos afectados, optimización de perfusión.

Fallo Multiorgánico Severo (10 - 12 puntos)

Mortalidad 40 - 50%. Terapia de reemplazo renal, ventilación, inotrópicos.

Crítico / Refractario (> 12 puntos)

Mortalidad > 80%. Soporte multivasopresor, reanimación intensiva crítica.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación