

Formulário de Avaliação Wifi

Wound (Ferida) • Ischemia (Isquemia) • foot Infection (Infecção do Pé) | Risco de Amputação e Revascularização

NOME DO PACIENTE:

PRONTUÁRIO / ID:

DATA DA
AVALIAÇÃO:

AVALIADOR (MÉDICO / ENFERMEIRO VASCULAR):

LEITO / UNIDADE:

ETAPA 1 — GRADUAÇÃO CLÍNICA WIFI

1. W — Wound (Ferida / Úlcera / Gangrena)

SEL.	GRAU	DESCRIÇÃO CLÍNICA
☐	Grau 0	Sem úlcera, sem gangrena (pé at Risk sem lesão aberta).
☐	Grau 1	Úlcera pequena/superficial distal, sem exposição óssea. Gangrena limitada à falange distal.
☐	Grau 2	Úlcera profunda com exposição óssea, articular ou tendão. Gangrena limitada aos artelhos.
☐	Grau 3	Úlcera extensa e profunda de antepé/mediopé. Gangrena extensa de antepé e/ou mediopé.

2. I — Ischemia (Isquemia por Perfusão)

SEL.	GRAU	PARÂMETROS HEMODINÂMICOS (ITB, PA TORNOZELO, PRESSÃO HÁLUX / TCPO ₂)
☐	Grau 0	ITB $\geq 0,80$; Pressão Tornozelo > 100 mmHg; Pressão Hálux / TcPO ₂ ≥ 60 mmHg.
☐	Grau 1	ITB 0,60–0,79; Pressão Tornozelo 70–100 mmHg; Pressão Hálux / TcPO ₂ 40–59 mmHg.
☐	Grau 2	ITB 0,40–0,59; Pressão Tornozelo 50–70 mmHg; Pressão Hálux / TcPO ₂ 30–39 mmHg.
☐	Grau 3	ITB $\leq 0,39$; Pressão Tornozelo < 50 mmHg; Pressão Hálux / TcPO ₂ < 30 mmHg.

3. fl — foot Infection (Infecção do Pé)

SEL.	GRAU	DESCRIÇÃO CLÍNICA (EXTENSÃO E RESPOSTA SISTÊMICA / SIRS)
☐	Grau 0	Sem sinais ou sintomas de infecção ativa.
☐	Grau 1	Infecção local envolvendo apenas pele/subcutâneo. Celulite < 2 cm. Sem SIRS.
☐	Grau 2	Infecção profunda (músculo, osso, articulação). Celulite > 2 cm. Abscesso/osteomielite/fasciíte. Sem SIRS.
☐	Grau 3	Infecção com sinais de SIRS (≥ 2 critérios: T $> 38^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$; FC > 90 ; FR > 20 ; Leucocitos $> 12\text{k}$ ou $< 4\text{k}$).

ETAPA 2 E 3 — MATRIZES DE RISCO E INTERPRETAÇÃO

Risco de Amputação Maior em 1 Ano

W \ I	I0	I1	I2	I3
W0	VL	VL	L	M
W1	VL	L	M	H
W2	L	M	H	H
W3	M	H	H	H

Legenda: VL=Muito Baixo, L=Baixo, M=Moderado, H=Alto

Necessidade de Revascularização

W \ I	I0	I1	I2	I3
W0	VL	VL	L	M
W1	VL	L	M	H
W2	L	M	H	H
W3	M	H	H	H

Nota: A infecção deve ser controlada previamente à cirurgia.

ESCORE WIFI CALCULADO / REGISTRADO

W[] I[] fI[]

Card de Interpretação e Conduta Clínica:

- **Risco de Amputação:** () Muito Baixo () Baixo () Moderado () Alto
- **Necessidade de Revascularização:** () Muito Baixo () Baixo () Moderado () Alto
- **Orientações Clínicas:** Escore utilizado para estratificação de risco em membros inferiores ameaçados (pé diabético / doença arterial periférica). Casos com escores Moderados (M) ou Altos (H) requerem avaliação imediata por cirurgia vascular e controle rigoroso de infecção e glicemia.

Referência Científica: MILLS, J. L. et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: Risk stratification based on Wound, Ischemia, and foot Infection (Wifl). *Journal of Vascular Surgery*, v. 59, n. 1, p. 220-234.e2, 2014. DOI: 10.1016/j.jvs.2013.08.003.

Calculadoras de Enfermagem — Plataforma de Apoio à Decisão Clínica.