

ESCALA QUICK SOFA (QSOFA)

Cribado Rápido a la Cabecera de Sepsis fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

TRES CRITERIOS CLÍNICOS A LA CABECERA

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Frecuencia Respiratoria (Taquipnea) Auscultar u observar respiraciones por minuto	☐ Normal: Frecuencia respiratoria < 22 respiraciones/minuto (0) ☐ Alterado: Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones/minuto (1)	[]
2. Estado Mental Alterado (SNC) Evaluación del estado de conciencia según Escala de Glasgow	☐ Normal: Escala de Coma de Glasgow = 15 (Alerta, totalmente orientado) (0) ☐ Alterado: Escala de Coma de Glasgow < 15 (Confusión agudo, somnolencia, letargia) (1)	[]
3. Presión Arterial Sistólica (Hipotensión) Medición por manguito estándar o vía arterial	☐ Normal: Presión Arterial Sistólica > 100 mmHg (0) ☐ Alterado: Presión Arterial Sistólica ≤ 100 mmHg (1)	[]

Bundle de Reanimación de la 1ª Hora de la Campaña Sobrevivir a la Sepsis:

1. Medir lactato sérico de inmediato (revalorar en 2-4 horas si lactato inicial > 2 mmol/L).
2. Extraer hemocultivos antes de iniciar antibióticos (sin retrasar la terapia antimicrobiana).
3. Administrar antimicrobianos IV de amplio espectro en la 1ª hora.
4. Iniciar infusión rápida de cristaloides IV 30 mL/kg en caso de hipotensión (PAM < 65 mmHg) o lactato ≥ 4 mmol/L.
5. Iniciar vasopresores (noradrenalina 1ª elección) durante o tras la reanimación con fluidos para PAM ≥ 65 mmHg.

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 3 puntos
(Alto riesgo si ≥ 2))**Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____**ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA****Riesgo Bajo de Sepsis (0 - 1 punto)**

Mortalidad intrahospitalaria < 1%. Continuar tratamiento enfocado del foco infeccioso.

Riesgo Alto de Sepsis / Crítico (≥ 2 puntos)

Mortalidad 3 a 14 veces mayor. Bundle de sepsis inmediato: hemocultivos, antibióticos IV, cristaloides 30 mL/kg, lactato y valoración por UCI.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación