

ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY

Evaluación del Nivel de Sedación y Respuesta en Cuidados Críticos

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

Nº HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

SEIS NIVELES CLÍNICOS DE SEDACIÓN

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
Nivel 1 (Ansioso/a / Agitado/a) Sedación insuficiente	☐ Paciente ansioso/a, agitado/a, inquieto/a o ambos (1)	[]
Nivel 2 (Cooperador/a / Tranquilo/a) Sedación objetivo	☐ Paciente cooperador/a, orientado/a y tranquilo/a (2)	[]
Nivel 3 (Responde sólo a Órdenes) Sedación leve	☐ Paciente responde únicamente a órdenes verbales (3)	[]
Nivel 4 (Respuesta Energica a Estímulos) Sedación moderada	☐ Respuesta enérgica al toque glabellar ligero o estímulo auditivo fuerte (4)	[]
Nivel 5 (Respuesta Torpe / Perezosa) Sedación profunda	☐ Respuesta torpe/perezosa al toque glabellar ligero o estímulo auditivo fuerte (5)	[]
Nivel 6 (Sin Respuesta) Sobresedación / Coma	☐ Sin respuesta al toque glabellar ni a estímulos auditivos fuertes (6)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 6 niveles Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a Nº): _____
(Niveles 1 a 6))

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Subsedado/a (Nivel 1)

Riesgo de extubación no planificada, agitación. Optimizar analgesia/sedación.

Sedación Óptima (Niveles 2 - 3)

Objetivo ideal para pacientes despiertos, ventilados o no intubados. Tranquilo.

Sedación Moderada (Nivel 4)

Aceptable durante sincronización aguda con ventilación mecánica.

Sedación Profunda (Niveles 5 - 6)

Riesgo de ventilación prolongada y debilidad de UCI. Planear ventana de despertar diaria.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a Nº)

Fecha y Hora de Evaluación