

ÍNDICE DE APGAR

Avaliação da Vitalidade e Adaptação Neonatal na Sala de Parto (1º, 5º e 10º minuto de vida)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
RN de:		Sexo / Peso:	[] M [] F • _____ g
Tipo Parto:	[] Normal [] Cesárea	Data/Hora:	____/____/____ às ____:____

2. PARÂMETROS CLÍNICOS DO ÍNDICE DE APGAR

Sinal Clínico	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	1º min	5º min
Frequência Cardíaca Ausculta pulso apical	☐ Ausente (0)	☐ < 100 batimentos/min (1)	☐ ≥ 100 batimentos/min (2)	[]	[]
Esforço Respiratório Ventilação espontânea	☐ Ausente / Apneia (0)	☐ Lento, irregular, fraco (1)	☐ Bom, choro vigoroso (2)	[]	[]
Tônus Muscular Atividade e flexão	☐ Flácido, hipotônico (0)	☐ Alguma flexão de membros (1)	☐ Movimento ativo, boa flexão (2)	[]	[]
Irritabilidade Reflexa Resposta ao estímulo	☐ Sem resposta (0)	☐ Algum movimento / caretas (1)	☐ Tosse, espirro, choro ativo (2)	[]	[]
Cor da Pele Perfusão periférica	☐ Cianose central ou palidez (0)	☐ Corpo rosado, acrocianose (1)	☐ Completamente rosado (2)	[]	[]

ESCORES DE APGAR: 1º MINUTO: [] / 10 • 5º MINUTO: [] / 10 • 10º MINUTO: []

3. INTERPRETAÇÃO DO GRAU DE VITALIDADE E CONDUTA NEONATAL

8 a 10 PONTOS (BOA VITALIDADE) Recém-nascido vigoroso, sem asfixia perinatal. Cuidados rotineiros da sala de parto, contato pele a pele e aleitamento na primeira hora.	4 a 7 PONTOS (ASFIXIA LEVE A MODERADA) Necessidade de passos iniciais de assistência imediata: aquecer, secar, posicionar vias aéreas, aspirar se necessário e O ₂ /estímulo.	0 a 3 PONTOS (ASFIXIA GRAVE) Emergência neonatal absoluta. Iniciar imediatamente passos de reanimação cardiopulmonar (VPP c/ máscara e oxigênio conforme diretrizes SBP).
---	--	---

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data