

ESCALA NUMÉRICA DE DOR (END / EVA)

Avaliação da Intensidade, Padrão Semiológico e Manejo Terapêutico da Dor (5º Sinal Vital)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. 1. RÉGUA NUMÉRICA E CARACTERIZAÇÃO DA QUEIXA DOLOROSA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEM DOR (0)		DOR LEVE (1 a 3)			DOR MODERADA (4 a 6)			DOR INTENSA (7 a 10)		

Localização da Dor:			
Qualidade / Tipo:	☐ Queimação • ☐ Pontada / Agulhada • ☐ Aperto / Compressão • ☐ Pulsátil • ☐ Cólica • ☐ Em peso		
Início e Duração:	☐ Aguda (<3 meses) • ☐ Crônica (>3 meses)	Frequência:	☐ Contínua • ☐ Intermitente / Em crises
Fatores de Melhora:	☐ Repouso • ☐ Analgésico • ☐ Gelo/Calor	Fatores de Piora:	☐ Movimentação • ☐ Palpação • ☐ Esforço
Conduta Analgésica:	Medicação / Dose: _____ Horário: ____:____ • Reavaliação em: ____ min		

INTENSIDADE DA DOR REGISTRADA: [] / 10

3. DIRETRIZES TERAPÊUTICAS CONFORME A INTENSIDADE DA DOR

0: SEM DOR	1 a 3: DOR LEVE	4 a 6: DOR MODERADA	7 a 10: DOR INTENSA
Paciente calmo e confortável. Vigilância contínua durante a checagem rotineira dos sinais vitais.	Analgésicos não opioides (dipirona, paracetamol) e medidas não farmacológicas de conforto físico.	Associação de anti-inflamatórios ou opioides fracos (tramadol/codeína); reavaliação seriada em 60 min.	Opioides fortes prescritos (morfina/fentanil); notificação médica imediata e monitorização estrita.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data