

ESCORE PEWS (PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE)

Identificação Precoce de Deterioração Clínica em Pacientes Pediátricos Hospitalizados

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	__/__/__ às __:__

2. PARÂMETROS DE ALERTA PRECOCE PEDIÁTRICO (BRIGHTON PEWS)

Domínio	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Comportamento / Neurológico	☐ Brincando / Adequado	☐ Sonolento / Consolável	☐ Irritável / Dificil consolo	☐ Letárgico / Redução resposta à dor
Cardiovascular (Cor e Perfusão)	☐ Rosado / TEC 1-2s	☐ Pálido / TEC 3s	☐ Moteado / TEC 4s / Taquicardia +20	☐ Cinzento / TEC ≥5s / Bradicardia
Respiratório (Esforço e FR)	☐ FR normal / Sem tiragem	☐ FR +10 acima / Tiragem leve	☐ FR +20 acima / FiO ₂ > 30%	☐ FR +30 acima ou bradipneia / FiO ₂ ≥ 40%

Critérios Adicionais (+2 Pontos): ☐ Nebulização contínua de resgate (+2) ☐ Vômitos pós-operatórios incoercíveis (+2)

ESCORE TOTAL PEWS (0 a 11): [] PONTOS

3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CLÍNICO E PROTOCOLO DE ACIONAMENTO

0 a 2 PONTOS (VERDE)

Baixo Risco: Conduta de rotina. Monitorização habitual de sinais vitais a cada 4 a 6 horas.

3 a 4 PONTOS (AMARELO)

Risco Moderado: Notificar enfermeiro responsável e médico assistente. Reavaliação seriada a cada 1-2h.

≥ 5 PONTOS (VERMELHO)

Alto Risco / Emergência: Acionar imediatamente o Time de Resposta Rápida (TRR) ou médico intensivista.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data