

## ESCALA DE SEDAÇÃO DE RAMSAY

Monitorização do Nível de Sedação e Agitação em Terapia Intensiva e Procedimentos

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

|             |  |            |                      |
|-------------|--|------------|----------------------|
| Nome:       |  | Idade:     |                      |
| Prontuário: |  | Leito:     |                      |
| Setor:      |  | Data/Hora: | __/__/__ às<br>__:__ |

## 2. NÍVEIS CLÍNICOS DE SEDAÇÃO DE RAMSAY (MARCAR O NÍVEL CORRESPONDENTE)

| Nível   | Descrição do Comportamento e Resposta a Estímulos                                        | Classificação            | Seleção                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nível 1 | Paciente ansioso, agitado, inquieto, combativo ou que luta contra o ventilador mecânico. | Sedação Insuficiente     | <input type="checkbox"/> |
| Nível 2 | Paciente cooperativo, orientado, tranquilo e calmo; aceita ventilação sem esforço.       | Sedação Ideal / Alvo     | <input type="checkbox"/> |
| Nível 3 | Paciente sonolento, responde prontamente a comandos verbais simples.                     | Sedação Leve             | <input type="checkbox"/> |
| Nível 4 | Paciente dormindo, apresenta resposta rápida e viva a leve estímulo tátil ou sonoro.     | Sedação Moderada         | <input type="checkbox"/> |
| Nível 5 | Paciente dormindo, apresenta resposta lenta e arrastada a estímulo tátil ou doloroso.    | Sedação Muito Profunda   | <input type="checkbox"/> |
| Nível 6 | Paciente dormindo, não apresenta qualquer resposta a estímulos físicos ou sonoros.       | Sedação Excessiva / Coma | <input type="checkbox"/> |

NÍVEL DE SEDAÇÃO ATRIBUÍDO: [ Nível ] (1 a 6)

## 3. DIRETRIZES CLÍNICAS E TITULAÇÃO DE SEDATIVOS NA UTI

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÍVEIS 2 e 3 (FAIXA ALVO IDEAL)</b><br>Paciente calmo, colaborativo e sincrônico com a ventilação; viabiliza cuidados de enfermagem e desmame ventilatório seguro. | <b>NÍVEL 1 (SUB-SEDAÇÃO)</b><br>Sedação insuficiente ou dor não controlada. Investigar causas reversíveis (hipóxia, retenção urinária) antes de aumentar sedativos. | <b>NÍVEIS 4 a 6 (SUPER-SEDAÇÃO)</b><br>Sedação excessiva. Aumenta risco de PAV, delirium e tempo de UTI. Realizar protocolo de despertar diário da sedação. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data