

BOLETIM DE SILVERMAN-ANDERSEN

Avaliação da Gravidade do Desconforto Respiratório no Recém-Nascido (SDRN)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
RN de:		Sexo / Peso:	[] M [] F • _____ g
Idade / Horas:		Data/Hora:	____/____/____ às ____:____

2. 5 PARÂMETROS CLÍNICOS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO NEONATAL

Sinal Clínico Avaliado	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	Pts
1. Movimentos Toracoabdominais	☐ Síncronos (tórax e abdome sobem juntos)	☐ Atraso na inspiração torácica	☐ Respiração em gangorra (paradoxal)	[]
2. Tiragem Intercostal	☐ Ausente	☐ Discreta (apenas visível)	☐ Acentuada (afundamento nítido)	[]
3. Retração Xifoide	☐ Ausente	☐ Discreta	☐ Acentuada	[]
4. Batimento de Asas Nasais	☐ Ausente	☐ Discreto	☐ Intenso / Acentuado	[]
5. Gemido Expiratório	☐ Ausente	☐ Audível com estetoscópio	☐ Audível a distância sem esteto	[]

ESCORE TOTAL SILVERMAN-ANDERSEN (0 a 10): []

3. CLASSIFICAÇÃO DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO E CONDUTA

0 PONTOS (SEM DESCONFORTO) Padrão respiratório fisiológico normal. Manter observação e estímulo ao aleitamento materno.	1 a 3 PONTOS (DESCONFORTO LEVE) Oxigenoterapia inalatória se SpO ₂ reduzida, desobstrução das narinas e monitorização seriada.	4 a 6 PONTOS (MODERADO) Indicação frequente de suporte ventilatório não invasivo (CPAP nasal) em UTI neonatal.	≥ 7 PONTOS (GRAVE / EXAUSTÃO) Insuficiência respiratória aguda grave. Preparar intubação orotraqueal e ventilação mecânica.
---	---	--	---

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data