

ESCALA DE WATERLOW

Avaliação Multifatorial do Risco de Desenvolvimento de Lesões por Pressão

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. CATEGORIAS CUMULATIVAS DE RISCO (MARCAR TODOS OS FATORES PRESENTES)

1. Constituição / IMC ☐ Médio (0) • ☐ Acima média (1) • ☐ Obeso (2) • ☐ Abaixo média (3)	6. Apetite e Nutrição ☐ Médio (0) • ☐ Pobre (1) • ☐ SNG / NPT (2) • ☐ Anorexia / Jejum (3)
2. Tipo de Pele / Áreas de Risco ☐ Saudável (0) • ☐ Fina/Papel (1) • ☐ Ressecada (1) • ☐ Edemaciada (1) • ☐ Fria/úmida (1) • ☐ Descolorida (2) • ☐ Lesão presente (3)	7. Cirurgia ou Trauma Recente ☐ Cirurgia ortopédica/lombar (>2h) (5) • ☐ Cirurgia na mesa >2h (5)
3. Sexo e Idade ☐ Masc (1) • ☐ Fem (2) • ☐ 14-49a (1) • ☐ 50-64a (2) • ☐ 65-74a (3) • ☐ 75-80a (4) • ☐ >80a (5)	8. Medicações de Alto Risco ☐ Citotóxicos (4) • ☐ Corticoides alta dose (4) • ☐ Anti-inflamatórios (4)
4. Continência de Esfíncteres ☐ Continente (0) • ☐ Incontinência ocasional (1) • ☐ Cateterizado (2) • ☐ Incontinência dupla (3)	9. Déficit Neurológico ☐ Diabetes / Neuropatia (4) • ☐ AVC / Paraplegia (4 a 6)
5. Mobilidade Geral ☐ Plena (0) • ☐ Inquieta (1) • ☐ Apático (2) • ☐ Restrito (3) • ☐ Confinado à cama (4) • ☐ Imóvel (5)	10. Doença Vascular / Falência ☐ DAOP / Isquemia (5) • ☐ Anemia grave Hb<8 (2) • ☐ Fumo (1)

ESCORE TOTAL DE WATERLOW: [] PONTOS

3. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA LESÃO POR PRESSÃO

10 a 14 PONTOS (EM RISCO) Colchão redutor de pressão, hidratação cutânea diária, controle de umidade e inspeção regular no banho.	15 a 19 PONTOS (ALTO RISCO) Mudança de decúbito a cada 2h rigorosa, proteção de proeminências ósseas e suplementação nutricional.	≥ 20 PONTOS (MUITO ALTO RISCO) Colchão de ar alternado dinâmico, coberturas profiláticas em sacro/calcâneos e vigilância estrita por turno.
---	---	---

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data