



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

007. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Cangalha, Minas Gerais. Aqui estou há um mês. Em paz. Fugi da barafunda que se chama São Paulo. Cidade que foi meu sonho, onde fiz carreira. Cidade enrascada, encrenca, desordem, banzé. Total alvoroço provocado pelas construtoras que armaram um cerco ao redor de meu apartamento em Pinheiros. Só do meu? Apontem um só canto, recanto, esquina, vão, desvão, beco, região em que não haja tal rebuliço.

Estamos vivendo a época do vale-tudo. Caminhões de concreto, de material de construção, cimento, areia, ferro, a todo momento, betoneiras, caçambas sendo atiradas ao chão na madrugada, o asfalto sendo corroído, buracos por toda parte, águas de mananciais subterrâneos liberadas e correndo ao longo do meio-fio. Lixo.

O espantoso é que, com toda a tecnologia de construção que a gente vê pelo mundo inteiro, ainda existam bate-estacas dinossáuricos a nos alucinar o dia inteiro. Nunca se falou tanto em teletrabalho. Mas como manter teletrabalho com a insensatez das construções que, a cada momento, surgem repentinamente ao nosso redor?

Como se vivêssemos em um conto de fadas e uma varinha mágica batesse no solo e dissesse: erga-se, arranha-céu. E ele subisse, geração espontânea, e não há nada para se fazer. Eu estou nesta cidade, que amo – mas já não sei mais o motivo –, desde 1957. Plano Diretor arrasado, mudado constantemente, ao interesse de quem?

Cidade suja, sem um governo que saiba o que fazer. Ou sabe, nós é que não sabemos por que não fazem. Um mundo de amigos meus deixou a cidade. Outros planejam fazê-lo. Há uma camada de elite que tem dinheiro e vai para Miami. Outros foram devastar Portugal, comprar prédios, desalojar gente que neles vivia há décadas e não tem para onde ir.

O que importa? São espertos, mas não humanos. Aqui em Cangalha, tento recuperar a paz, a calma, a segurança que não estou mais sentindo na cidade que vim para conquistar. E conquistei, fiz minha vida, e não é uma vida ruim. Mas estão destruindo sonhos e projetos de vida, não somente meus, mas de milhares. E estamos em silêncio. Isso me angustia. Mas não sei o que fazer, como fazer, se há o que fazer. Batemos no iceberg. E agora?

(Ignácio de Loyola Brandão. Disponível em:
<https://www.estadao.com.br/cultura/ignacio-de-loyola-brandao/batemos-no-iceberg/> 27.08.2024. Adaptado)

01. O autor se dirige diretamente ao leitor no trecho transcrito em:

- (A) Total alvoroço provocado pelas construtoras que armaram um cerco ao redor de meu apartamento em Pinheiros. (1º parágrafo)
- (B) Apontem um só canto, recanto, esquina, vão, desvão, beco, região em que não haja tal rebuliço. (1º parágrafo)
- (C) Caminhões de concreto, de material de construção, cimento, areia, ferro, a todo momento, betoneiras, caçambas sendo atiradas ao chão na madrugada... (2º parágrafo)
- (D) Como se vivêssemos em um conto de fadas e uma varinha mágica batesse no solo e dissesse: erga-se, arranha-céu. (4º parágrafo)
- (E) Outros foram devastar Portugal, comprar prédios, desalojar gente que neles vivia há décadas e não tem para onde ir. (5º parágrafo)

02. Assinale a alternativa em que se observa emprego de vocábulo em sentido figurado.

- (A) ... águas de mananciais subterrâneos liberadas e correndo ao longo do meio-fio. (2º parágrafo)
- (B) Eu estou nesta cidade, que amo – mas já não sei mais o motivo –, desde 1957. (4º parágrafo)
- (C) Ou sabe, nós é que não sabemos por que não fazem. (5º parágrafo)
- (D) Um mundo de amigos meus deixou a cidade. (5º parágrafo)
- (E) Aqui em Cangalha, tento recuperar a paz... (6º parágrafo)

03. No trecho do 4º parágrafo – ... e uma varinha mágica batesse no solo e dissesse: erga-se, arranha-céu –, os dois-pontos e a vírgula foram empregados, respectivamente, para

- (A) anunciar uma explicação e isolar um aposto.
- (B) introduzir uma citação e isolar uma expressão explicativa.
- (C) introduzir uma fala e isolar um vocativo.
- (D) iniciar um diálogo e isolar um advérbio de lugar.
- (E) introduzir uma explicação e isolar uma expressão temporal.

04. Considere os seguintes trechos.

- ... caçambas sendo atiradas ao chão na madrugada, o asfalto sendo corroído, buracos **por toda parte**... (2º parágrafo)
- O espantoso é que, com toda a tecnologia de construção que a gente vê pelo mundo inteiro, **ainda** existam bate-estacas dinossáuricos... (3º parágrafo)
- Mas como manter teletrabalho com a insensatez das construções que, a cada momento, surgem **repentinamente** ao nosso redor? (3º parágrafo)

As expressões destacadas apresentam, correta e respectivamente, circunstâncias de:

- (A) lugar; tempo; modo.
- (B) intensidade; modo; modo.
- (C) modo; afirmação; modo.
- (D) intensidade; modo; tempo.
- (E) lugar; tempo; intensidade.

05. No trecho do 3º parágrafo – ... a insensatez das construções que, a **cada** momento, surgem... – , o vocábulo destacado pertence à mesma classe de palavras daquele destacado em:

- (A) Cidade que foi **meu** sonho, onde fiz carreira. (1º parágrafo)
- (B) **Nunca** se falou tanto em teletrabalho. (3º parágrafo)
- (C) ... e não há nada **para** se fazer. (4º parágrafo)
- (D) Plano Diretor **arrasado**, mudado constantemente... (4º parágrafo)
- (E) São espertos, **mas** não humanos. (6º parágrafo)

06. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de regência verbal.

- (A) Há empreendimentos imobiliários que não respeitam à normas de zoneamento urbano.
- (B) Os paulistanos observam a uma verdadeira profusão de novos edifícios na cidade.
- (C) É natural que os moradores desejem a uma cidade com tranquilidade e silêncio.
- (D) Muitos paulistanos nem se lembram mais pelo tempo em que seus bairros eram tranquilos.
- (E) Muitos paulistanos aspiram a uma cidade com menos empreendimentos imobiliários.

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 12.

Ninguém deveria ser obrigado a gostar de ler. Que cada um seja livre para preferir os trabalhos manuais, os esportes ou o pôquer à leitura e à escrita. Todavia, a apropriação da cultura escrita é desejável por pelo menos três motivos.

O primeiro é que não estamos mais no tempo em que as exigências técnicas, requeridas por inúmeras tarefas, eram transmitidas pela imitação gestual, e não por uma explicitação verbal. Ser inábil com a escrita é hoje uma pesada desvantagem em uma grande quantidade de setores. E com a aceleração das mudanças pelas quais passamos, cada um, ao longo da vida, será sem dúvida chamado a exercer sucessivamente diversas profissões. A familiaridade com a escrita é um fator decisivo do devir social e, antes disso, do destino escolar, que condiciona em boa parte esse devir. Stéphane Beaud mostrou como a hostilidade diante da leitura, que muitos meninos manifestam, é prejudicial para o seu percurso escolar, e depois universitário. Ele observa que o bloqueio dos meninos em relação à leitura é uma questão fundamental, que condiciona não só o seu acesso aos estudos, mas também a sua relação com a política.

Com efeito, é muito mais difícil ter voz ativa no espaço público quando se é inábil no uso da cultura escrita, e essa é a segunda razão pela qual ninguém deveria ser excluído dela. Ter familiaridade com a leitura, assim como com a escrita, não é suficiente e não garante nada, mas quem está distante dela corre todos os riscos de ficar fora do jogo. No momento em que a visibilidade midiática, os signos exteriores de riqueza, a cultura técnica ou o desempenho esportivo parecem prevalecer sobre os valores literários, o poder permanece, o que quer que digam, ligado à escrita. Se o atual presidente da república francesa se exhibe muito mais em parques de diversões ou com cantores populares do que em livrarias, contrariamente a diversos de seus predecessores, é em uma biblioteca, ante os livros, que ele posa para a fotografia oficial. E, no cotidiano, ele se aconselha com homens de letras.

O terceiro motivo é que o recurso à cultura escrita permite não apenas aceder ao campo do saber e da informação, mas ainda lançar mão das imensas reservas da literatura, sob todas as suas formas, cuja riqueza é indubitavelmente sem igual para que o ser humano possa se construir ou se reconstruir na adversidade. Certamente, não é o único meio e, em muitos casos, não é um recurso suficiente. Entretanto, somos seres de linguagem e seres de narrativas, e estas possuem um valor reparador.

(Michèle Petit. *A arte de ler ou como resistir à adversidade*, 2021. Adaptado)

07. Quanto à discussão em relação ao domínio da leitura e da escrita, o texto deixa claro que

- (A) os meninos, apesar de mais avessos à leitura, saem-se bem em atividades que demandam engajamento político.
- (B) indivíduos não afeitos a essas atividades dificilmente chegarão a exercer atividade profissional prazerosa.
- (C) há maiores chances de as pessoas terem êxito em sua atuação na esfera pública quando são leitoras.
- (D) ocorre atualmente um aumento do prestígio dos valores literários em detrimento de outros valores.
- (E) a leitura, embora fundamental para a aquisição do conhecimento, não é capaz de aplacar o sofrimento humano.

08. O exemplo do presidente francês foi empregado pela autora com a finalidade de fortalecer a ideia relativa

- (A) à irrelevância da fotografia.
- (B) à força da mídia.
- (C) ao desprestígio da política.
- (D) ao poder da escrita.
- (E) à popularidade da música.

09. O trecho em que se observa a presença de comparação é:

- (A) Ser inábil com a escrita é hoje uma pesada desvantagem em uma grande quantidade de setores. (2º parágrafo)
- (B) ... cada um, ao longo da vida, será sem dúvida chamado a exercer sucessivamente diversas profissões. (2º parágrafo)
- (C) Ele observa que o bloqueio dos meninos em relação à leitura é uma questão fundamental... (2º parágrafo)
- (D) Ter familiaridade com a leitura, assim como com a escrita, não é suficiente e não garante nada... (3º parágrafo)
- (E) Certamente, não é o único meio e, em muitos casos, não é um recurso suficiente. (4º parágrafo)

10. Considere os seguintes trechos.

- ... o bloqueio dos meninos em relação à leitura é uma questão **fundamental**... (2º parágrafo)
- ... para que o ser humano possa se construir ou se reconstruir na **adversidade**. (4º parágrafo)

Os vocábulos destacados apresentam, respectivamente, como antônimo e sinônimo:

- (A) original e sofrimento.
- (B) secundária e infortúnio.
- (C) central e revés.
- (D) menor e satisfação.
- (E) principal e abundância.

11. No trecho do 1º parágrafo – Que cada um **seja** livre para preferir os trabalhos manuais –, a forma verbal em destaque encontra-se no mesmo modo que a destacada em:

- (A) Ninguém **deveria** ser obrigado a gostar de ler. (1º parágrafo)
- (B) **Ser** inábil com a escrita é hoje uma pesada desvantagem... (2º parágrafo)
- (C) Ele **observa** que o bloqueio dos meninos em relação à leitura... (2º parágrafo)
- (D) ... quem está distante dela **corre** todos os riscos de ficar fora do jogo. (3º parágrafo)
- (E) ... para que o ser humano **possa** se construir ou se reconstruir... (4º parágrafo)

12. Considere os seguintes trechos do 2º parágrafo.

- ... com a aceleração das mudanças **pelas quais** passamos...
- ... a hostilidade diante da leitura, **que** muitos meninos manifestam...

As expressões destacadas podem ser substituídas, correta e respectivamente, por:

- (A) nas quais ... a qual
- (B) em que ... da qual
- (C) por que ... a qual
- (D) em que ... os quais
- (E) por que ... os quais

13. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal.

- (A) Existe sempre aqueles que preferem a leitura a outro tipo de atividade.
- (B) Sempre haverão pessoas que recorrem à leitura como meio de se informar.
- (C) O êxito escolar dos estudantes têm relação com a capacidade de leitura e escrita.
- (D) Em diferentes áreas profissionais precisam-se de pessoas que dominem a escrita.
- (E) A maioria dos leitores gosta de ter livros por perto nos momentos de lazer.

14. Considere os trechos redigidos a partir do texto.

- O universo da escrita é interessante. Muitas pessoas **têm dominado o universo da escrita**.
- Há quem goste muito de livros. Grandes leitores sempre **têm livros** por perto.

As expressões destacadas podem ser, correta e respectivamente, substituídas por:

- (A) o têm dominado ... têm-os
- (B) têm dominado-o ... os têm
- (C) têm dominado-o ... têm-nos
- (D) têm-no dominado ... os têm
- (E) têm-no dominado ... têm-nos

15. Considere o seguinte trecho.

Nos anos subsequentes _____ Segunda Guerra Mundial, o arquiteto Aldo van Eyck começou _____ ocupar com playgrounds os espaços vazios de Amsterdã: terrenos baldios, áreas abandonadas e esquinas de ruas. Van Eyck retirou os entulhos e aplainou os terrenos. Sua equipe _____ vezes pintava as paredes dos prédios vizinhos, e o próprio arquiteto projetou os equipamentos desses espaços. Ao contrário dos pátios de recreação das escolas, esses miniparques urbanos também atraíam adultos. Muitos tinham bancos confortáveis ou ficavam situados perto de bares e cafés, permitindo _____ pessoas que cuidavam das crianças dar uma fugida para beber alguma coisa e acalmar os nervos.

(Richard Sennett. *O artífice*, 2009. Adaptado)

De acordo com a norma-padrão de emprego do acento indicativo de crase, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- (A) à ... a ... às ... às
- (B) a ... à ... as ... às
- (C) a ... a ... as ... às
- (D) à ... à ... às ... as
- (E) à ... a ... às ... as

POLÍTICA DE SAÚDE

16. O texto constitucional, ao declarar que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, atribuiu ao Estado o dever de garantir saúde a todos os cidadãos, superando a realidade anterior, na qual o sistema público prestava assistência médico-hospitalar apenas à população vinculada ao mercado formal de trabalho.

Essa afirmativa corresponde ao seguinte princípio do SUS:

- (A) integralidade.
- (B) universalidade.
- (C) intersetorialidade.
- (D) transversalidade.
- (E) acessibilidade.

17. Um estudo epidemiológico realizado com os dados do Registro Hospitalar do Câncer, disponibilizado pelo Instituto Nacional do Câncer, encontrou 208 casos de câncer relacionados a exposição ao amianto, sendo 194 (93,2%) classificados como câncer de pleura e 14 (6,8%) como câncer de pulmão. Desse total de registros, a idade média foi de 58 anos, sendo que a maior parte era do sexo masculino (41 indivíduos, o equivalente a 70,7%), da raça branca (48 indivíduos, o equivalente a 82,8%), casada (32 indivíduos, o equivalente a 55,2%) e com ensino fundamental completo (15 indivíduos, o equivalente a 25,9%).

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o estudo epidemiológico em questão é do tipo

- (A) caso-controle.
- (B) coorte.
- (C) transversal.
- (D) ecológico.
- (E) estudo de caso.

18. A ausência de saneamento básico adequado expõe a população a diversos riscos ambientais, aumentando, assim, a propagação de doenças infecciosas. Entre as doenças transmitidas e veiculadas pela água, está a leptospirose, sendo que, em uma hipotética região com uma população de 14 000 000 habitantes, em um dado período de tempo, houve 1 400 casos confirmados, com registro de 280 óbitos pela doença.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde ao coeficiente de letalidade de leptospirose na região hipotética.

- (A) 0,2%
- (B) 2%
- (C) 5%
- (D) 10%
- (E) 20%

19. A história natural da doença descreve o curso e as fases típicas de uma doença – se não houver intervenção médica ou tratamento –, desde o seu início até a sua resolução ou a morte do paciente.

Em relação aos períodos e às fases da história natural da doença, é correto afirmar que a fase

- (A) de suscetibilidade ocorre no período patogênico, em que já há alterações patológicas, com o início de sinais e sintomas.
- (B) pré-clínica ocorre no período pré-patogênico, antes do adoecimento, e se caracteriza pela presença de condições que favorecem o aparecimento da doença.
- (C) clínica ocorre no período patogênico, em que há aparecimento de sinais e sintomas com gravidade variável, e pode evoluir para a cura total sem sequelas, para o óbito ou para a fase seguinte.
- (D) de incapacidade residual ocorre no período pós-patogênico, em que fatores genéticos, condições e estilo de vida, além de fatores ambientais, podem interferir na recuperação, sendo possível haver persistência de sequelas ou incapacidades.
- (E) de recuperação ocorre no período patogênico e pode evoluir para a cura ou para a fase seguinte.

20. O principal objetivo da Vigilância em Saúde é

- (A) monitorar a saúde da população para identificar e controlar problemas de saúde e fatores de risco.
- (B) diagnosticar doenças e prescrever tratamento adequado e imediato.
- (C) realizar pesquisas experimentais para desenvolver novos medicamentos.
- (D) promover campanhas de conscientização sobre saúde em escolas e empresas.
- (E) construir um protocolo clínico para a implantação da linha de cuidado.

21. O indicador demográfico que calcula o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher, por faixa etária específica do período reprodutivo, na população total feminina residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é denominado

- (A) taxa bruta de natalidade.
- (B) taxa de fecundidade total.
- (C) razão de dependência.
- (D) taxa específica de fecundidade.
- (E) índice de nascimento.

22. Sobre as linhas de cuidado no contexto das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é correto afirmar:

- (A) integram diferentes serviços e níveis de atenção (atenção primária, secundária e terciária), garantindo que o paciente receba um cuidado contínuo e coordenado.
- (B) são desenhadas para direcionar a assistência médica visando ao tratamento das doenças agudas.
- (C) contêm diretrizes sobre as necessidades de tratamento e a reabilitação dos pacientes que já têm diagnóstico confirmado de doença.
- (D) caracterizam-se por serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- (E) padronizam os critérios de encaminhamento dos pacientes da atenção básica para os serviços de diagnóstico e os ambulatorios de especialidades.

23. Para assegurar a equidade no Sistema Único de Saúde (SUS), os entes federativos devem cumprir atribuições e responsabilidades, por exemplo:

- (A) monitorar e avaliar a prestação de serviços de saúde para garantir que todos os cidadãos, sem distinção de raça, sexo ou religião, estejam sendo atendidos sem qualquer forma de discriminação.
- (B) estabelecer diretrizes e políticas nacionais que assegurem a cobertura integral da saúde, abrangendo todos os níveis de atenção (primária, secundária e terciária) e todos os aspectos da saúde (prevenção, tratamento, reabilitação e promoção da saúde).
- (C) promover e apoiar iniciativas para incentivar a participação da sociedade civil em âmbito nacional, como conferências de saúde e fóruns de debate sobre políticas de saúde.
- (D) criar e implementar políticas de saúde que visem a diminuir as desigualdades, assegurando que os cidadãos, especialmente dos grupos vulneráveis e marginalizados, tenham acesso aos serviços de saúde, tratando desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- (E) transferir a gestão dos serviços de saúde para os níveis mais próximos da população, promovendo maior eficiência, responsabilidade e adaptabilidade.

24. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em relação à assistência à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar:

- (A) a assistência à saúde é exclusivamente pública, não sendo permitida a atuação da iniciativa privada em nenhum nível.
- (B) as instituições privadas podem atuar na assistência à saúde de forma complementar ao SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) instituições privadas podem atuar na assistência complementar à saúde pública, desde que tenham contrato de exclusividade para prestação de serviços públicos.
- (D) entidades filantrópicas, estabelecimentos privados com e sem fins lucrativos e empresas estrangeiras podem participar de forma complementar na assistência à saúde no SUS.
- (E) a assistência à saúde oferecida pela iniciativa privada ao SUS é restrita a hospitais e clínicas, com base em limites bem definidos na legislação.

25. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um serviço de saúde que atua como porta de entrada para o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

- (A) Hospital especializado em cardiologia.
- (B) Laboratório de análises clínicas.
- (C) Serviços de radiologia e diagnóstico por imagem.
- (D) Unidades de reabilitação cardíaca e pulmonar.
- (E) Pronto-socorro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Ao desenvolver o Processo de Enfermagem, o enfermeiro realiza a priorização de diagnósticos de enfermagem e a tomada de decisão terapêutica na etapa de

- (A) planejamento de enfermagem.
- (B) avaliação de enfermagem.
- (C) diagnóstico de enfermagem.
- (D) evolução de enfermagem.
- (E) implementação de enfermagem.

27. O estado de São Paulo registrou 139 casos de coqueluche até a 23ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 8 de junho, representando alta de 768,7% na comparação com mesmo período do ano passado, quando foram confirmados 16 registros.

(SP Notícias, Governo do Estado de São Paulo. Adaptado)

Assim sendo, o enfermeiro deve estar ciente de que

- (A) a coqueluche compromete especificamente o trato respiratório inferior e se caracteriza por paroxismos de tosse produtiva, principalmente na fase inicial da doença.
- (B) o período de incubação, em média, é de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias, e chegando, raramente, até 42 dias.
- (C) o período de transmissibilidade se estende do segundo dia após a exposição do doente ao agente até 14 dias do início das crises paroxísticas.
- (D) a fase catarral se caracteriza por ser afebril e apresentar, como manifestação típica, os paroxismos de tosse, de início súbito, incontrolável, com cerca de cinco a dez tossidas em uma única expiração.
- (E) as vacinas pentavalente, tríplice viral, e dTpa possuem, em sua composição, o componente que possibilita a imunização contra a coqueluche, se aplicadas de acordo com o cronograma e as recomendações do Ministério da Saúde.

28. O enfermeiro deve registrar como falência no tratamento da tuberculose pulmonar quando o doente

- (A) fez uso de medicamento por 30 dias ou mais e interrompeu o tratamento por 30 dias consecutivos ou mais.
- (B) apresenta baciloscopia positiva inicial seguida de negatificação e de novos resultados positivos por dois meses consecutivos, a partir do quarto mês de tratamento.
- (C) com baciloscopia positiva inicial ainda apresenta poucos bacilos no exame direto do escarro, na partir do 3º mês de tratamento, de forma isolada.
- (D) necessitar da adoção de regimes terapêuticos diferentes do esquema básico por intolerância e/ou por toxicidade medicamentosa.
- (E) que fez uso de medicamento por menos de 30 dias interrompeu o tratamento por 30 dias consecutivos ou mais.

29. Leia atentamente a notícia a seguir.

Hanseníase tem alta de 75% em Piracicaba, e especialista alerta para gravidade de diagnóstico

Os casos de hanseníase registrados em Piracicaba (SP) cresceram em até 75% desde 2020, conforme aponta levantamento da Secretaria de Saúde da cidade, passando de oito, naquele ano, para 14 confirmações da doença infectocontagiosa em 2023. Em 2021, a cidade teve dez casos e, em 2022, foram nove registros.

A enfermeira e interlocutora do Programa de Tuberculose e Hanseníase de Piracicaba reforça que, embora a quantidade de casos confirmados no município pareça pequena, o número é preocupante porque a maioria das ocorrências são diagnosticadas tardiamente nos pacientes, que já apresentam alguma incapacidade instalada.

“Cerca de 95% dos casos foram diagnosticados tardiamente, apresentando formas mais graves da doença e, em 60% deles, com algum grau de incapacidade instalada. Por isso a importância da campanha Janeiro Roxo para a prevenção da hanseníase, com informação, e também da participação da população para termos o diagnóstico mais precoce”, lembrou.


(G1, 06.01.2024. Adaptado)

A proporção de casos novos de hanseníase diagnosticados com algum grau de incapacidade instalada (GIF 2) é um importante indicador epidemiológico que avalia

- (A) a virulência do *Mycobacterium leprae*, agente da hanseníase.
- (B) a incidência de resistência do *Mycobacterium leprae* aos medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase.
- (C) os conhecimentos da equipe de atenção à saúde em relação ao diagnóstico da hanseníase.
- (D) a efetividade das atividades de detecção dos casos pelos programas de vigilância em hanseníase.
- (E) a vulnerabilidade da população à hanseníase nas formas multibacilares: wirchoviana e tuberculoide.

Para responder às questões de números 30 a 32, considere o relato apresentado a seguir.

L.E, 62 anos, sexo feminino, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), hipertensa, portadora de diabetes tipo 2 há 20 anos, em uso de diurético, hipotensores e hipoglicemiantes orais, esteve internada por 5 dias, com diagnóstico de pneumonia. Por ocasião da alta, a prescrição médica incluía, entre outros itens, antibioticoterapia por via oral, o uso de oxigenoterapia suplementar temporária, com fluxo de 3 L/min., até nova avaliação clínica em 30 dias, fisioterapia respiratória e a solicitação da inclusão da paciente no Programa Melhor em Casa (PMeC). Para isso, foi realizada a avaliação da paciente e a aplicação do Instrumento de Avaliação da Elegibilidade e Complexidade da Atenção Domiciliar (IAEC-AD), obtendo-se 10 pontos. Já no domicílio, com a finalidade de analisar a estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de vulnerabilidade, o enfermeiro da equipe iniciou a elaboração do genograma, registrando no prontuário as seguintes informações:



30. Face ao exposto, considerando-se que L.E. apresenta estabilidade clínica e que não existem condições que a tornem inelegível para a admissão no PMeC, a paciente deverá ser incluída na modalidade _____, cuja prestação da assistência à saúde é de responsabilidade da equipe _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

- (A) AD1 ... de saúde da família, com apoio da equipe multiprofissional (eMulti)
- (B) AD2 ... de saúde da família, com apoio da equipe multiprofissional de apoio para reabilitação (EMAP-R), de acordo com as especificidades de cada caso
- (C) AD3 ... multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD)
- (D) AD2 ... multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD)
- (E) AD3 ... equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio para Reabilitação (EMAP-R)

31. No que diz respeito à oxigenoterapia suplementar temporária, o enfermeiro deve, entre outros itens,
- (A) orientar a paciente, cuidadores e familiares quanto ao uso seguro do oxigênio, esclarecendo a importância de não fumar ou deixar que fumem no domicílio durante o uso do O₂.
 - (B) considerar que, frente ao quadro apresentado por L.E., o oxigênio necessita ser ofertado por meio do dispositivo máscara de Venturi.
 - (C) esclarecer que a oxigenoterapia deve ser mantida por, pelo menos, 10 horas por dia, para obtenção dos resultados esperados.
 - (D) verificar a oximetria de pulso e, se necessário, aumentar o fluxo de oxigênio de modo a manter a SpO₂ entre 96 e 98%, devido ao risco de retenção de CO₂ em pacientes com DPOC.
 - (E) adicionar um sistema de umidificação à linha/dispositivo de fornecimento do oxigênio para evitar o ressecamento das mucosas do sistema respiratório.
32. Ao analisar o genograma apresentado, verifica-se que
- (A) A.C. e B.E. têm um filho adotado.
 - (B) G.S e B.S. são divorciados.
 - (C) I.S. e E.S. têm um relacionamento harmônico.
 - (D) L.E., R.S., A.S., G.S, B.S. e I.S têm um relacionamento conflituoso.
 - (E) P.E. e L.E. são divorciados desde 2010.
33. Assinale a alternativa que associa corretamente as coberturas e suas principais características.
1. Alginato de cálcio (placa, cordão ou fita)
 2. Espuma de poliuretano
 3. Cobertura com prata
 4. Carvão ativado
- () Libera, de forma contínua, baixa dose de ibuprofeno no leito da ferida, que age de forma tópica, sem absorção e circulação sistêmica, durante até 7 dias.
 - () Redutora de microrganismos, deve ser escolhida quando as feridas apresentam maior carga bacteriana.
 - () Tem a capacidade de absorver o excesso de exsudato e manter o leito da ferida com umidade fisiológica.
 - () Adsorve as moléculas voláteis liberadas pela lesão que incluem a cadeia curta de ácidos orgânicos produzidos por bactérias anaeróbias e uma mistura de aminas e diaminas como a cadaverina e putrescina, produzidas por processos metabólicos de outras bactérias proteolíticas.
- (A) 1, 2, 3, 4.
 - (B) 2, 4, 1, 3.
 - (C) 4, 3, 2, 1.
 - (D) 2, 1, 3, 4.
 - (E) 2, 3, 1, 4.
34. Durante avaliação clínica de R.S., 67 anos, sexo masculino, considerando o histórico de saúde e os valores obtidos na aferição da pressão arterial (PA), decidiu-se afastar a possibilidade de se tratar de um caso de hipertensão do avental branco. Para investigar essa situação, optou-se pela realização da Medição Residencial da PA (MRPA), conforme protocolo definido pelo Ministério da Saúde (2021), que consiste na obtenção de
- (A) três medições pela manhã, até 30 minutos após a tomada da medicação, três à noite, 30 minutos antes do jantar, e três à noite, imediatamente antes de se deitar para dormir, durante 5 dias.
 - (B) três medições pela manhã, antes do desjejum e da tomada da medicação, e três à noite, antes do jantar, durante 5 dias.
 - (C) duas medições pela manhã, até 30 minutos após o desjejum e tomada da medicação, duas medições à noite, antes de dormir, por 3 dias.
 - (D) duas medições antes do desjejum e da tomada da medicação, duas medições após o almoço e duas medições antes de dormir, por 3 dias.
 - (E) uma medição pela manhã, antes do desjejum e da tomada da medicação, e uma medição à noite, antes do jantar, por 7 dias.
35. De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde (2024), no que diz respeito ao rastreamento de diabetes melito tipo 2 (DM2) no adulto, é correto afirmar que
- (A) são elegíveis para o rastreamento todos os indivíduos, de qualquer idade, com Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25 kg/m², apresentando ou não outros fatores de risco para a doença.
 - (B) independentemente da idade e do IMC, indivíduos vivendo com HIV/AIDS devem ser rastreados para DM2, por meio da glicemia glicada, 3 a 6 meses após o início de terapia antirretroviral (TARV).
 - (C) para indivíduos elegíveis, o rastreamento deve ser realizado por meio do exame de glicemia de jejum, e, caso necessária a confirmação diagnóstica, deve ser realizado o exame de hemoglobina glicada (HbA1c) ou teste oral de tolerância à glicose (TOTG).
 - (D) para indivíduos com idade maior ou igual a 45 anos, independentemente da presença de fatores de risco, o rastreamento deve ser realizado a cada 2 anos, após a primeira testagem negativa.
 - (E) para indivíduos com sobrepeso ou obesidade, de qualquer faixa etária, que apresente, no mínimo, 1 fator de risco associado, o rastreamento para DM2 deve ser realizado a cada ano, após a primeira testagem negativa.

36. Em 14.11.2024, durante a consulta de enfermagem de pré-natal de L.A., 22 anos, ao analisar os registros existentes no prontuário da gestante, o enfermeiro constatou que sua última menstruação ocorrera em 31.08.2024 e que, na última consulta realizada com o médico de família, L.A. fora diagnosticada com sífilis latente tardia. Quanto ao tratamento da sífilis, o enfermeiro constatou que a gestante havia recebido a primeira dose de benzilpenicilina benzatina, 2400 000 UI, IM, em 28.10.2024, e a segunda dose do medicamento em 04.11.2024.

Com base no relato, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a idade gestacional (IG), a data provável do parto (DPP) de L.A. e a conduta (C) a ser adotada pelo enfermeiro em relação ao tratamento para sífilis.

- (A) IG = 10^{5.7}semanas; DPP = 07.06.2025; C = considerar que o tratamento está completo e correto.
- (B) IG = 10 semanas; DPP = 07.05.2025; C = repetir o esquema completo de tratamento, que compreende a aplicação de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 3 semanas.
- (C) IG = 10 semanas; DPP = 07.05.2025; C = considerar que o tratamento está completo e correto.
- (D) IG = 10^{5.7}semanas; DPP = 07.06.2025; C = repetir o esquema completo de tratamento, que compreende a aplicação de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, semanal (1,2 milhão UI em cada glúteo) por 3 semanas.
- (E) IG = 10^{5.7}semanas; DPP = 07.06.2025; C = no momento da consulta, aplicar a terceira dose de benzilpenicilina benzatina, 2400 000 UI, IM, para completar o tratamento.

37. R.H., 42 anos, compareceu à unidade básica de saúde para realizar o exame citopatológico para a prevenção do câncer de colo uterino. Durante a consulta de enfermagem, ao realizar a anamnese e analisar os registros existentes no prontuário, o enfermeiro constatou que a usuária havia sido submetida à histerectomia total, há 18 meses, no último parto, devido à presença de placenta acreta. Observou ainda que o exame citopatológico realizado no período de pré-natal, bem como os dois exames anteriores, havia apresentado resultados normais. Frente a essa situação, o profissional deve

- (A) informar R.H. que não mais necessitará realizar o exame citopatológico por ser histerectomizada e seus exames anteriores estarem normais.
- (B) esclarecer que nova coleta de material para o exame citopatológico só deverá ser realizada a partir de 2 anos do último exame preventivo, uma vez que os resultados dos últimos exames estavam normais.
- (C) coletar material do fundo de saco de Douglas para exame e orientar a usuária sobre a importância de continuar realizando os exames a cada 2 anos, se os resultados obtidos não apresentarem alterações.
- (D) coletar material da face anterior da vagina e vulva e esclarecer R.H. sobre a necessidade de realizar o rastreamento citológico até os 64 anos de idade, de acordo com a periodicidade preconizada pelo Ministério da Saúde.
- (E) realizar o exame minucioso da vagina, vulva e região perianal, coletar material fundo de saco de Douglas e face anterior da vagina e informar a usuária que, em seu caso, o rastreamento deverá ser repetido a cada 5 anos, se não apresentar queixas.

38. Em uma unidade básica de saúde, os enfermeiros da equipe de saúde da família realizam regularmente grupos com usuários sobre planejamento familiar. Nestas ocasiões, devem esclarecer os participantes de que, no âmbito do SUS,

- (A) mulheres com menos de 21 anos e, pelo menos, dois filhos vivos têm o direito à esterilização voluntária, desde que tenham capacidade civil plena.
- (B) o uso do dispositivo intrauterino com cobre (Tcu 380A) é contraindicado para adolescentes e mulheres no climatério.
- (C) para a realização de vasectomia, a idade mínima é de 25 anos, independentemente do número de filhos vivos.
- (D) o uso de método anticoncepcional injetável com progestágeno (trimestral) é contraindicado para a mulher com diagnóstico de diabetes melito tipo 2, controlado ou não.
- (E) uma vez interrompido o uso da pílula anticoncepcional combinada, a fertilidade retorna cerca de 6 meses após a ingestão da última cartela de comprimidos.

39. Leia o texto.

A rubéola é uma doença exantemática aguda de etiologia viral que apresenta alta contagiosidade.

Os últimos casos autóctones de rubéola no Brasil foram registrados em 2008 e, em 2015, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Rubéola. No período de 2020 a 2022, 282 casos suspeitos de rubéola em gestantes foram notificados no Sistema de Agravos de Notificação (Sinan) no país, e 80 (28,4%) tiveram resultados de IgM reagentes (falsos positivos), sendo todos descartados após a investigação epidemiológica. Nesse mesmo período, de acordo com os dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), foram realizados 14 127 exames de sorologia IgM para rubéola em gestantes, e 110 (0,8%) foram reagentes.

(Brasil. Ministério da Saúde.

Nota Técnica nº 34/2023-CGVDI/DPNI/SVSA/MS.

Disponível em: Ministério da Saúde – www.gov.br. Adaptado)

Considerando o contexto apresentado, avalie as asserções a seguir e assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre elas.

I. O Ministério da Saúde não recomenda a realização do exame sorológico com pesquisa IgM para rubéola, na rotina do pré-natal, em gestantes assintomáticas.

PORQUE

II. ... devido a interferências de algumas proteínas presentes nos soros humanos, podem ser observados resultados falsos positivos, o que gera dificuldades no manejo clínico e pode criar expectativas desnecessárias e sofrimento às gestantes, além de um acúmulo de casos suspeitos de rubéola que não atendem à definição de caso da doença.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a asserção II não é uma justificativa da asserção I.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a asserção II é uma justificativa correta para a asserção I.

40. Ao realizar a consulta de enfermagem de puericultura, o enfermeiro deve valorizar a percepção dos pais ou cuidadores sobre aspectos comportamentais da criança e estar atento às características clínicas de crianças com risco para transtorno do espectro autista (TEA) na faixa etária de 6 a 8 meses, tais como

- (A) não responder claramente quando são chamadas pelo nome.
- (B) mostrar interesse por rodas de carrinho e brinquedos muito coloridos.
- (C) não imitar pequenos gestos ou brincadeiras.
- (D) apresentar ecolalia ou ainda não apresentar os primeiros esboços de palavras.
- (E) não estranhar quem não é da família mais próxima, como se não notassem a diferença.

41. Na sala de atendimento de emergência, enquanto aguardava remoção para maternidade de referência, grávida com diagnóstico de eclampsia, 30 semanas de idade gestacional, monitorizada, com via aérea avançada, recebendo sulfato de magnésio por acesso venoso periférico em antebraço esquerdo, feto vivo, evoluiu para parada cardiorrespiratória.

Frente a essa situação, os cuidados e procedimentos de reanimação devem incluir, entre outras ações,

- (A) o posicionamento da gestante em decúbito lateral esquerdo.
- (B) o alívio da compressão aortocaval com deslocamento uterino lateral.
- (C) o aumento da velocidade de gotejamento do sulfato de magnésio.
- (D) a instalação de monitor fetal.
- (E) a administração de 1 ventilação a cada 3 segundos, perfazendo 20 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas.


42. Em uma unidade básica de saúde, está sendo atendido um estudante com 12 anos de idade, com história de diabetes melito tipo 1. Segundo o professor que o acompanhava, o jovem estava jogando bola na aula de educação física quando, após cerca de 30 minutos, passou a suar frio, referir cefaleia, tonturas, dormência nos lábios e língua, visão turva e a apresentar “coração acelerado”. Ao exame físico, constatou-se que o paciente estava confuso e sua glicemia capilar era de 56 mg/dL.
- Frente a essa situação, a conduta a ser adotada compreende a administração de
- 50 mL de glicose 50%, diluídos em 100 mL de SF 0,9% via endovenosa em acesso calibroso; repetir a glicemia capilar em 5 minutos e, se não houve recuperação, o procedimento deve ser repetido.
 - 30 mL de glicose 50%, diluídos em 100 mL de SF 0,9% via endovenosa em acesso calibroso; repetir a glicemia capilar em 15 minutos e, se não houve recuperação, o procedimento deve ser repetido.
 - 15 g de carboidrato (1 colher de sopa de açúcar em meio copo de água ou 150 mL de refrigerante não dietético ou 1 copo de suco integral de laranja) por via oral; repetir a glicemia capilar após 15 minutos e, se não houve reversão, repetir o processo.
 - 15 mL de glicose 50%, diluídos em 100 mL de SF 0,9% via endovenosa em acesso calibroso; repetir a glicemia capilar em 15 minutos e, se glicemia capilar menor de 70 mg/dL, transferir o paciente para a unidade hospitalar de referência para avaliação e tratamento da causa básica.
 - 30 g de carboidrato (2 colheres de sopa de açúcar em meio copo de água ou 300 mL de refrigerante não dietético ou 2 copos de suco integral de laranja) por via oral; repetir a glicemia capilar após 15 minutos e, se não houver reversão, repetir o processo.
43. A administração carvão ativado está contraindicada em casos de intoxicação exógena aguda por ingestão de
- anfetaminas, a menos de 2 horas.
 - opioides, independentemente do tempo após a ingestão.
 - digoxina, a menos de 1 hora.
 - organofosforados, independentemente do tempo após a ingestão.
 - lítio, independentemente do tempo após a ingestão.
44. Em 31.10.2024, ao realizar a vacinação em uma escola e analisar a carteira de vacinas de uma adolescente com 13 anos de idade, o enfermeiro observou os seguintes registros:

Nome: A.A.		Data de nascimento: 20.10.2011		
dT 15.06.2022	Hepatite B (Recombinante) 15.06.2022	Tríplice viral 15.06.2022	Meningocócica ACWY (conjugada) 29.04.2023	Febre Amarela 23.09.2022
dT 23.09.2022	Hepatite B (Recombinante) 23.09.2022	Tríplice viral 23.09.2022		HPV 29.04.2023
dT 29.04.2023	Hepatite B (Recombinante) 29.04.2023		Moderna (monovalente XBB) 10.03.2024	

Frente aos registros existentes na carteira de vacinação, o enfermeiro deve

- considerar que, no momento, o esquema vacinal do adolescente está completo e correto.
- determinar a aplicação da segunda dose da vacina HPV.
- considerar inválida a dose da vacina febre amarela, porque foi administrada juntamente com a vacina tríplice viral, e determinar a aplicação de uma nova dose da vacina febre amarela.
- determinar a aplicação da segunda dose da vacina Moderna (monovalente XBB).
- determinar a aplicação da segunda dose das vacinas HPV, Meningocócica ACWY (conjugada) e Moderna (monovalente XBB).

45. Entre a aplicação da vacina BCG e o aparecimento da cicatriz, a evolução da lesão vacinal ocorre em fases.



Considerando os itens apresentados a seguir, assinale a alternativa que preenche os quadros na ordem sequencial em que ocorrem as fases no processo.

1. Mácula avermelhada
 2. Pústula.
 3. Crosta.
 4. Úlcera.
- (A) 4, 2, 1, 3.
(B) 1, 2, 3, 4.
(C) 2, 1, 4, 3.
(D) 1, 2, 4, 3.
(E) 2, 1, 3, 4.
46. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a organização dos cuidados paliativos tem como um de seus princípios norteadores
- (A) a oferta de educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores da saúde no SUS.
(B) o fomento da instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de cuidados paliativos no ensino de graduação e especialização dos profissionais de saúde.
(C) o início dos cuidados paliativos o mais precocemente possível, juntamente com o tratamento modificador da doença, e início das investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes.
(D) a disseminação de informação sobre os cuidados paliativos na sociedade.
(E) o desenvolvimento de uma atenção à saúde humanizada, baseada em evidências, com acesso equitativo e custo efetivo, abrangendo toda a linha de cuidado e todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, domiciliar e integração com os serviços especializados.
47. Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), é utilizada autoclave assistida por bomba de vácuo para a esterilização de produtos para a saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina que para esse tipo de equipamento, o teste de Bowie & Dick para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar seja realizado
- (A) na primeira carga do dia, com a autoclave carregada com material de densidade.
(B) a cada 7 dias.
(C) a cada cinco ciclos de uso.
(D) no primeiro ciclo do dia.
(E) a cada 24 horas de uso.

48. Em um município com 1 000 000 habitantes, após episódios de chuva intensa que resultaram em alagamentos de bairros e residências, foram diagnosticados 6 250 casos de leptospirose, sendo que 25 casos desses casos vieram a óbito em razão da doença. Com base nos dados apresentados, o coeficiente de letalidade por leptospirose para esse município, no período avaliado, é de

- (A) 0,025 por 1 000 habitantes.
(B) 2,5%.
(C) 2,5 por 100 000 habitantes.
(D) 0,4%.
(E) 4%.

49. A Resolução COFEN nº 731, de 13 de novembro de 2023, que regulamenta a realização de sutura simples pelo enfermeiro, estabelece que o enfermeiro está autorizado a realizar a sutura

- (A) de tecido subcutâneo e pele, em procedimento cirúrgico de pequeno porte realizado por médico.
(B) de ferimentos limpos, de pequeno porte, que atinjam até músculos e tendões.
(C) de ferimentos superficiais de pele, anexos e mucosas, desde que o profissional tenha participado de capacitação teórico-prática com carga horária de, no mínimo, 10 horas.
(D) de ferimentos cortocutâneos, abertos e limpos, que atinjam camadas da pele até a hipoderme, exceto em couro cabeludo e face.
(E) para a estabilização externa de dispositivos sob a pele, com utilização de fio e agulha.

50. Para o dimensionamento de Profissionais de Enfermagem para as Unidades de Atenção Básica e de Saúde da Família, o enfermeiro responsável técnico (ERT) deve considerar, entre outros parâmetros, o tempo dispendido em intervenções de cuidados diretos de enfermagem, tais como

- (A) interpretação de dados laboratoriais.
(B) mapeamento e territorialização.
(C) controle de imunizações.
(D) vigilância em saúde.
(E) ações educativas dos trabalhadores de saúde.

PCI Concursos

PCI Concursos