

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

PROTOCOLO DE RUTINA DE ORDENO DOCUMENTADA

Resolucion 067449 del 08 de mayo de 2020

Articulo 8.5 - Criterio 4.5 (FUNDAMENTAL)

PREDIO:

PROPIETARIO:

MUNICIPIO:

VEREDA:

FECHA DE ELABORACION:

VERSION:

RESPONSABLE DE ORDENO:

Este protocolo debe estar disponible y visible para todo el personal durante la auditoria.

PROCEDIMIENTO DE ORDENO - PASO A PASO

PASO 1: VERIFICACION VISUAL DE LA UBRE

Antes del ordeño, verifique visualmente cada ubre en busca de edema, heridas, inflamación o signos de mastitis clínica. Los animales con anomalías deben ordeñarse al final o con equipo separado.

PASO 2: PRUEBA DE FONDA O MASTITIS CLINICA

Realice la prueba de fonda (CMT - California Mastitis Test) a cada cuarto. Registre los resultados. Los cuartos con reacción positiva (+) deben marcarse y la leche debe descartarse.

PASO 3: LAVADO Y SECADO DE UBRES

Lave cada ubre con agua limpia y jabón (o producto específico para higiene de ubres). Seque con toalla de papel individual (un solo uso por animal). No use toallas compartidas.

PASO 4: SELLADO DE PEZONES - PREDIPPING

Aplique sellador predipping (desinfectante) en cada pezón. Deje actuar por al menos 30 segundos. Seque cada pezón con toalla individual.

PASO 5: COLOCACION DE PEZONERAS

Coloque las pezoneras dentro del minuto siguiente al secado (evitar que la ubre se contamine nuevamente). Evite la entrada de aire durante la colocación.

PASO 6: VERIFICACION DE FLUJO DE LECHE

Verifique que el flujo de leche sea constante y que no haya deslizamiento o caída de pezoneras. Ajuste si es necesario. No sobre-ordene (tiempo máximo recomendado: 5-7 minutos).

PASO 7: RETIRO DE PEZONERAS

Retire las pezoneras cortando el vacío (automático o manualmente). No arranque las pezoneras con vacío. Aplique post-dipping inmediatamente después del retiro.

PASO 8: POST-DIPPING

Aplique sellador post-ordeno (post-dipping) cubriendo al menos el 75% del pezón. Deje secar al aire. No lave los pezones después de aplicar.

PASO 9: FILTRADO Y ENFRIAMIENTO

Filtre la leche inmediatamente. Enfriela a ≤ 4 grados C en las primeras 2 horas post-ordeno. Registre la temperatura.

LAVADO Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE ORDENO

PROCEDIMIENTO DE LAVADO (post-ordeno):

1. **ENJUAGUE INICIAL** con agua fria o tibia (no caliente, para evitar que la proteina se adhiera)
2. **LAVADO CON DETERGENTE ALCALINO** recircule agua entre 60-70 grados C con detergente alcalino clorado por 10-15 minutos
3. **ENJUAGUE INTERMEDIO** con agua limpia para remover residuos de detergente
4. **LAVADO CON DETERGENTE ACIDO** recircule con detergente acido una vez por semana (o segun recomendacion del fabricante) para eliminar sarro y m
5. **ENJUAGUE FINAL** con agua limpia, justo antes del siguiente ordeño
6. **DESMONTAR Y LAVAR MANUALMENTE** pezoneras, mangueras cortas y colectores deben desmontarse periodicamente y lavarse a mano

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:

- Cambio de pezoneras (lineas de leche): cada 1,500 a 2,500 ordenos o segun fabricante
- Limpieza de pulsadores: cada 3 meses
- Revision del sistema de vacio: cada 6 meses
- Calibracion del medidor de vacio: cada 12 meses
- Revision general por tecnicos: cada 6 meses (con certificacion)

CHECKLIST DIARIO DE VERIFICACION DE RUTINA

FECHA	TURNO	No. VACAS	VOLUMEN	TEMP SALIDA	PRUEBA CMT REALIZADA	NOVEDADES	FIRMA

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

FECHA	EQUIPO / COMPONENTE	ACTIVIDAD REALIZADA	TECNICO	PROXIMO MANTENIMIENTO	FIRMA

Nota: Este protocolo debe ser conocido por todo el personal involucrado en el ordeño. Mantener visible en la sala de ordeño.