

SURVEI & SAMPLING

# Pengaruh Pola Hidup terhadap Tingkat Nyeri Menstruasi pada Mahasiswi

---

n = 103 Responden · Purposive & Convenience Sampling · Google Form

**103** Responden

**97,1%** Pernah Nyeri Haid

**21** Pertanyaan



TIM PENELITIAN

# Anggota Kelompok 6

K

**Kayla Aprilia**

NIM: 52250057

*[Peran / Tugas: Design Pertanyaan, Design PPT, Isi PPT, Visualisasi Survei, Kesimpulan]*

R

**Raihania Syah Putri**

NIM: 52250054

*[Peran / Tugas: Tujuan, Populasi dan Sampel, Design Pertanyaan]*

C

**Chricyesia Winnerlady F. Uvas**

NIM: 52250075

*[Peran / Tugas: Design Pertanyaan, Isi PPT, Metode Sampling]*

D

**Dameria Adelina Mini Simarmata**

NIM: 52250011

*[Peran / Tugas: Topik, Tujuan, Daftar Pustaka]*



# Mengapa Survei Ini Dilakukan?

Survei ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pola hidup terhadap tingkat nyeri menstruasi (dismenore) pada mahasiswi. Fokus utama penelitian meliputi:

- Mengetahui tingkat nyeri menstruasi yang dialami responden.
- Menganalisis hubungan pola makan dengan nyeri menstruasi.
- Menganalisis pengaruh kualitas tidur terhadap nyeri menstruasi.
- Mengetahui pengaruh aktivitas olahraga terhadap pengurangan nyeri menstruasi.
- Mengidentifikasi faktor pola hidup yang dianggap paling berpengaruh terhadap nyeri menstruasi.



### Data-Driven

Informasi berbasis data mengenai faktor pola hidup yang berpengaruh



### Edukasi

Dasar edukasi kesehatan reproduksi bagi mahasiswi



### Kesadaran

Mendorong gaya hidup sehat dalam manajemen nyeri menstruasi



# Populasi: Mahasiswa Yang Mengalami Menstruasi

103

Total Responden

$\pm 9,65\%$

Margin of Error (CI 95%)

96

Minimal Sampel

## Rumus Penentuan Sampel

$$n = \frac{Z^2 \times p(1 - p)}{e^2}$$

$$Z = 1,96 \cdot p = 0,5 \cdot e = 0,1$$

$n \approx 96.04$  (Minimal sampel yang dibutuhkan)

Z = nilai Tingkat kepercayaan (95% = 1,96)

P = proporsi populasi yang diasumsikan (0,5)

E = batas kesalahan (MoE) yang diterapkan (10%)

N = jumlah sampel minimum yang dibutuhkan

## Rumus Margin of Error

$$\text{MoE} = Z \times \sqrt{\left( \frac{p \times q}{n} \right)}$$

$$Z = 1,96 \cdot p = 0,5 \cdot n = 103$$

MoE =  $\pm 9,65\%$  (CI 95%)

Z = nilai Tingkat kepercayaan (95% = 1,96)

P = proporsi populasi yang diasumsikan (0,5)

Q = 1 - p (0,5)

N = jumlah responden yang diperoleh

MoE = Tingkat kesalahan pengambilan sampel



# Non-Probability Sampling (Purposive & Convenience)

## Mengapa Purposive Sampling?

- 1 Responden harus memiliki kriteria spesifik: mahasiswi aktif yang menstruasi
- 2 Efisien untuk populasi dengan karakteristik tertentu
- 3 Tepat digunakan ketika populasi sulit diidentifikasi secara acak

## Mengapa Convenience Sampling?

- 1 Responden diambil berdasarkan kemudahan akses.
- 2 Efisien untuk penelitian dengan keterbatasan waktu dan biaya.
- 3 Cocok untuk survei mahasiswa karena responden mudah dijangkau secara digital.

## Instrumen Pengumpulan Data

### Media

Google Form (kuesioner daring)

### Periode

Mei 2026

### Pertanyaan

21 butir | Pilihan ganda & isian singkat

### Skala

Likert 1-5 (nyeri & kualitas tidur)



## 5 Bagian — 21 Pertanyaan

**A**

### Profil & Menstruasi

Status, usia, pengalaman, tingkat & frekuensi nyeri

Q1–6

**B**

### Pola Makan

Gizi seimbang, frekuensi fast food, buah & sayur

Q7–10

**C**

### Kualitas & Durasi Tidur

Durasi tidur harian, kualitas tidur, perubahan saat haid

Q11–14

**D**

### Aktivitas Fisik

Frekuensi & jenis olahraga, persepsi manfaat

Q15–18

**E**


### Persepsi Pola Hidup

Pengaruh pola hidup, upaya sehat, faktor utama

Q19–21


## 05 VISUALISASI DATA

Distribusi Tingkat Nyeri Menstruasi




Distribusi Tingkat Nyeri Menstruasi

Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap Nyeri




Faktor yang Paling Berpengaruh terhadap Nyeri

Frekuensi Konsumsi Fast Food




Frekuensi Konsumsi Fast Food

Distribusi Durasi Tidur



Distribusi Durasi Tidur

Distribusi Frekuensi Olahraga




Distribusi Frekuensi Olahraga



# Frekuensi Olahraga & Tingkat Nyeri

Hubungan Frekuensi Olahraga dan Tingkat Nyeri



## 1-2x/minggu dominan

27 orang nyeri 3; 20 orang nyeri 4

## Tidak olahraga

Tersebar merata di nyeri tingkat 3-5

## 3-4x/minggu lebih baik

Nyeri 3 dominan; tidak ada di tingkat 1-2




**Interpretasi:** Aktivitas olahraga yang lebih rutin berpotensi membantu mengurangi tingkat nyeri, meskipun hubungan ini belum tentu bersifat sebab-akibat langsung.





# Konsumsi Fast Food & Tingkat Nyeri

Hubungan Konsumsi Fast Food dan Tingkat Nyeri



## Kadang-kadang (n=53)

Nyeri 3-5 mendominasi; terbesar pada nyeri 3 (25 orang)

## Sering (n=32)

Tingkat nyeri 4 (11 org) & 5 (7 org) lebih tinggi

## Jarang (n=15)

Distribusi nyeri paling rendah dibanding kelompok lain




**Interpretasi:** Pola ini menunjukkan adanya hubungan antara pola makan kurang sehat dengan peningkatan tingkat nyeri.



# Kualitas Tidur & Tingkat Nyeri

Hubungan Kualitas Tidur dan Tingkat Nyeri



## Gelembung terbesar

Kualitas tidur 3 + nyeri 3 = 20 responden

## Kualitas 3 → nyeri 4

14 responden masih merasakan nyeri tinggi

## Kualitas 4-5 lebih baik

Distribusi nyeri cenderung lebih rendah




**Interpretasi:** Kualitas tidur yang kurang baik cenderung berkaitan dengan munculnya Tingkat nyeri lebih tinggi, tidur yang lebih berkualitas berpotensi membantu mengurangi keluhan nyeri.



# Durasi Tidur & Tingkat Nyeri

Hubungan Durasi Tidur dan Tingkat Nyeri



**5-6 jam (n=62, 60,2%)**

Nyeri 3 (25 org) & nyeri 4 (19 org) — sel paling gelap

**7-8 jam lebih baik**

Distribusi lebih merata; nyeri 1 lebih banyak

**< 7 jam tidur**

Berkaitan erat dengan nyeri level moderat–berat



**Interpretasi:** Tidur yang kurang optimal berhubungan dengan meningkatnya keluhan nyeri.



# Apa yang Kita Temukan?



## Tingkat Nyeri

38,8% nyeri sedang (lvl 3); 39,8% nyeri berat (lvl 4-5); hanya 8,7% tanpa nyeri berarti



## Fast Food

Konsumsi sering → nyeri lvl 4-5 lebih banyak. 31% responden makan fast food secara rutin



## Durasi Tidur

60,2% tidur hanya 5-6 jam/hari, berkaitan dengan nyeri moderat-berat lebih tinggi



## Olahraga

67% hanya olahraga 1-2x/minggu. Olahraga lebih sering → distribusi nyeri lebih rendah



## Kualitas Tidur

Tidur berkualitas rendah berkaitan dengan nyeri lebih tinggi; kualitas 4-5 lebih protektif

# Kesimpulan Survei

- 1 Nyeri menstruasi merupakan kondisi umum yang dialami mahasiswi.
- 2 Tingkat nyeri menstruasi responden cenderung berada pada kategori sedang hingga berat.
- 3 Pola hidup memiliki pengaruh terhadap tingkat nyeri menstruasi.
- 4 Pola makan menjadi faktor yang dianggap paling mempengaruhi nyeri menstruasi.
- 5 Sebagian besar responden memiliki pola tidur yang belum optimal.
- 6 Aktivitas olahraga secara rutin dinilai membantu mengurangi nyeri menstruasi.
- 7 Penerapan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, tidur cukup dan olahraga rutin berpotensi membantu mengurangi nyeri menstruasi.



# Langkah Nyata untuk Mahasiswi

01

## Tingkatkan Olahraga

Minimal 3-4x/minggu: yoga, jogging, atau senam ringan — lepaskan endorfin alami

02

## Kurangi Fast Food

Perbanyak buah, sayur, dan makanan anti-inflamasi untuk menekan prostaglandin

03

## Tidur Cukup

Target 7-8 jam/malam; jaga rutinitas tidur konsisten untuk regulasi hormonal optimal

04

## Kelola Stres

Teknik relaksasi (meditasi, pernapasan dalam) untuk mengurangi sensitivitas nyeri



# Referensi

[1] Armour et al. (2019). Exercise for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev, (9).

[2] Bernardi et al. (2017). Dysmenorrhea and related disorders. F1000Research, 6.

[3] Dehnavi et al. (2018). Effect of aerobic exercise on dysmenorrhea. J Educ Health Promot, 7(3).

[4] Gagua et al. (2012). Primary dysmenorrhea: prevalence & risk factors. JTGGGA, 13(3).

[5] Iacovides et al. (2015). What we know about primary dysmenorrhea. Hum Reprod Update, 21(6).

[6] Kemenkes RI. (2021). Pedoman Nasional Tata Laksana Dismenore. Jakarta.

[7] Purwandari & Wahyuningsih. (2020). Pola makan & dismenore primer. J Keperawatan Indonesia, 23(1).

[8] Yusuf et al. (2022). Faktor gaya hidup & dismenore primer. J Kesehatan Reproduksi, 9(2).

# Terima Kasih

*Pola hidup sehat dimulai dari pilihan kecil sehari-hari.*