### • 8 • (总 152)

### 

## 一、春夏气温高于体表常温的 发热病人宜汗

祖国医学认为,春季的主气为 风、在位属东,夏季的主气为暑、

知医以丸药下之",非也。不是"下之以不得利",而是"以不得利", "下之"后才引起下利。

## "蒸蒸而振,却发热汗出而解"。 (第149条)

这是对服小柴胡汤后邪从里往外透发的绝妙形容。"蒸蒸而振"、不是指汗出甚猛,也不是身体发振。"蒸"即有透发之意,骨蒸潮热之蒸就是这个意思。第248条之"蒸蒸发热者"、即汗后寒去热存,热邪从里往外透发而独热也。"蒸蒸而振"而"汗出",亦不等于战而汗出。

"热在膀胱,必便血"。(第

# 《伤寒论》"春夏宜发汗"管窥

631555 四川省合川县太和区卫生院 夏 斌

主题词 《伤寒论》 汗出

在位属南,风为阳邪,易袭阳位, 暑为阳邪, 其性炎热, 春夏属东属 南, 其候多风多热。《素问·阴阳 应象大论》曰"故东南方阳也"、 "阳胜则身热……汗不出而热", 《素问•生气通天论》曰"因于暑 ……体若燔炭,汗出而散"足见, 在春夏气温高于体表常温而法当外 解时, 多风多热的气候便是发汗散 热的有利条件。汗出之后邪随汗出、 正胜邪退,发热一止,病多能瘥。 发汗确属最佳治疗措施。倘将《伤 寒论》、《内经》及现代医学三者联 系起来研究,则不难看出"春夏宜 发汗"实系《伤寒论》之经验之谈, 其理论早在《内经》就基本形成,与 现代医学散热的认识也颇为一致。

## 二、春夏季节伤寒证候多在表 在外宜汗

《伤寒论》所论伤寒,与《素问·热论》"今夫热病者,皆伤寒 之类也"一样,属广义的伤寒。《伤寒论》重点阐述了外感风寒致病机

#### 293条)

"便血",指大便呈血样,即解血性大便,非为小便出血。在《伤寒论》凡言"便",均指大便或是小便,小便则直称为小便,或尿,从不称便,这是十分明确词。 "热在膀胱",为热在下焦之代词。 "热在膀胱中。《伤寒论》中,脏腑名称,并非均指相应的脏腑,脏腑名称,并非均指相应的脏腑,如不识此,读《伤寒论》必误。

(作者简介:姚廷周,男、28 岁。1984年毕业于广西中医学院, 现任广西凤山县人民医院中医师。) 

## 三、春夏宜投偏辛凉或寒热并 用之剂发汗

发汗药即解表药,发汗剂即解表药,发汗剂即解表有。肌表属太阳管辖,仍身常,则是表。《素者、《素者、以生类。《大治》,所应。。 "善治者,治皮毛,治病、治肌肤",所以《伤寒、发汗,所以《解外、解肌、解外、解肿、发病,种等说法及其相应治疗方药,并会病篇为多。

发汗解表剂一般分辛温、辛凉、 扶正三大类, 尤以辛温、辛凉运用 广泛。《伤寒论》辛温发汗方证虽 多,辛凉发汗或寒热并用发汗方证 亦不少见。如《伤寒论•可发汗篇》 太阳中风、表寒里热之大青龙汤证, 邪陷下利、表里俱热之葛根芩连汤 证等。即便是和解少阳之小柴胡汤, 也可当作发汗剂使用。《伤寒论· 可发汗篇》原文共47条,其中涉及 小桌胡汤者有4条、柴胡桂枝汤者 有 1 年。"伤寒论 · 太阳篇》曰"凡 桂枝汤证而下之, 若柴胡汤证不罢 者,复与柴胡汤,必蒸蒸而振,却 发热汗出而解",《伤寒论•阳明 篇》曰"阳明中风……脉续浮者, 与小柴胡汤"、"阳明病……舌上 白苔者, 可与小柴胡汤, 身濈然汗 出而解"。仲景既将小柴胡汤证置 于可发汗篇,又在其他篇章说小柴 胡汤服后汗出病解,实已表明小柴 胡汤具有发汗解表之功, 且发汗解 表绝非仅限于辛温之剂。

 此,"春夏宜发汗"之说,实际上 有春夏伤寒设当外解者宜投药偏辛 凉或寒热并用之剂发汗之涵义。

#### 四、结语

"春夏宜发汗"是《伤寒论》 在《内经》启迪下结合临床实践而 得的宝贵经验。这一经验之谈虽出 自《伤寒论》,却与现代医学散热 认识大体一致。细究其理,"春夏 (作者简介: 夏斌,男,47岁。 高等教育自学考试中医专业毕业, 现任四川省合川县太和区卫生院中 医主治医师。)

## 西洋参辨析

## 054900 河北省临西县中医院 秦广雨

西洋参滋补作用强,适用范围 广,深受人们欢迎。但因其价格昂 贵,一些不法分子以次充好、以假 冒真牟取暴利。其伪制品特别形象, 坑蒙害人。现将其形状特征及简易 鉴别方法归纳如下。

西洋参为五加科植物 的 干 燥 根,分进口与国产二种。

#### 【进口西洋参】

#### 【国产西洋参】

主根呈圆柱形或纺锤形,上部 带有芦头,但很少有地上茎脱落时 残留纤维或鳞状叶痕,支根也已除 去。表面淡黄棕色,横向皮孔呈唇 形稍宽微显突起。质地坚实而体重, 断面淡黄白色,形成层环纹色较深, 皮层树脂道多呈红棕色,其余与进 囗西洋参相似。

习惯上认为,质量好的西洋参 为条匀质硬体轻,表面横环纹紧密, 气清香且味浓郁。

### 【伪品】

- 2. **白芷伪制品**: 外形与西洋 参相似, 呈圆柱形或纺锤形, 有 有除去地上茎时留下的圆形疤痕。 表面黄白色或棕黄色, 有横纹明显。 表域,横向突起的疙瘩状皮孔明显。 质地坚脆体轻, 断面白色, 粉性, 木部较小, 占横切面三分之、苦 有黄棕色油点。气微香, 味苦。

此外,西洋参呈淡粉黄白色, 气香,味微苦而带甘。

(作者简介:秦广雨,男,31 岁。1982年毕业于河北省邢台地区 卫校中医专业,现任河北省临西县 中医院药剂科中药师。)

经典医籍析疑 ++++++