

溶液。雷丸为多孔菌科植物雷丸菌 *polyporus mglit-tae* Cook. et Mass. 的菌核, 主要成分是一种蛋白酶称雷丸素, 含量约 3% 为驱绦虫有效成分, 加热失效。此酶在 pH=7.8 溶液中作用最强, 酸性溶液中无效。雷丸驱绦虫作用不是麻痹虫体, 而是由于雷丸中的蛋白酶对蛋白质的分解, 致虫节破坏所致。

脑囊虫病的治疗, 既往多采用吡喹酮^[2]、丙硫咪唑^[3]口服给药的方法, 吡喹酮、丙硫咪唑治疗脑囊虫病普遍存在着疗程长、治愈率低、虫体产生抗药性、损害肝脏、易形成钙化灶等缺点。笔者采用了雷丸经提取溶囊素制得的无菌水溶液, 内含对虫体蛋白质具有选择性溶解的蛋白酶, 对囊虫等寄生虫有较强的杀灭作用。雷丸治虫疾历史悠久, 《神农本草经》曰: “主杀三虫”。《玉楸药解》曰: “清热疏肝, 杀寸白虫, 驱风除痫”。《陕西中药志》记载: “消积杀虫, 清热解毒。治虫积腹痛, 小儿疳积, 胃中热, 对绦虫病疗效较显著。”由雷丸中提取的有效分子植物蛋白溶解酶, 可使虫体蛋白溶解并吸收, 是我国传统中药学开出一朵奇葩。

溶囊素注射液较之吡喹酮、丙硫咪唑比较, 提高

了治疗效果, 减低了肝功损害, 同时使治愈后的脑囊虫病灶彻底消失, 不遗留钙化灶, 减少脑细胞异常放电, 使继发于脑囊虫病的癫痫消失。

本组 30 例患者治疗中, 均未发生用药后转氨酶升高副作用, 未发生因颅压升高停药现象, 从而提高了治疗效率, 解决了部分患者高颅压、肝功转氨酶升高而不能使用吡喹酮、丙硫咪唑的问题, 用溶囊素治疗脑囊虫病是一次很好的尝试, 在应用中药治疗囊虫病方面填补了一项空白。

参 考 文 献

- 1 马云祥, 等. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志. 1989, 7 (2): 134
- 2 杨淑芳, 等. 寄生虫病防治杂志. 1993, 6 (2): 155
- 3 魏德祥, 等. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 1992, 10 (2): 150

(作者简介: 王强, 男, 28 岁。辽宁沈阳市人。1995 年毕业于沈阳医学院, 现任沈阳市皇姑区第一人民医院、沈阳囊虫病研究所所长、病房主任。)

(收稿日期 1997-11-11)

丹梔逍遥散在妇科杂证中的运用

江苏省赣榆县中医院 (222100) 张志敏

主题词 丹梔逍遥散 妇科/中医药疗法

丹梔逍遥散, 又名加味逍遥散, 是治疗妇科经带胎产疾病的有效方剂, 用于妇科杂证疗效颇佳。

1 排卵期出血

韩某某, 女, 25 岁。1996 年 10 月 6 日初诊。

已婚半年未孕, 月经按期而至, 色红量较多, 5 日净, 净后 10 日左右又见出血, 淋漓量少, 1 周始净。妇科检查为宫颈息肉, 在某医院作手术摘除, 1 个月后又见漏红如故。舌淡红边光苔薄黄, 胸闷胁胀, 时有头晕、目眩、手足心热。药用丹皮 10g, 山梔 10g, 生地炭 10g, 黄柏 6g, 旱莲草 12g, 当归 12g, 赤白芍各 15g, 柴胡 8g, 薄荷 (后下) 6g, 白术 12g, 藕节 12g, 炮姜炭 3g。每日 1 剂, 水煎服, 经净后服用, 连服 12 剂至排卵期未见出血, 以后正常行经 2 个月, 现已怀孕。

按: 排卵期出血隶属漏红范畴, 血热为主要原因。乃气郁化火, 血虚发热, 用丹梔逍遥散解郁泻火, 养血柔肝, 加旱莲、生地、黄柏、藕节滋阴凉血止血; 炮姜能佐制诸药过寒, 诸药合用而效捷。

2 绝育术后粘连

樊某某, 女, 40 岁。1984 年 10 月 24 日初诊。

绝育 2 年, 少腹掣痛, 步履不适, 经行痛剧, 曾在某医院检查为“输卵管手术粘连”, 来院用中药治疗。刻诊经行第 2 日, 小腹拘急, 疼痛不能直腰挺胸, 经期尚准, 色紫有瘀块, 块下则痛减, 胸闷口苦胁胀, 舌边尖有瘀点, 脉细弦涩。药用醋白芍 25g, 炙甘草 10g, 柴胡 10g, 郁金 10g, 丹皮 10g, 山梔 10g, 当归 10g, 木瓜 12g, 丹参 10g, 红花 8g, 黄芩 15g, 白术 12g, 茯苓 15g。服药 4 剂后经中下瘀块较多, 少腹痛减, 上方去红花加首乌服至经前, 再加入红花、三棱、川芎服药 20 余剂, 少腹不再掣痛, 可参加一

般劳动。

按：本病多由患者自身特异性所决定，术后出现不正常的增生修复而致本病，属痛经等范畴。本例在经期先以通为主，经后则调气养肝，经前加活血通瘀之品，黄芪益气，推动血液运行，能调整自身免疫功能，利于粘连解除；重用芍药、甘草、木瓜酸甘化阴，缓急养血，在临床上有很好的止痛效果。

3 倒 经

李某某，女，19岁。1995年4月8日初诊。

17岁月经初潮，量少色暗，经前或行经之时，鼻衄色红量多，烦躁易怒，乳房作胀小腹胀痛，口干瘦黄、手足心热，在村卫生室用“1：1000肾上腺素”滴鼻未止，前来就医。观其衄血量多，急用止血消炎散外塞，肌注止血敏暂时血止。辨为肝经郁火，阳络损伤，拟清肝解郁止血。药用丹皮10g，山栀10g，川牛膝10g，白茅根20g，藕节炭10g，赤芍10g，柴胡8g，薄荷（后下）6g，炒白术12g，茯苓15g，车前子10g，当归炭10g，煅牡蛎（先下）20g，甘草梢4g，三七参（分吞）5g。4剂，水煎服1日1剂。药后血止，每月于经前1周再服本方，同时忌辛辣动火之品。连服2个月，月经期、色、量均正常，诸恙皆除。

按：肝为藏血之脏，主疏泄，肝气调达，肝血旺盛下注冲任为经血。若肝失疏泄，气郁化火逆而上冲，血随气逆故见倒经鼻衄，用丹栀逍遥散疏肝清热解郁养血，又合牡蛎、牛膝降逆引血下行；茅根、藕

节清热止血，因而获效。

4 妊娠子嗽

仲某某，女，24岁。1990年11月20日初诊。

妊娠50余日，半月来咳嗽频繁，痰少而粘，在某医院作胸透未发现异常。5日来咳嗽加剧，日夜不停，痰中带血色红，胁肋疼痛，口干胸闷，服用西药未见明显好转，究其病因平素性情急躁易怒，多愁善感，半月前因吵架始见咳嗽。舌红苔薄黄，脉弦滑数。拟清肝泻火，调气养血，化痰止咳。药用丹皮10g，山栀10g，黄芩10g，竹茹8g，青黛（冲）2g，海蛤壳（先下）15g，瓜蒌皮6g，紫苑10g，冬花10g，白茅根20g，柴胡10g，橘叶皮（各）10g，桔梗6g，当归10g，白芍15g。水煎服，每日1剂，4剂后咳嗽减，咯血除，胁肋亦不痛，继服4剂，现已足月顺产一女婴。

按：胎儿赖肝血滋养，孕后聚血养胎，肝血日渐不足，肝火易亢，木火刑金，郁怒伤肝更致火动。故见咳嗽痰中带血，取丹栀逍遥和黛蛤散以清金泻木。加竹茹、紫苑、花冬、瓜蒌皮化痰止咳，橘叶皮、桔梗理气宣肺；黄芩清热安胎；白芍、当归则柔肝养血安胎，故收效甚佳。

（作者简介：张志敏，男，36岁，江苏赣榆县人。1982年毕业于南京中医药大学中医专业，现任江苏省赣榆县中医院内科主治医师。）

（收稿日期 1997-10-29）

临 证 治 疗 慢 性 溃 疡 性 结 肠 炎 体 会

辽宁中医学院附属医院（沈阳 110032） 朱凤霞

主题词 溃疡性结肠炎/中医药疗法

笔者运用全国著名老中医王乐善教授之多年临床经验方加减变通，治疗慢性结肠炎，效果显著。现介绍如下：

〔例一〕 孔某，男，45岁。1992年7月29日初诊。

主诉：腹泻脓血便，伴有粘液已4年病史。肠镜检查，确诊为溃疡性结肠炎，症见腹平软，左下腹压痛（+），神清，舌质红苔白，脉沉弦。诊断腹泻（溃疡性结肠炎）。药用厚朴20g，芦根10g，滑石

20g，天花粉20g，黄柏15g，胡连15g，白芍15g，木香15g，甘草15g，炒椿皮15g，炒槐花15g。水煎服，共服16剂，3个月症状消失痊愈。

〔例二〕 董某，男，36岁。1996年10月11日初诊。

主证：腹痛泻，腹胀便不成形、肠鸣已6年，曾于1996年9月在沈阳第四人民医院做结肠镜确诊：慢性结肠炎。症见神清，面色黄，舌质红，苔白脉弦。诊断：慢性结肠炎。药用厚朴20g，芦根15g，滑石20g，天花粉20g，黄柏20g，胡连15g，白芍20g，木香15g，甘草15g。6剂，水煎服。