

食有不同程度的关节炎急性发作,复经上方治疗缓解,但至今不敢进高嘌呤饮食。

### 讨论

用药针对该病湿热瘀毒,方以二妙散加味。药物精炼,组方合理,在一定程度上改善体内pH值。加快嘌呤代谢,抑制尿酸合成,促使血尿酸从小便排出。沉积于体内关节、组织等处的血尿酸含量减少,红肿疼痛诸证随之缓解。在治疗过程中,对伴发尿酸结石者,该药改变了尿液环境,使得在酸性尿中形成的结石处于碱性环境中紧固性逐渐消失,容易松解,成小块状排出。如其中3例肾盂结石,均为1.8cm以上,治疗中或疗程结束后1周内先后各排出4~7粒黄豆大结石。

## 松香在临床的应用

洛阳市第二中医院(河南 470003)

许显武 许建欣

松香为松脂炼制而成,药源充足,价格低廉,用途广泛,实为临床之良药。余积40余年之临床经验,主用松香治疗烧伤、急性蜂窝织炎、慢性浅表性胃炎等病,均取得了显著疗效。现报道3例如下。

### 一、烧伤

王某某,女,60岁,农民。患者于1991年6月3日不慎用开水烫伤双下肢膝下至足踝部,其中深浅II°烧伤面积占全身20%,局部红肿,水泡,剧痛难忍,急送我院就诊。

处理:常规消毒疮面,刺破水泡,以经验方松及油涂抹患处。处方:松香60g 白及50g 五倍子50g 梅片15g 紫草20g,取麻油500ml炸五倍子、白及、紫草30min,过滤去渣,后入松香、梅片,浓缩至300ml,用毛笔将药涂于患处,疼痛立止,每日3~4次,保持疮面湿润,7日痊愈出院。

### 二、急性蜂窝织炎

李某某,女,15岁,学生。患者颈部右侧乳突下肿痛5天,伴畏寒发热口干,便秘,在外院诊断为“急性蜂窝织炎”。肌肉注射青、链霉素4天,肿痛蔓延至右下颌关节下方,被动引切开引流。家属恐影响容貌,遂于1989年8月10日转至我院要求中医治疗。查体温38.2℃,白细胞16000/mm<sup>3</sup>,中性80%,淋巴20%,乳突下肿块约8×9cm,质硬,触之无波动感。处方:松香40g 白及30g 朱砂12g 梅片12g 白薇12g,上药共为细末,醋调外敷患处,间日换药1次,6日肿痛消失而愈。

### 三、慢性浅表性胃炎

郭某某,男,36岁,某部通讯营干部。患者上腹部隐痛,腹胀3年,加重3个月。近年来因长途跋涉,饮食失节,致使上腹部间断性隐痛,胃中灼热,腹胀,恶心,泛酸,时有呃逆,食欲不振。虽经中西医屡次治疗久不取效。1991年11月4日来院求治。

查舌质红,苔厚腻,脉滑有力。胃镜提示:慢性浅表性胃炎。处方:松香10g(后下) 白及18g 五倍子10g 枳壳10g 木香6g 大黄6g 二丑6g 黄连2g 甘草9g,共5剂,每日1剂水煎服。1991年11月12日复诊,胃脘疼痛缓解,胃中灼热、腹胀、呃逆均减轻,食欲增加,舌苔已退。宗上方7剂,共为细末,每日2次,每次9g冲服,月余诸症消失而愈。

## 黄连素片治疗室性早搏 65例疗效观察

郑州市第四人民医院(郑州 45000) 苏思仁

郑州市中医院 张恩芝 刘贺玉

室性早搏是临床上常见的心律失常。自1990年1月~1992年9月,我们使用黄连素片对65例室性早搏患者进行了治疗,取得了较为满意的疗效。现报道如下。

### 临床资料

本组65例,全部为住院患者。男50例,女15例。年龄最小者22岁,最大者75岁,平均年龄49岁。其中冠心病31例,高血压心脏病20例,甲亢性心脏病5例,风湿性心脏瓣膜病5例,充血性心肌病4例。病程最短者3个月,最长者22年,平均3.5年。其中3个月~1年者35例,1~2年者15例,2~5年者10例,5年以上者5例。

### 治疗方法

本组患者,入院后先行血、尿、粪常规检查及肝、肾功能及X线胸片检查。高血压患者使用不影响心律的降压药物,使血压维持在满意的水平(18~16/12~14kPa)。心脏功能不全者,使用纠正心脏功能药物,使心脏功能改善至1~2级。甲亢则使用药物控制甲状腺功能,使心率低于110次/min。冠心病患者,使用扩张冠状动脉的药物,使心肌缺血得到改善。经过上述对症治疗后,仍有室性早搏持续存在者,选为使用黄连素片治疗的对象。此时停用一切影响心律的药物1周,做24h连续心电图记录后开始用药:黄连素0.4g,每日3~4次口服,每个疗程为10天。第一疗程结束后,复查血、尿、粪常规及肝、肾功能,重复描记24h心电图记录,对有效和显效者继续使用原剂量1个月,然后酌情减量维持,无效者可停药。

### 结果

疗效判定:室性早搏数量减少75%以上者为显效,减少50~75%者为有效,减少不足50%者为无效。结果:各种合并室性早搏的心脏病黄连素片疗效见附表。