Sep. 2006

抑郁症季节性发作的中医探讨

尉平平

(绍兴市疾病预防控制中心,浙江 绍兴 312000)

摘 要:通过经典中医理论学说揭示大自然环境对人体的 机能活动 产生的变 化,特别 是四时递迁,八节 更换对人的生理、心理带来了巨大影响。即"阴阳四时者,万物之根本也"。抑郁症季节性发作提示了情志活动的季节问题,对诊断和预防抑郁症起到了积极的作用。

关键词: 抑郁症; 季节性; 中医探讨

中图分类号: R749. 41 文献标识码: A 文章编号: 1009 -5276(2006) 09 - 1715 -01

《内经》云: "人以天地之气生, 四时之法成"。 自然时 空是生命的主宰。抑郁症季节性发作根源于自然环境季节 性变化。对于居住环境相对稳定的人群来说, 随时间变化 的自然因素就成为影响生命活动主要因素,故有"阴阳四 时者,万物之根本也。"中医的四时就是八节。即立春、立 夏、立秋、立冬和春分、秋分、夏至、冬至。也就是太阳在周 年视运动中所处于天空的八个不同方位,太阳在天空中不 断移动,对岸地球照射的角度发生了变化,由此引起地球上 光照时间与量的变化,使自然气候产生较多规律变化,产生 四时的递迁。在春分、秋分、夏至和冬至时太阳位于南北回 归线或赤道上,对我国来说,恰好是光照时间。《素问·至 真要大论篇》曰: 气至之谓之至, 起分之谓之分, 至则气同, 分则气异所谓天地之正纪也。张介宾注:"至则纯阴纯阳、 故曰气同,分则前后更易,故曰气异。"虽说冬至阳生,夏至 阴生,但此时仍然阴极或阳极之时,冬至前后寒冷严重,夏 至前后酷暑,其阴阳寒热波动不大,而春分和秋分则自然阴 阳之气交胜负之时, 自春分始自然界由阴气主令转为阳气 主令。至秋分始,自然界由阳气主令转为阴气主令。因而 以春分、秋分之时对人体的影响更大,在春秋节阴阳之气交 接注时的变化较为迅速, 气候寒热的转变对人的生理、心理 等方面都会带来巨大影响。若素体正气有亏, 五脏系统调 控能力不足,不能及时调整机体的功能,维持体内生理活动 的稳定,即可引起疾病的季节性发作或加重。抑郁症是情 感障碍的一种类型。抑郁情绪相当于中医的悲忧情志,抑 郁症的季节性发作提示了情志活动的季节问题。

《内经》曰: "人有五脏化五气, 以生喜怒悲忧恐", 这 就指出了情志活动以五脏精气为物质基础,是五脏机能一 种表现。五脏调控系统主持着人的生命活动,人体通过五 脏系统调节、控制使机体功能活动与四时阴阳消长相应。 脏腑气机在春夏升发、长旺,功能活跃,生机勃发,精神情志 也趋于兴奋,思维敏捷,活动增加。在秋冬收敛、闭藏、功能 低下,生机内藏,精神情志也趋于抑制,思维迟缓,活动减 少。五脏功能因时休旺,极易引起情志疾病的发生和发展。 从临床资料表明抑郁症发病的高峰基本处在春分、秋冬前 后。从趋势上看抑郁症在 8~10月份均呈上升之势,并且 在 9月到次年 1月的整个秋冬季节抑郁症发病较春夏为 多,而且前后呈上升趋势。从性别分析女性抑郁症发作以 10月、5月份为高峰期, 男性以 5月份为高峰, 由此说明自 然界的变化对人的抑郁情绪有较大影响。据权威人士分 析: 秋冬季节能促进大恼中的 5-羟色胺的物质分泌失常 从而引发季节性发病,并随着年龄的增长,病情的延长,抑 郁症也逐渐加重。因此情志学说是中医学理论的重要内 容,属于现代心理学范畴。在当今社会竞争日益加剧,社会 心理因素在各种疾病发生中的作用愈显重要, 因而深入研 究中医情志理论,探讨情志致病的机理及其影响因素,对抑 郁症的诊断和预防起到积极作用具有重要的临床意义。 参考文献:

- [1] 陈中舜. 精神疾患的季节变化 [J]. 国外医学·精神病学册, 1978 (4): 254
- [2] 扬海尔, 程毅, 刘淑华. 情感障碍与季节关系 [J]. 上海精神医学, 1991, 3 211

方药: 麻杏石甘汤加减: 麻黄 10g 杏仁 15g 石膏 30g 甘草 10g 薏苡仁 30g 黄芩 20g 连翘 15g 川贝 10g 大青叶 30g, 7 剂水煎服, 且联合静点抗感染药物青霉素 800万 U入生理 盐水且冲击地塞米松注射液 10mg连续静点 3天, 静点第 2 天体温恢复正常, 1周后诸症状改善; 后续中药温肺益气活血通络之法, 生姜甘草汤加减, 方药: 生姜、甘草各 20g 白术 15g 黄芪 25g 丹参 20g 当归、川芎、赤芍各 15g 丹皮

收稿日期: 2006 - 03 - 17

作者简介: 尉平平(1959-), 女, 浙江绍兴人, 副主任中医师, 研究 方向: 中医内科及妇科疾病临床诊治。 10g 地龙 15g 10剂水煎服。随访 1年病情稳定无变化。

小结: 恶性肿瘤放化疗后, 为邪毒侵袭机体, 耗伤气血, 损伤正气, 气血虚弱, 抗邪力低下, 则病邪易入里, 且邪气易扩散, 病情易恶化, 且吸收消散慢。故恶性肿瘤患者放化疗后应给予积极扶正免疫提高治疗, 同时预防感冒, 防止感染的发生, 以减轻并发症的出现; 中西医结合防治放射性肺炎, 对其发生发展及预防有理想疗效。

参考文献:

[1] 王旬国, 孙福銮, 刘日芬. 恶性肿瘤非手术治疗常见并发症防治 [M]. 北京: 科学文献出版社, 2005