扶正培本法治疗恶性肿瘤探讨

华海清 (解放军第八一医院全军肿瘤中心内科,江苏南京 210002)

摘要:扶正培本法是中医治疗恶性肿瘤的重要法则之一,其应用的理论基础为肿瘤发生发展过程中存在着"虚证",表现为脏腑功能失调,气血阴阳混乱,机体抗病能力下降。在治疗上,常与手术、化疗、放疗等配合应用,亦可根据病情单独使用,临床应根据患者体质状况及不同的病期等情况灵活应用,应注意各种补法之间的相互配伍及与清热解毒、以毒攻毒、活血化瘀、软坚散结、祛湿化痰等祛邪方法的配合应用。长期应用扶正培本法将有助于调整机体免疫状态,稳定内环境平衡,防止癌细胞的浸润与转移,改善患者生活质量,延长生存时间。

关键词:扶正培本法;肿瘤;虚证;理论探讨;临床应用

扶正培本法是中医治疗恶性肿瘤的重要法则 之一,所谓'扶正',就是扶助正气,所谓'培本'就 是培植元气,提高机体的抗病能力,扶正培本法实 际上就是通过对肿瘤患者的阴阳气血的扶助补益 与调节而改善肿瘤患者的'虚证'状态,从而达到 防治肿瘤的一种法则,它不单指应用补益强壮的 方药,而且还把调节人体阴阳平衡,气血、脏腑、经 络功能的平衡稳定,以及增强机体抗癌能力的方 法都包含在内,因而中医的"补之、调之、和之、益 之"等都属于扶正范畴"。近年来,随着对肿瘤发 病机制认识的日益深入,肿瘤被认为是一种'慢性 病'的观念已逐渐为人们所接受,治疗上不再过分 追求'杀灭癌细胞',而更重视'带瘤生存',与瘤和 平共处,提高患者的生存质量,延长生存时间,因 此注重'正气'在邪正抗争中的作用显得尤为突出 和重要,需要我们在肿瘤的治疗实践中加以重视, 以更好地提高临床治疗效果。

1 肿瘤存在'虚证' 是扶正培本法应用的理论基础

"虚证"从狭义来说,是指脏腑气血阴阳的不足,如气虚、血虚、阴虚、阳虚;从广义来说,脏腑功能失调,气血阴阳混乱,导致机体整体抗病能力下降,均可概括在"虚证"范畴。可以说,虚证贯穿在肿瘤发生、发展的全过程中,对肿瘤的消长起着关

键的作用。

1.1 肿瘤患者存在'虚证'是肿瘤发生的根本原因

正常情况下,机体处于一种脏腑协调、气血和 谐的状态中,即所谓'阴平阳秘'的健康状态,但一 旦这种平衡因内外因素被打破,就会出现'阴阳失 调',机体抗病能力下降而发生各种疾病,故《内 经》有云:"正气存内,邪不可干";"邪之所凑,其气 必虑',表明了正气在邪正交争中的重要作用, "虚"是导致疾病发生的根本原因。肿瘤的发生亦 不例外,机体由于"虚"的存在,可导致邪气盘踞, 阻滞气血运行,日久而积聚成块,结而不散,形成 肿瘤。现代研究表明,大多数肿瘤患者存在先天 免疫功能缺陷或后天失调,导致机体防御功能下 降,对外来致病因子抵御不力,对出现的异己细胞 (癌前细胞或个别出现的异己细胞)未能司其监 视、排斥和歼灭的职能,最终导致癌细胞无限制牛 长而产生肿瘤。这与中医对肿瘤发病的认识是完 全一致的。

1.2 肿瘤在发展变化的过程中始终存在'虚证'

肿瘤的发生发展过程,始终是一个邪正较量的过程,一旦正气虚弱,或正气虽强,但邪气太盛, 正气相对偏弱,正气不敌邪气,正气逐渐耗损,则 无法抑制肿瘤的生长而导致病情不断进展。而肿

收稿日期:2007-10-10;修稿日期:2007-11-10

作者简介:华海清(1961-),男,江苏江阴人,解放军第八一医院全军肿瘤中心内科博士后,主任医师。

块的不断生长,不仅会压迫所在的脏腑,导致脏腑 功能失调、气血紊乱,甚至会发生远处转移而导致 多脏器功能的衰竭;另外,肿瘤还会释放多种毒素 耗伤气血,消尽机体的养分,最终导致患者"正气 乃竭'而死亡。以肝癌为例,多数肝癌由慢性乙型 肝炎、肝硬化演变而来,慢性乙型肝炎、肝硬化是 肝癌的癌前病变,根据临床资料,这些患者的脾 虚、脾虚湿困、脾虚气滞最为多见,应用健脾化湿、 健脾理气等方法可取得较好疗效。亚临床期,相 当干甲胎蛋白持续低浓度阶段,这些患者亦以脾 虚或脾虚湿阻为常见,应用健脾为主的方法治疗, 其肝癌的发生率在2.8%,而未治疗组的肝癌出 现率在10%以上,两者差异十分明显2,而到了 肝癌晚期阶段,患者神倦乏力,胸闷气短,面色无 华,纳差腹胀,下肢浮肿,则虚证的表现更加突出, 因此有学者认为,在肝癌整个病程中,大约70% ~80%的病例是以虚证或虚中夹实证为主3。有 报道通过对292例癌症患者进行辨证分析,发现 属实证者 7.53%,正虚邪衰者占 37.33%,虚证占 55.14%4,提示正气虚衰是中、晚期癌症患者的 主要证候表现。第二,虚证的产生,还与采用的治 疗手段如手术、放疗、化疗密切相关。手术的创 伤、脏腑的缺损、失血耗液、麻醉刺激、伤口疼痛 等,都会给机体带来不同程度的伤害,出现虚证表 现,如术后常会出现卫表不固,虚汗淋漓,或动则 汗出,头昏乏力,或脾胃虚弱,不思纳食,腹胀,大 便稀溏;或见面色无华,心悸气短,失眠多梦,纳谷 不香等气血不足的表现;亦可出现阴液亏损,低热 或手足心热,心烦口渴,大便秘结等症。又如化 疗,其最大的缺点是'敌我不分',在杀灭肿瘤细胞 的同时,亦会伤害机体的正常细胞,导致患者体质 虚弱,免疫功能低下,生活质量下降。

2 扶正培本法的临床应用

2.1 与手术治疗的结合

2.1.1 术前应用扶正培本法

其应用目的是通过应用补益中药以改善患者的虚弱状态,增加手术的切除率,适用于患者虚弱症状较为明显,不适宜立即手术的患者。宜根据患者气血阴阳不同的表现,选用补气养血、滋补肝肾等药物,常用十全大补汤、四君子汤、八珍汤、六味地黄丸等。

2.1.2 术后的扶正培本治疗

(手术的创伤、脏腑的缺失或缺损均可导致脏。)

腑功能减退,气血津液耗损,出现各种不同的虚证 或虚实夹杂表现。临床须根据不同的情况进行辨 证治疗,如术后腹部胀气,大便不通,排气减少,治 当以健脾行气,代表方如香砂六君子汤,药如党 参、白术、茯苓、半夏、陈皮、木香、砂仁、甘草等;若 脾虚失运,不思饮食,腹胀,大便稀溏,则用健脾益 气法,方用四君子汤加减,药如炙黄芪、党参、白 术、茯苓、陈皮、甘草等;术后卫表不固,虚汗淋漓, 或动则汗出,头昏乏力,可用玉屏风散加减,药如 炙黄芪、白术、防风、五味子、浮小麦、炒白芍、炙甘 草等;术后气血不足,面色无华,心悸气短,失眠多 梦,纳谷不香,常用八珍汤加减,药如党参、白术、 茯苓、当归、白芍、熟地、川芎、阿胶、甘草等;如术 后阴液亏损,低热或手足心热,心烦口渴,大便秘 结,常用增液汤加减,药如生地、玄参、麦冬、石斛、 知母、全瓜蒌、麻仁等。

2.2 扶正培本法与放射治疗的结合

放射治疗过程中,由于射线属杀伤性物质,对 人体的伤害很大,全身反应常见神疲乏力、头痛眩 晕、厌食、恶心、呕吐、白细胞下降等;局部反应根 据照射的部位不同,可以出现不同的表现,常见的 反应如皮肤红斑、干裂或潮湿糜烂,毛发脱落,口 腔、咽腔及消化道糜烂、溃疡、水肿或出血,放射性 肺炎及肺纤维化,放射性直肠炎,放射性脊髓炎、 关节强硬等,这些毒副反应通过中医扶正培本的 配合治疗可以得到减轻或消除,有些扶正培本中 药还有增加射线敏感性的作用,从而可以增加放 疗的效果。由于射线属火热之毒,易耗伤人体阴 津,日久又可耗伤元气,故临床尤以热毒阴伤、肝 肾阴虚、气阴两虚最为多见。属热毒阴伤者,常用 清营汤加减,药用银花、连翘、竹叶、天花粉、黄连、 生地、玄参、麦冬、白花蛇舌草等;肝肾阴虚者,常 以知柏地黄汤加减,药如知母、黄柏、生地、山萸 肉、炒白芍、丹皮、当归、沙参、枸杞子、麦冬等;气 阴两虚者,可用生脉饮加减,药如太子参、麦冬、五 味子、沙参、石斛、玉竹、黄精、天花粉等。

2.3 扶正培本法与化学治疗的结合

化疗的毒副反应较为严重,这是影响化疗疗效的最主要原因,用中医扶正培本法配合治疗可以明显减轻化疗的副作用,增强化疗效果,提高化疗的完成率。常用健脾和胃、调补气血、滋补肝肾等方法。如化疗出现纳差、腹胀、大便稀溏等,属

P.J.脾虚湿困者,可用参苓白术散加减,药如炙黄芪 N.J.

党参、白术、茯苓、陈皮、白扁豆、淮山药、木香、砂仁、炒谷麦芽等;如白细胞低下,血小板低下或贫血者,属于气血不足者,可予以益气养血,补髓升白,药如炙黄芪、党参、白术、茯苓、当归、炒白芍、熟地、阿胶、补骨脂、鸡血藤等;如属肝肾亏虚,则可以滋补肝肾,一贯煎加减,药如生地、熟地、枸杞子、沙参、当归、麦冬、女贞子、炙龟板、鳖甲等。

2.4 手术、放化疗后的扶正培本治疗

手术及放化疗疗程结束后,患者实际已进入 康复期,此时有目的地进行针对性的扶正培本治 疗十分重要,一可以抑制或杀灭残留的癌细胞;二 可修复因手术、放化疗而造成的气血津液损伤,纠 正内环境的失调;三可提高机体免疫功能,预防癌 症的复发与转移;四可改善患者的临床症状,减轻 患者痛苦,最终达到提高患者生活质量,延长生存 的目的。临床用药常根据病人的体质状况、肿瘤 的病期、手术及放化疗的程度、是否有远处转移等 情况综合考虑,如属癌症早期,已行根治手术,或 已行术后辅助放疗或化疗,癌细胞已基本清除,这 时中药调理主要以提高机体免疫功能为主,以预 防肿瘤的复发与转移,常用八珍汤加减,扶助正 气,调补气血;如癌症已入中晚期,进行了姑息性 切除,并进行了放化疗,或肿瘤虽然已全部切除, 但已有淋巴结转移或远处转移,这时治疗上必须 扶正与祛邪并重,在八珍汤等补养气血的基础上, 加具有抗癌祛邪的药物,如山慈菇、莪术、白花蛇 舌草、全蝎、守宫、昆布等,以抑制肿瘤的发展势 态。实践证明,通过扶正培本的综合调理,可以减 少术后患者的复发和转移,提高中晚期患者的生 活质量,延长生存期。

2.5 不能手术及放化疗患者的扶正培本治疗

恶性肿瘤进入晚期,已完全失去手术或局部治疗机会,亦不能承受放、化疗等强烈手段治疗,中医药就成为治疗恶性肿瘤的主要方法。由于肿瘤负荷的日益加重,正气亦越来越虚衰,这时的治疗已十分棘手。过攻则正气益衰,有可能使病情进一步恶化;但过补又难以控制肿瘤的继续发展,因此常采用攻、补兼施,或攻补法交替使用,常用的攻法如以毒攻毒法、活血化瘀法、软坚散结法、清热解毒法等,扶正培本法则常针对患者气血阴阳的不足,施以补气、养血、滋阴、温阳等方法,以减轻患者的衰弱状态,改善症状,减少患者痛苦,

尽可能的延缓病情的发展,带瘤生存,延长患者的生存时间。常用的方如补气的四君子汤、补血的四物汤、补阴的六味地黄汤、补阳的金匮肾气丸等。临床须根据表现的不同,酌情配伍,审时度势,方能收到满意的疗效。

3 扶正培本法临床应用的注意事项

3.1 注意各种补法之间的相互配合

由于肿瘤病情的复杂性,临床上各种虚证之间往往互相兼夹,如气阴两虚、气血两虚、阴阳两虚等,故治疗上各种补虚方法要注意相互配合;其次还要注意各种不同脏器的虚弱状态,如肺肾两虚、肝肾两虚、脾肺气虚等,选用对相关脏器有补益作用的药物,进行合理应用,做到相辅相成,相得益彰,以提高临床疗效。

3.2 注意与其他方法之间的配伍应用

临床病情千变万化,虚实之间亦常相互兼杂, 互为因果,因此必须根据患者的临床表现仔细明辨,根据实证的不同表现,相应配合清热解毒、以 毒攻毒、活血化瘀、软坚散结、祛湿化痰等法治疗, 如能根据患者的体质状况、病情的不同阶段,把握 好扶正与祛邪之间的"度",该攻则攻,该补则补, 临床易获得满意的疗效。

3.3 合适的应用时间

扶正培本药物到底用多少时间较为合适?目前无循证医学的依据,根据个人的经验,短时间的使用疗效相对较差。因癌症从细胞发生变异到基因突变,肿瘤形成,并导致机体功能失调,内环境紊乱,实际上是一个漫长的过程,要纠正这种状态,不可能一躇而蹴,需要有较长的一段时间,特别是用于防止癌症术后的复发与转移,长期服用对调整机体免疫状态,稳定内环境平衡,防止癌细胞卷土重来有着十分重要的作用。当然,有些扶正培本药物较为昂贵,极个别的药物还会产生不良反应,临床需要根据患者的具体情况分别对待。参考文献:

- [] 花宝金, 朴炳奎. 肿瘤虚证及扶正培本的现代免疫机制研究 J]. 哈尔滨商业大学学报, 2001, 17(1):5.
- [2] 许凯黎·上海市区十一万五千职工甲胎蛋白血凝普查 肝癌及其随访小结 J]·肿瘤防治研究,1977,(2):8.
- [3] 邝安堃, 沈自尹, 王文健. 虚证研究 M. 上海: 上海科学技术出版社, 1991. 291.
- [¶ 郑显明·扶正培本法在癌症治疗中的应用和地位 J] · 云南中医杂志,1994,15 (4) 14 .

(编辑:徐力)