

王以文运用马钱子的经验

宋力伟

(丽水市中医院, 浙江 丽水 323000)

关键词: 马钱子; 治疗应用; 名医经验; 王以文

中图分类号: R282.710.7

文献标识码: A

文章编号: 1009-5276(2006)04-0608-01

先师王以文(1906-1986), 主任中医师, 系浙江省1983年首批名老中医之一。早年毕业于上海中国医学院, 治医50余载, 学验俱丰。临证善用大毒之品马钱子屡建功效, 现举其验案数则介绍如下。

1 马钱子治疗食道息肉伴溃疡

朱某, 男, 45岁。1981年2月10日初诊。近半月来感觉胸骨后隐痛, 进食时则有梗阻感, 吃固体食物尤觉不舒, 餐后脘下饱闷, 时有恶心呕吐, 嗝气泛酸, 胃纳明显减退, 苔黄腻, 脉滑略数。胃镜示“食道中下段息肉伴溃疡(棱形小指节大小息肉1块, 长约1.0cm, 宽0.6cm, 中间有一直径约0.5cm之圆形溃疡)”。辨证为热毒瘀结, 胃气不降。治以清热解毒, 祛瘀散结。马钱子粉0.5g(分2次吞服), 威灵仙15g, 焦栀子、枳壳、浙贝母、海螵蛸、茯苓、白芍各10g, 生甘草、川连、炮鸡内金各6g, 蒲公英30g, 硼砂(分冲)1.5g。服药20剂, 胸骨后隐痛消失, 吞咽食物较顺利, 仍有嗝气, 食欲欠佳, 上方加佛手10g, 炒谷牙、麦芽各15g, 马钱子粉0.6g(分2次吞服)。上方加减治疗3个月, 自觉症状全部消失, 胃镜复查“食道中段疤痕, 下段轻度炎症, 对比明显好转”; 遂停服汤药, 予马钱子粉0.6g(分2次吞服), 续治3个月, 1981年10月5日胃镜复查, 示“食道中下段疤痕伴色素沉着、表面欠平整, 未见溃疡”。后未再服药, 至今身体健康。

2 马钱子治疗阳痿

梅某, 男, 50岁。1983年5月2日初诊。患者诉阴茎不能勃起6年余, 素体尚健, 性情较急躁, 纳便如常, 惟舌质有明显瘀点, 苔薄白, 脉沉细, 询知夫妻关系紧张多时。辨证为肝气久郁, 气血不和, 脉络瘀阻, 阳气不达使然。治以活血开郁, 通络振痿。马钱子粉0.4g(分2次吞服), 蜈蚣2条, 穿山甲、九香虫、蛇床子、柴胡各10g, 郁金、枸杞子各15g, 生甘草6g。药进20剂, 阴茎晨起稍能勃起, 但不能同房, 予原方加虫10g, 马钱子粉0.6g(分2次吞服), 治疗1个月。随访多年, 愈后未复发。

3 马钱子治疗乳腺小叶增生

陈某, 女, 26岁。1982年9月15日初诊。患者平素月经无定期, 经前常感胸胁及乳房胀痛。近2个月来, 两侧乳房发现肿块, 边缘有小结节, 按之疼痛, 妇科诊为“乳腺小

叶增生病”。询知平素性情急躁, 易于动怒, 纳便尚调, 苔薄黄腻, 脉弦滑, 辨证为肝气郁滞, 疏泄失利。治以疏肝清热, 活血散结。马钱子粉0.5g(分2次吞服), 柴胡、焦栀子、牡丹皮、皂荚刺、穿山甲各10g, 当归、赤白芍各12g, 生牡蛎(先煎)30g, 生甘草6g。服用20剂, 乳房胀痛消失, 结节明显缩小, 后按上方稍事出入, 马钱子粉(0.6g分2次吞服), 共治疗2个月, 乳房肿块基本消失。

4 马钱子治疗癫痫

徐某, 26岁。1983年8月12日初诊。患者5个月前无明显诱因, 突然昏倒, 不省人事, 眼球上翻, 牙关紧闭, 口吐白沫, 继则四肢抽搐, 约5min后苏醒如常人, 此后如斯者月发6~7次, 脑电图检查符合“癫痫”诊断, 予苯妥英钠治疗无效。近来癫痫发作多在夜间, 头昏, 心慌, 精神恍惚, 苔薄腻, 脉细滑。辨证为心脾不足, 痰浊羁居, 风阳挟浊阴上扰清窍所致。治以通络开窍, 豁痰熄风, 调补心脾。马钱子粉0.4g(分2次吞服), 僵蚕、钩藤(后下)各12g, 生甘草、石菖蒲各10g, 小麦、郁金、代赭石(先煎)、夜交藤各30g, 朱砂(分冲)1.5g, 白矾(分冲)3g并嘱停服苯妥英钠等药。服上方30剂, 病发1次, 症较前轻微, 口吐少许白沫, 未发生抽搐, 约2min苏醒。原方再进30剂, 病证未再发作, 后停汤药, 马钱子粉0.5g(分2次吞服), 续服3个月, 以巩固疗效。后经随访, 愈后至今未复发。

5 讨论

马钱子, 又名番木鳖, 性味苦寒, 有大毒, 入肝脾二经。功能清血热, 通经络, 止疼痛, 散结消肿。《串雅补》云: “此药走而不守, 有马前之名, 能钻筋透骨, 活络搜风, 治风痹……, 遍身骨节疼痛, 类风不仁等证”。张锡纯盛赞其功效说: “其开通经络, 透达关节之力, 实远胜于他药也”。先师运用经验: 先将马钱子用清水浸泡10天, 刀片剥去外皮, 切片后用香油煎至棕黄色为度, 研磨成细末。用法用量: 一般病例成人1日0.4~0.5g, 分2次饭后开水送服, 严重病例1日用0.6g, 极量不得超过0.8g。本品治疗量与中毒量临界值相近, 故先予较小剂量观察, 2周后再行逐渐加量; 若出现肌肉蚁行感或轻微颤动为有效反应, 不可再行加量, 否则容易中毒。服药过程中出现头昏、头痛, 四肢颤抖明显, 甚或抽搐, 牙关紧闭, 为中毒反应, 即应停药, 并可灌服温开水或白糖水, 亦可用肉桂30g急煎服, 有缓解之功。

先师认为马钱子虽为大毒之品, 只要辨证准确, 炮制得当, 掌握剂量, 服法妥善, 注意观察, 历数10年临床应用, 未曾出现中毒现象, 且屡奏奇功。

收稿日期: 2005-10-05

作者简介: 宋力伟(1961-), 男, 浙江丽水人, 副主任中医师, 主要从事中医肝病、男性病临床研究。