名 医 经 验

温胆汤在临床上的应用

300480 天津市汉沽医院 张先五 整理:张沛生

温胆汤/治疗应用



张先五主任医师

作者简介: 张先五,男,生于1916年,卒于1988年,河北省玉田县人。自幼随当地名医、族伯张玉峰学医,23岁时自办济生堂诊所,1956年组建天津市汉沽医院中医科并任主任。他遵古而不泥古,博采众家之长,以形成其独特的临床风格。从事中医临床医疗工作50余年,对中医内科、外科、儿科、妇科的多种疑难病症,有丰富的临床经验。其遗稿《临床琐谈》,约24万字,目前正在整理之中;发表有较高学术水平的论文多篇。曾任天津市汉沽医院中医科主任、主任医师。

主题词 眩晕/中医药疗法 中风(中医)/中医药疗法

 茯苓,是后世医家加入茯苓于其中, 借以健脾利湿、宁心安神,使本方 疗效更著。

古人认为, 胆为清净之府, 喜 宁谥、恶烦扰, 喜柔和、恶抑郁。 由于久病之后,往往有痰饮郁蓄未 能尽消,或胸膈间余热未清,或胸 胁气机失和, 郁而化热煎津生痰, 而现诸症蜂起。胆以温为候, 虚则 寒,寒则不眠,惊悸亦由于胆虚,

囿于准绳"。但对阴虚血热或气虚、 血虚之月经过多、崩漏、应注建过 6 克,如剂量过大,血就不能归其所 归。此外,治疗出血证时,如在养 证论治的处方中适当加用一些养 之品,如阿胶、龙眼肉、党参等, 则疗效更佳。

多用于治疗各种出血及月经不调兼 大便溏泻者。

前人还有当归头止血、当归尾 破血、当归身养血、全当归活血之 说,用时也有区别。但目前药房一 般不予区分,这无疑会影响疗效, 应予改进。

虚火上溢,故口苦呕吐,多属半表 半里之少阳之邪, 胆虚气郁致脾生 痰涎而烦呕。方中, 取半夏之辛温 性燥以袪痰燥痰为主药,并因气滞 以陈皮和气袪痰, 茯苓健脾利湿, 湿去痰消, 甘草补土和中、调和诸 药。以上四味为"二陈汤",是治 疗痰饮之常用主方, 配加竹茹清脾 胃之郁热,枳实疏气并助半夏除痰。 方中并无治胆之药, 但全方具有清 痰利气、调达气机之功, 气机调和 则胆之痰热自去, 邪去则正安。那 为何不叫清胆汤呢? 古人认为, 肝 属刚脏,体阴而用阳,性喜条达而 恶抑郁, 胆附于肝为腑, 喜宁静而 恶烦扰,由于肝胆之气俱有生升之 特性,以舒畅条达为平,温则胆条 达,故名"温胆汤"。但从临床及 处方用药分析, 本方不寒不燥, 其 性平和, 实无温胆之药, 与温脾、 温肾等温法之意完全不同,因此《医 方集解》将其列为和解门类,属于 调和肝胃的方药。本文就温胆汤在 临床上的应用予以探讨。

一、眩晕

经云:"诸风掉眩皆属于肝." 丹溪云:"无痰不作眩"。笔者认 为,忧郁思虑过多,可使肝阴耗损、

annin anni

心脾内伤;饮食不节,则脾胃受伤、精微不化、聚湿成痰。故痰因火动,上扰清窍,而发为此病。 其病机为风痰虚火所致。 对痰浊上扰、肝阳偏亢者,治宜化痰开窍熄风法,方溢胆汤加珍珠母、石决明、地龙、蜈蚣、胆星、钩藤。

二、中风

中风病主因体内阴阳偏胜、气血逆乱而成,多为心、肝、肾三脏及其经络失调所致,其成因较复杂,但痰火相煽、肝阳上亢、风痰热热阻滞于经络乃为主因。宜用温胆汤治之,并加蜈蚣、竺黄、地龙通鸦。 大鄉仁、红花活血化瘀,钩藤烟及清化痰热。

三、肝阳上亢

四、胁痛

五、胸痹

胸痹语出《金匮要略》,其病机为素体阳虚、胸阳不展、感受寒水或饮食不节所致,阴寒痹阻与痰湿内蕴闭阻胸间均可致胸痹。《金匮》等多采用瓜蒌薤白白酒汤等治疗。但笔者认为,用除痰化浊、活血化瘀法治之收效甚佳,急性期用

温胆汤合失笑散加郁金、菖蒲、丹参,症状好转后则根据病久体虚,前方去灵脂、蒲黄,加东参、白术、砂仁等扶正祛邪之品。

六、抽搐

七、梅核气

梅核气称气痰,多由七情郁结、 脾失健运、水湿停聚而生痰、痰凝 气滞上逆咽喉之间而发病。治疗应 以气、火、痰所胜所不胜为要点, 以温胆汤为主治之。若气胜者,加 重舒理气机之品,如川朴、枳壳、 瓜蒌、沉香等; 火胜者, 侧重清泻 胆胃之药,如胆草、胡连、山栀、 黄芩、木通、石膏等; 气郁化火生 痰者,则加祛痰清化开泻肺气之品, 如苏子、川贝、杏仁、桔梗、桑皮、 蒌仁等; 日久燥化伤阴者, 加养阴 救燥之品,如二冬、知母、生地、 玄参、沙参、枇杷叶、藕节等。对 于患病时间较长者,除药物治疗外, 还需耐心解释病情, 以解除患者的 心理负担。

八、癭瘤

多因饮食五味过偏或因情志郁结,气物化火,痰热聚积,阴上扰、疾热聚积,阴上扰、疾热取积,则上,阴阳上扰、疾、独阻滞,则现诸多甲状腺机能亢、疾、性症。宜清化痰热平肝潜阳、柔、进治之,钩藤、玄参等平肝熄风、咸寒软坚之品。

九、妊娠恶阻

笔者认为, 妊娠恶阻有因脾胃 素虚而发, 有因胆热而发, 亦有因

痰滞所扰而发,但此三因皆同痰有 关。经云:胃乃胞之大会,受孕之后 冲脉之气挟痰湿上逆, 以致呕吐厌 食。治疗以降逆理气和中为主,予以 温胆汤为主的自拟"竹茹安胎饮"。 临床疗效其佳。药用竹茹10克、半 夏10克、陈皮10克、麦冬10克、砂 仁10克、白术10克、黄芩10克。如 呕吐严重且服此方不效者, 加赭石 30克,以镇逆和中:便燥尿赤心烦、 舌质红者,加白蜜30克、白芍10克; 肝气郁结、胃失和降者,加川楝10 克、香附10克;腹痛便溏者,加台 参10克,并重用白术。传统上认为赭 石、半夏为妊娠禁药, 医者常不敢 擅用。经云:有故无殒,亦无殒也。 若孕五月以上发胃病者应慎用,但 呕逆重者亦可选用。

十、失眠

小 结

(作者简介:张沛生,男,39岁,系张先五之子。自幼随父学医,1975年毕业于天津医学院医疗系。现任天津市汉沽医院主治医师。)