名医经验

孟宪民教授是我院名老中医之一,颇有建树。晚年又为指导博士研究生辛勤工作。笔者有幸拜孟老为师,实感荣幸。现将随师临证学习其治疗头痛经验介绍如下。

头痛是临床常见病、多发病之 一。病人自觉症状明显,然一部分 病人查不出明显病因,病人十分痛 苦,严重影响工作和学习。历代医 家对头痛的病因、病机论述较多, 但不外乎两大类。 一为外感 头痛, 以感受风、寒、湿、热等外邪,而 以风邪为主,所谓"伤于风者,上 先受之",巅高之上,惟风可到, 故外邪自表得袭于经络,上犯嶄顶, 清阳之气受阻, 气血不畅, 阻遏络 道,而致头痛;二为内伤头痛,脑 为糖之海,主要依赖肝肾精血濡养, 乃胂图坛化水公蜂御、输布气血、 上充于肺,故内伤头痛与肝、胸、 肾三脏有关。孟老在遵循古人经验 基础上,十分注意辩证施治,同时, 强调疾病的发生与社会、家庭、情 志、饮食甲素有密切关系,提出时、 地、人、病、症下红今。

收集的床键全病例共25例。其中,上超下面型10例、疲气和结型6例、肝肾阳虚型9例、分别以头痛十昧药加减,温胆汤加减、一贯煎加减治之,均此到很好疗效。

### 一、上盛下虚型

【病例一】李××,男、53岁。 头痛8年,伴有热胀感.眼干, 口干,小便黄。舌质红,苔黄,映 弦。血压190/120毫米汞柱。虽然 多法治疗, 业癖仍不缓解,口服降 压药血压有时降至150/100毫米汞柱,病人十分病苦。

治宜清上导下、镇肝港阳、理气止病、方用头痛十時折加减。

此方为潘代医家罗藏阁《医话》 所载之方, 共兵美中老中医推荐治

# 孟宪民治疗头痛经验

110032 辽宁中医学院附属医院 刘 明 李敬林

主題词 头痛/中医药疗法 疏风 清热

疗之头痛十味药。孟老在此基础上, 药味、药量略有更改,将方中苦丁 茶南药去掉,根据病情不同增减药 物剂量,在上方基础上加牛膝 15克、 生赭石30克、茵陈 15克。

【按】"头为诸阳之会,位高 气清, 当以轻剂与之, 取火郁发之 意也",是孟老治疗头痛的主导思 想。用此方, 意在取清轻之剂易于 达头部,桑叶、菊花、薄荷清轻之 剂,以疏风清热、清肝明目。黄芩, 清中焦之火: 连翘、夏枯草、清肝 泻火、散结止痛:荷叶,升发阳气; 白茅根、清热利湿,浊邪从小便而 出;白芷、蕙本,载诸药上行騿顶; 生赭石、茵陈, 舒肝理气、镇肝潜 阳,从而达到清上导下之目的。病 人服药 3剂,上症明 显减轻,妖感 觉口干、乏力。在上方加沙参15克、 鱼板15克、因邪已去,用二药补肝 好之虚。服药 6 剂、头痛痊愈,血 压恢复正常。若头痛伴有项背强, 加萬根 15克、春艽 15克;伴有虚烦、 失眠,加酸枣仁50克、生磁石30克。 在临症中,10例此型头痛病人均收 到良好效果。

### 二、寒气相结型

此型头嘟病人,大多素体肥胖、 湿疹内生,或久居湿地、烤肥甘、 饮酒,或性急易怒,导致痰气相结 而发病。

【糖例二】餐××,男,45岁。 一層前因饮预生气后,出现头 痛且胀,语言略蹇濯,四肢时有痛 动,疲多,时呕恶,苔黄,脉沉滑。 治官理气、化较、通络。

药用: 黄连10克, 香附15克, 竹茹15克, 橘红15克, 半夏15克, 茯苓 25克, 枳壳 15克, 白芍 30克, 甘草 15克。

## 二、肝肾阴虚型

此型头痛病人, 名见于老年人, 或久病不愈而致肝肾阴虚者。

【痛例三】金××,男,63岁。

头瞩悬轻午后重、耳鸣、幽月干、口温、腰膝敞软乏力、舌红、苔漉黄、少津、脉弦细、面色微青泛有红晕,血压220/115毫米汞柱。

治官滋养肝肾。

药用,沙参25克,麦冬15克, 当归15克,生地15克,柳杞子25克, 川楝子15克,生赭石30克,茵陈30克,太子参15克,天冬15克,玄参 15克,荔枝核25克,丹参25克。

【#】此期因肝肾阳虚、血虚气郁、清窍失养而见上症。方中,一贯前举补肝肾之阳,肝肾阳虚不影响肝脏的正常功能,以致肝气不舒,用荔枝核、川棒子舒肝理气:久病肝肾阳虚、气郁血滞,用丹参25克,可与川楝子、荔枝核共起理气、活血、通络之效,重用生赭石,

名 医 经 験 ゆうゆう うくかく かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ (C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

# 《平脉辨证学概要》选载四

410007 湖南中医学院 郭振球

主题词 心病 (中医) 胸痹 心悸

# 第三童 心病脉证辨治

心病,指心脏的疾病。心病其 脉如钩而洪大,其候舌,其声言, 其臭焦,其味苦,其液汗, 其养血, 其色赤而藏神, 属手少阴经, 与小 肠合。 小肠为府主表, 心为藏而主 里 心气盛则神有余,则病胸胁内 痛,胁支满,胁下痛, 膺背膊腋间 痛,两臂内痛,喜笑不休,是为心 气之实,则宜泻之。心气不足,则 胸腹大,胁下与腰背相引痛,惊悸 恍惚, 少颜色, 舌本强, 喜忧悲, 是为心气之虚,则宜补之。

# 一、惊悸、怔忡

惊悸与怔忡, 都是指患者自觉 心跳甚急、惊慌不安,或脉来参伍 不调的病候。惊悸、怔忡虽属同类, 但有区别。有触而惊,为惊; 无触 而动, 为悸。惊悸常因情绪激动、 惊恐、劳累而诱发,时作时辍,不 降肝气,以防阴盛、肝阳上亢。 服药 6 剂, 诸症消失,血压降至150/95

【病例四】郭××,女,36岁。 头痛 7年, 时有剧痛,胸闷, 两胁隐隐胀痛,善叹息,失眠,四 肢乏力。舌质红,苔薄黄,脉沉细 无力。曾因头剧痛在某医院就诊, 并住院治疗,口服安宫丸40丸及谷 维素、安定、脑复康等药无效。

毫米汞柱。

治宜滋补肝肾、调气机。

药用: 白芍25克, 甘草15克, 浙贝15克,连翘15克,沙参25克。 考冬 15克。

【按】综观上症,系肝肾阴虚、

发一如常人, 其证为轻; 怔忡则终 日心中悸 动不安,稍有劳则心动剧、 全身困甚,病情较重。惊悸日久, 可发展成为怔忡。其病机主要是因 六淫、疫毒外侵、厚味饮食、情志 郁结 于内、房室过度、津血耗伤、 阴阳精气亏损,以致心与包络失养, 引起心神不宁、动悸不安,亦可由 于痰淤湿浊搏结心之络脉,以致心 脉阻痹、血液运行不畅,而致悸动 怔忡。《医学衷中参西录・治心病 治法》说,心悸"有因心体肘胀, 或有淤滞,其心房之门户变为窄小, 血之出入致有激荡之力,而心遂因 觉动者"。

脉候:手厥阴脉动甚,则心澹 澹大动。惊悸脉必结代, 寸口脉动 而弱。动为惊,弱为悸。病在心胆, 其脉必太动。惊者,其脉止而复来, 其人目睛 不转,不能呼气。

证治: 惊悸、怔忡证虽有轻重

血虚气滞之头痛。以一贯煎主方, 滋补肝肾之阴; 白芍、甘草, 酸甘 化阴、缓急止痛; 浙贝、连翘, 理 气散结止痛; 加荔枝核、佛手, 行 气散结止痛。诸药合用,共奏滋补 肝肾之阴、理气散结止痛之功。连 服12剂,头痛已止。此型头痛9例, 以一贯煎加减治疗,均收佳效。

孟老治疗疾病,辨证施治贯彻 治病的全过程,而不是头痛医头、 脚痛医脚,从整体观念出发,本着 "治病必求其本"的原则,调理虚 损之脏腑, 从而取得灵验的临床效

的不同,辨证亦有其共性。临床有 停饮水气凌心者,则胸中漉漉有声、 虚气流动、水既上乘、心火恶甚, 故築築跳动, 其脉弦, 治当利其水 饮,用小半夏加茯苓汤或苓桂术甘 汤。阳气内虚、心下空豁、状若惊 悸、右脉大而无力,治宜温化心阳, 用参附汤、芪附汤或术附汤加味, 兼以益气。肾气凌心、脐下动悸、 尺脉必弦紧, 宜五苓散加辰砂。阴 气内虚、虚火妄动、悸怔体瘦、面 赤唇燥、左脉微弱,或虚大无力, 育养心血、调心气,用四物安神汤。 若心神浮越,酌合清镇汤;水衰火 旺、心动不安,用天王补心丹。气 营俱亏,心动悸、脉结代,宜和营 益气,用炙甘草汤。痰饮惊悸、口 不作干、脉 弦滑, 宜豁痰定悸, 用 导痰汤加人参、肉桂。

### 二、心痛、胸痹

心痛,指两乳之中、歧骨陷处, 即心前区疼痛的疾病。多由心脏气 血阴阳偏虚以及热结寒凝、痰阻气 滞、血淤络脉壅塞而引起。胸痹、 痛引心背、胸满喘息、短气不利, 多由胸中阳气不舒、浊阴得以上逆, 以致"阴乘阳位",而为痹结之证, 甚则气结咳唾、胸痛彻背、背痛彻 胸。

脉候:心痛者,脉必急,痛甚 者,脉必伏。热则数,痰则滑,淤 则涩, 虚则濡, 外寒则紧, 内寒则 迟。胸痹,脉阳微阴弦。寸口脉沉 迟,关上小紧数,阳衰,胃以上阴 寒结聚。

证治: 心病多属包络病。心为 五脏六腑大主, 义不受邪。若真心

医直周周周周周厘厘 冷断学 (C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net