·12·(总156)

对温病伤阴保津之认识

广东省连山壮族瑶族自治县人民医院 曾宪进

主题词 阴虚 中医病机 津液 阳虚 中医药疗法 白虎加人参汤 治疗应用

一、伤阴的病因病理

温为阳邪,必从火化,极易化 燥伤阴。吴鞠通指出, "温病最善 伤阴", "春温、夏热、秋燥,所 伤皆阴液也";叶天士曰,"热邪 不燥胃津,必耗肾液"。热邪与阴 津,两者是对立的矛盾。热邪炽盛, 必灼烁 阴津, 迫令水分从汗、吐、 下等途经大量消失。阴液不足,阴 虚则阳盛,又可使热邪炽盛,更易 耗损阴津。这样恶性循环, 每致体 力迅速下降,终致"亡阴",形成 "阴绝阳脱"的危重症候。

二、保津的重要意义

温热病因发热、出汗,或呕吐、 泄泻,或误汗、误吐、误下、误用 辛燥温热药物等,均可消耗阴液, 而致人体脏腑功能失调、阴阳平衡 DODEDE DE PROPERTOR DE LA COMPETE DE LA C

栀,加黄柏、胆草。

[浅析]论疫病中见神昏谵语 证治。

病机: 因心主神明, 热毒盛灼 液成痰,阻闭心包络。

> 兼证: 肢厥、舌蹇, 舌质绛。 治法: 清热解毒,兼开窍。

方药:清瘟败毒饮增石膏、犀、 连、丹、栀,加黄柏、胆草,配合 三宝。若神昏谵语不重、无舌蹇肢 厥、舌质绎,可不用三宝。

[原文] 36·呕逆有因胃热上 冲者, 有因肝胆之火上逆者, 有因 肺气不能下降者, 宜本方增石膏, 加竹茹、枇杷叶、柿蒂、羚羊角、 银杏仁。如不止,用沉香、槟榔、 乌药、枳壳各磨数分,名四磨饮, 仍以本方调服。

失调, 出现皮肤干燥、口唇燥裂、 口渴少津、小便短少、大便秘结、 神昏、烦躁等津伤液脱的一系列临 床症状。因此,在温病治疗中保津 存液显得十分重要。故前人有"存 得一分津液,便有一分生机"之说。 吴鞠通在《温病条辨・序》中 云 "伤寒为法,法在救阳,温热为法, 法在救阴",并在汗论中直接了当 地指出"本论始终以救阴为主", 可见保津的重要性。

三、保津的方法

1. 间接护津法: 所谓间接护 津法, 就是在温邪炽盛时以驱热邪 为主,但也顾其津液。

如温邪在表,用辛凉解表,不 宜用辛温发汗。叶天士告诫人们"温 邪忌散",吴鞠通也指出"太阴温

[浅析] 论疫病兼见呃逆证

病因:以胃热所致为主,肝火 所致次之, 肺热所致很少见。

治。

临床表现: 胃热, 在呃逆主证 基础上,见胃经热盛证候;肝火, 在呃逆主证基础上, 见肝经血盛证 候; 肺热, 在呃逆主证基础上, 见 肺经热盛之证候。

治法:共同点,均以清热解毒 为原则,以清瘟败毒饮为主方,均 可加入柿蒂; 不同点, 应加石膏、 竹茹以清胃热,加羚羊角以清肝火, 加枇杷叶、银杏以肃降肺气。

注意事项: ①若呃逆不止,用 清瘟败毒饮调服四磨饮; ②若因痰: 阻见脘痞泛恶,治宜化痰;③若便 秘并见腑实证者,应当攻下。

病,不可发汗……汗出过多者,必 神昏谵语",所以只能用辛凉平剂 银翘散或桑菊饮解表。该两方中均 有 芦根一药,是取其既能清热又有 生津的作用,以达到固护津液的目 的。万万不可用麻黄汤、桂枝汤之 类 辛温发汗解表方,以免耗伤津液。

若温邪入里炽盛, 可用甘凉清 热法,不宜用苦寒清热。如见大热、 大汗、大渴、脉洪大, 可用白虎汤, 以期既能退热,又能保津液。 若津 液进一步耗损,以致汗大出、微喘 两鼻搧,则用白虎加人参汤,借人 参以 益气固津, 救其化源欲绝。

如邪热内结肠间,可"急下存 津",但不可妄行泻下。如见身热、 腹痛、腹胀、便秘,或神昏谵语, 可用大承气汤,下后即止,取其"邪 去正安"之义;或用增液承气汤, 攻下滋液并进,使其不耗津。

综上可知,间接护津法以"先 安未受邪之地",达到人体正气旺 盛,使它有利于驱除外 邪的目的。

2. 直接生 津法:当热邪渐解、 阴 液严重亏损时,可用甘寒生津法 和咸寒增液法直接生津养阴,以增 强机体的物质基础和抗御功能。

如见气分热邪渐解、胃阴受伤 出现口干咽燥、舌红干燥等证,可选 用甘寒生津之法,用益胃汤、雪梨 浆方、五汁饮等。

若温热邪久羁、劫烁 真阴, 出 现身热面赤、手足心热甚于手足背、 口干咽燥、神倦欲眠、舌锋而干、 脉 虚细等,可用咸寒增液法,选用 加减复脉 汤、救逆汤,一、二、三 甲复脉汤,大定风珠汤等。

运用直接生津法时, 应有的放 矢。如邪热亢盛之实证,不可滥用; 邪热盛兼阴液不足,不可纯用;湿 热症,忌用。

(作者简介: 曾宪进, 男, 34 岁,广东南雄县人。1978年毕业于广 州中医学院。现任广东省连山 壮族瑶 族自治县人民医院中医师。)

TETTITETETETETETE