

《伤寒论》乃方书之祖,其方中运用甘草与其他药物相比,频率最高而居首位,占全书112方的63%。但其用甘草绝不是滥用,具有很强的辨证论治特色,对指导临床有重要的现实价值和意义。笔者从甘草的性味、功用、配对及相关的病因、病机,探讨《伤寒论》方用甘草的规律,以启迪读者。

一、甘草的功用及其在《伤寒 论》中位置

二、《伤寒论》方用炙甘草的 经验及其规律

甘草的性味、功能决定了其在 辨证论治中的独特角色。因味甘性 缓,炙用温补中州。《伤寒论》根 据病、症、证恰当运用炙甘草组方, 体现了甘草调和、制约、配对、补 中的功绩。

1. 调和作用

《伤寒论》方运用甘草规律探讨

415000 湖南省常德市第二中医院 吴忠文

主题词 《伤寒论》 甘草/治疗应用 甘草/药理学

投,加炙甘草协和,与人参、大枣和胃安中,协半夏达止呕之功。芍药甘草附子汤佐以甘草从中调和,使芍、附共同发挥作用,且兼顾气阴。

(3) 调和中宫: 甘草炙用, 可养胃助脾,作用于中宫,能起到 养、资、助、健、暖、保、 和、安、 培、补等功能。桂枝加厚朴汤之甘 草,能和中救逆误下之治; 苓桂术 甘汤之甘草,则补之以甘: 茯苓甘 草汤之甘草,则用之和中:小建中 汤以炙甘草为臣,资养脾胃、生养 营血, 使木气疏和; 桂枝去芍加蜀 漆龙牡救逆汤用炙甘草, 以资助中 焦之气: 黄芩汤用炙甘草, 以和中 缓其津液之下奔; 黄芩加半夏汤之 甘草,养胃平逆;白虎汤之甘草, 乃调和中官、补土泻火; 栀子柏皮 汤用炙甘草,以和胃保脾,缓苦寒 之性: 四逆散之炙甘草, 调中缓急 止痛: 当归四逆加吴茱萸生姜汤, 用炙甘草之甘以缓肝;理中丸用炙 甘草, 以坐镇中州, 中气既立, 则 清气自升、浊气自降, 而吐泻亦自

- (4)调和阴阳:"阳在外,阴之使也,阴在内,阳之守也"。 发汗后阳从外泄、卫气不固,故汗后恶寒。芍药甘草汤佐以炙甘草,从中调和,促芍、附使阴阳和谐。 但汗下后阴阳两虚,茯苓四逆以炙甘草之甘扶阳救阴。
- 2. 制约作用: 《伤寒论》方常以炙甘草之甘缓,一以制药之悍, 二乃缓证(症)之急。
- (1) 制药之悍, 石膏辛寒, 具有解肌清热之功。仲景在白虎汤、 白虎加人参汤、麻杏石甘汤、大青 龙汤中,一以甘草缓寒平苦,使无 损脾胃之苦: 二以配人参、粳米之 甘以救津液之虚,抑制石膏之悍; 三以甘草特救肺气之困: 四是倍甘 草以和中、又减石膏之苦、助清内 攘外。芒 硝咸寒, 软坚通腑泄热。 《伤寒论》方之调胃承气汤、柴胡 加芒硝、桃核承气汤中,用炙甘草缓 大黄、芒硝留中泄热、故谓调胃。 因甘能胜咸,故甘草制芒硝。用炙 甘草配人参以扶胃气、使其速下无 碍胃气,一举两得。热与血结少腹, 以甘草之甘缓诸药之势,俾去邪而 不伤正为佐也。因风湿相搏其小便 自利、大便硬, 以桂枝去桂加白术 汤,用甘草缓姜、附之峻:在湿热 之邪无出路之身热发黄、无里实之 证时,以栀子柏皮汤清之,用甘草 和胃保脾,缓苦寒之性。在太少两 感证中, 麻黄附子甘草汤以甘草缓 麻黄发汗之猛,求微汗得解: 桂麻 各半汤取草、枣甘缓以平麻、桂, 刚柔相济,无过汗伤正之弊。在湿 邪内阻、气化失宣、病深关节时, 用甘草附子汤以甘草为君,缓和诸

经典医籍析疑

药, 使猛烈之性缓缓发挥作用, 免

留后患。

- (2) 緩症之急: 医以反复下 之,以甘草泻心汤重用甘草为君, 既可以益胃之虚, 又重在缓痞鞕之 急:太少合病之腹泄,以黄芩汤之 甘草配大枣和中, 以缓其津液之下 奔; 少阴病因阳郁不伸、气机不宣 导致四逆,出现咳、悸、腹痛,投 以四逆散用甘草 为君,调中缓急止 痛; 血虚外感风寒, 气血被寒所遏 产生手足厥寒、脉细欲绝, 当归四 逆汤调和厥阴,以甘草配大枣以缓 肝。
- 3. 配对组方:《伤寒论》方中 运用甘草与治疗主病证药物配对, 以发挥其特殊功能。
- (1) 救津: 因服桂枝汤后大 汗出、大烦渴不解, 白虎加人参汤 之甘草配人参、大枣, 取味甘补土 而生金,金者水之上源,意在救津 液之虚。又在病后余热未清、气液 两伤之竹叶石膏汤证, 亦以人参配 甘草益气生津。
- (2) 补中培土: 汗后心阳虚 而水邪上逆之茯苓桂枝甘 草 大 枣 汤证,佐甘草配大枣,培土以制水, 达平冲降逆目的; 栀子甘草豉汤证, 先煮栀子、甘草,缓其苦寒,以利 清虚热而除烦,但重点是补益中气, 以解少气之症见: 烧针发汗、心阳 受损、水寒之气乘虚上冲,桂枝加 桂汤散寒制肾气、平冲降逆的同时, 炙甘草配桂枝补心气, 以达安内攘 外之功: 医反下之的甘草泻心汤证, 重用甘草为君以补胃,与大枣相配, 则补中之力更著。
- (3) 刚柔相济: 病在太阳日 久、表邪已微, 仅以麻、桂之合方 轻剂,方中芍药配草、枣之酸收甘 缓,又以姜、麻、桂之辛甘发散, 则发挥其刚柔相济, 使小汗解邪之 效。
- (4) 辛甘复阳: 第29条似桂 枝证而误攻其表之后咽中干、烦躁

吐逆之症见, 因阳虚为急, 甘草配 干姜以辛甘合用,重在复胃脘之阳。 《伤寒论》中多次运用四逆汤,主 要针对脾肾阳虚。方中,甘草得姜、 附,鼓肾阳、温中寒,有水中暖土 之功: 姜、附得甘草, 通关节、走 四肢, 有逐阴回阳之力。 若发汗过 多的桂枝甘草汤证,辛甘合用,阳气 乃生、心阳得复而悸动自平; 风湿 相搏的桂枝附子汤证、辛甘化阳和 营卫,助阳散湿。

- (5) 酸甘益阴:太阳挟饮证 误治伤津, 用桂枝去桂加茯苓白术 汤。方中, 芍药配甘草酸甘益阴, 得生姜、大枣,一以协和诸药,一 以培养中气,使内停之水饮尽从下 去。
- (6) 酸甘化阴, 伤寒脉浮、 自汗……脚挛急误治之后得阳复, 以芍药甘草汤酸甘化阴, 使阴复, 则两脚自伸; 若汗后身疼痛, 是营 卫虚而不和,用桂枝加芍药生姜人 参新加汤。方中,甘草助桂枝专行 营分,辅人参滋补血脉生始之源, 配芍药潜行于经脉而定痛也。误下 之后阳陷于里、并于上、阴阳两伤 不相顺接,用麻黄升麻汤之芍药以 敛津液,配甘草以和之,咽喉可利
- (7)酸甘相辅:因表证未解、 阳 邪陷入太阴,故以太阳之桂枝汤 加芍药,以阴和阳,芍药得甘草, 酸甘相辅,和脾缓急止痛。
- (8) 甘淡相佐, 伤寒汗出而 不渴、乃胃阳不足、水停中焦、茯 苓甘草汤行阳以绕阴, 甘草佐茯苓 渗里缓中并用,是留津液以安营之 用。
- (9) 资助中气:病在表而以 火劫汗, 桂枝去芍药加蜀漆龙牡汤 以救逆, 方中甘草配大枣以资助, 使心阳得复、中焦水谷之精充;或既 火又下之、一逆再逆之桂甘龙牡汤 证,其甘草之多配桂枝辛甘,以复 心阳,且资助中焦,使上下阴阳之

气交于中土而烦躁自平。邪入少阳 而太阳未去之柴胡桂枝汤证,其甘 草助人参以扶正驱邪。又误下之后 邪陷痞结之半夏泻心汤证, 甘草助 参枣益气补正,一使谷气内充,又 使邪不复作。见胃虚食滞之生姜泻 心汤证, 甘草配干姜以温里 (中) 寒,助参、枣以补中州之虚;又遇 汗吐下后胃虚饮逆作痞之旋覆代赭 汤证,以人参配甘草养正补虚,得, 姜、枣和脾养胃、安定中州; 若伤 寒外有表邪、内有淤热而发黄, 用 麻黄连翘赤小豆汤,以甘草助麻、 桂发散表邪, 使湿热郁蒸之邪从表 而散。

三、《伤寒论》方中用生甘草 经查阅几种版本《伤寒论》, 书中厚朴生姜半夏甘草人参汤之甘 草,有的未注明炙用,有的注明炙 用, 诸家对其病机则统一认为汗后 阳气外泄、脾阴虚而不运所致壅滞 腹满。 为此, 认为该方是生用以和 阳,加之人参培阳,使补之泄之则 阴结散、虚满消。少阴客热咽疼、 病势轻浅,特以甘草之生用消火解 毒;又少阴客热致肺气不宣,投甘 草桔梗汤,以生甘草甘平而和阴阳. 合桔梗开达肺气, 使客热自能透达 而解。

讨论与体会

甘草不仅在《伤寒论》方中常 用,就是历代方剂之中亦属常见。 笔者在长期临床实践中也用之普遍 有序。曾治一高热人汗大渴恶寒案, 用白虎汤加桂枝一剂而愈; 救治一 例脑危重症,以调胃承气汤两剂而 转危为安; 对心阴阳两虚、脉结者 用炙甘草汤,而甘草先轻后重,其 疗效悬殊,其中自然有甘草之功; 对于实证 (无虚象) 、湿浊、中满 及急性黄疸型肝炎等病证,从不使 用甘草,以免留邪为寇。可见,临 床中用好、用准甘草,必须遵循仲 师的经验,掌握好《伤寒论》方中 运用甘草的规律。