DOI:10.13703/j.0255-2930.2015.01.012 中图分类号:R 246.2 文献标志码:A

# 临证经验

# 三棱针放血配合针刺治疗踝关节扭伤 50 例\*

周 伟 牛相来 马军虎 雷 华 周 钰<sup>™</sup> (新疆医科大学第一附属医院针灸推拿科,乌鲁木齐 830011)

「关键词 ] 踝关节扭伤;针刺;三棱针;放血疗法

笔者采用三棱针放血结合针刺治疗踝关节扭伤 患者 50 例,现报道如下。

### 1 临床资料

全部 50 例患者均来自 2010 年 3 月至 2013 年 5 月我院针灸科及骨科门诊,均有明显外伤史,均无合并骨折、皮肤破损,其中男 27 例,女 23 例,年龄最小 13 岁,最大 66 岁,平均(25±6)岁;病程最短 1 天,最长 4 天,平均 1.28 天;左踝 28 例,右踝 22 例。临床表现为损伤后踝关节即出现疼痛、局部肿胀、皮下瘀斑,跛行或不能着地步行,损伤局部压痛明显。符合《中医病证诊断疗效标准》<sup>[1]</sup>与文献[2]中关于踝关节扭伤的诊断标准,治疗前均签署知情同意书。

# 2 治疗方法

急性期(48 h 内)在踝关节急性扭伤处寻找压痛点,找到压痛非常明显的位置,即为阿是穴,常规消毒后,用三棱针点刺出血,然后在针眼处拔玻璃火罐或易罐<sup>33</sup> 5 min,拔出暗红色血液,用干棉球擦拭干净,碘伏消毒并敷以医用纱布以防渗血,4 天治疗 1 次,共治疗 2 次。用绷带加压包扎踝关节,嘱患者卧床休息、抬高患肢并用冰水混合物装于塑料袋内冰敷患处。扭伤 48~72 h,以物理治疗为主,扭伤 72 h 后行针刺治疗,穴取照海、商丘、中封、解溪、丘墟、申脉、金门、昆仑、阿是穴。穴位常规消毒后,采用长 25 mm毫针,每次根据患者的伤痛情况选取患侧 4~6 穴,常用解溪、丘墟,申脉、金门,连接华佗牌 DZS-II型电针仪,采用连续波,频率为 2~15 Hz,以患者能耐受为度,留针 30 min。每日 1 次,7 天为一疗程,连续 2 个疗程后进行疗效评定。

### 3 治疗效果

根据《中药新药临床研究指导原则》踝关节软组织损伤的标准评定疗效。痊愈:踝关节疼痛、肿胀、压痛等症状、体征消失,功能恢复正常,计 12 例;显效:踝关节临床症状、体征基本消失,仅在阴雨天或体位

\* 新疆乌鲁木齐市科技厅资助项目: Y12131001
☑ 通信作者:周钰(1972-),女,副主任医师。研究方向:针灸治疗脑病的研究。E-mail:349532885@qq.com

不合适时偶尔出现功能异常,计 20 例;有效:踝关节临床症状好转,功能稍有改善,计 10 例;无效:经治疗后临床症状,体征无好转,计 8 例。总有效率达 84.0%。

# 4 体会

踝关节扭伤属中医学"筋痹""痹症"范畴,是由 于外伤因素,使踝部的经脉受损,气血运行不畅,经 络不通,气滞血瘀而致。扭伤以韧带为主,韧带的收 缩性、血运均较差[4],故痊愈较慢。《针灸大成》云: "人之气血凝滞不通,可用刺血法以祛除其凝滞,活 血化瘀。"瘀血是血行不畅、滞留于经络或溢于经络 外、积滞于组织间的病理产物,刺血并放出一定量的 血液,直接调节血液的运行,祛除瘀滞。针灸可减轻 损伤部位疼痛,促进局部瘀血吸收,使血管扩张、血 流量增加[5]。当针刺入腧穴后,患者可由于精神过 度紧张使局部肌肉强烈收缩而引起滞针,可先嘱其 放松,同时按摩局部肌肉,或延长留针时间,或在他 处另刺一针,切忌强力硬拔针。阿是穴是主要的病 理反应点,点刺痛点可使局部减压,促进局部新陈代 谢。恢复期电针具有理气活血、舒筋止痛之功效。 点刺时患者因剧烈疼痛出现晕针应立即停止操作,轻 者头部放低静卧片刻,给予温开水或糖水,即可恢复。 如不能缓解或晕厥者,可选水沟、涌泉、内关等穴以指 针按压。在扭伤部位刺络拔罐,可调和气血、通其经 络,促使局部瘀血祛除,再配合电针,达祛瘀除滞、行 气活血、疏通经络之功,使踝关节功能尽快恢复。

# 参考文献

- [1] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[S]. 南京. 南京大学出版社,1994,209.
- [2] 吴中山. 刺络放血治疗急性踝关节扭伤的临床研究及疗效评价[D]. 北京:北京中医药大学,2007.
- [3] 傅国彦. 小针刀配合易罐治疗棘上韧带损伤临床疗效 观察[J]. 亚太传统医药,2014,10(6):86-87.
- [4] **姜少伟.** 发泡膏灸法治疗慢性踝关节扭伤 37 例疗效观察[J]. 中国针灸,2002,22(8):527-528.
- [5] 张栋. 针灸的原理和经络研究中红外热像技术的应用 [J]. 中国针灸,2004,24(1):38-39.

(收稿日期:2014-04-06,编辑:杨立丽)