

# 婴幼儿急性泄泻治验

安徽省萧县黄口镇医院

夏红晨

## 一、临床资料

578例中,男323例,女255例。年龄最小六个月,最大5岁,其中6个月~1岁289例,1~2岁152例,3~5岁137例;病程最短1天,最长一个月。年龄越小,发病率愈高。

临床表现:轻型腹泻,便次增多,日数次至10余次,呈稀糊状、蛋花样或水样,色黄绿,有酸臭味,偶有恶心呕吐,体温正常或稍高,多数患儿有轻、中度脱水。

## 二、治疗方法

1. 针刺治疗:主穴:足三里双侧;辅穴:上巨虚双侧,

天枢双侧。2手法:先刺足三里穴(双)、上巨虚穴(双),用补法,不留针,刺3~5分;再刺天枢穴(双),用泻法,不留针,刺1~2分。每日一次。

2. 中药治疗:参苓饮水煎服。煎至30~50毫升,每次服10毫升,分4~5次服完,每日一剂。药用红参6克、茯苓6克、猪苓6克、炒白术6克、泽泻6克、桂枝3克。患儿按年龄随症酌情加减。

## 三、治疗结果

治愈标准:腹泻次数减少,大便成形,其他症状全部消失者。

疗效观察:针刺1~2次,服

药1~2剂治愈者380例;针刺3次,服药3剂治愈者162例;针刺4次,4剂治愈者36例。最长4日内痊愈,无一例无效。

## 四、典型病例

陈××,男,1岁。1982年9月5日初诊。患儿腹泻5日,日便8~10次,水样便,带有不消化食物,偶有轻度干呕,小便短少。曾服氯霉素、黄连素、庆大霉素、胃蛋白酶等药,均未见效。体温37.2℃,面色苍白,精神萎靡,皮肤弹性减低,口唇干燥,眼眶稍有凹陷。舌淡苔白,指纹色淡,脉滑数。

四诊合参,属湿盛脾虚泄泻。治宜清热利湿、健脾温中。

针刺足三里、上巨虚,再刺天枢穴,每日一次,同服参苓饮。

服药一剂,便次明显减少,日4~5次,脱水纠正,患儿精神明显好转。继服上方一剂,痊愈。

# 拔罐治疗荨麻疹

国防科工委兴城疗养院 叶立华

主题词 荨麻疹 治疗 拔罐疗法 神阙穴

本组34例患者,均系荨麻疹。其中男19例,女15例。年龄最大68岁,最小7岁。病程3至6月12例,1至6年10例,6至8年8例,10年以上4例。

一、治疗方法 治疗时,患者仰卧。暴露治疗部位。采用闪火法,迅速将罐扣在神阙穴上,3至5分钟后将罐取下。反复连拔3罐,为治疗1次,1日1次,3次为一疗程。顽固者,需连拔2至3个疗程。在治疗时要停用抗过敏药物。

二、疗效观察 本组病例,一般在治疗第2次后,皮肤发痒开始减轻,风团消退。以风团消失及无痒者为痊愈,痊愈时间最短治疗3次,最长治疗12次。

三、典型病例 杜××,男,43岁,干部。周身间断性起荨麻疹

已半年,发起疹块持续时间不定,色红,奇痒,重时面唇俱肿。经临床应用各种抗过敏药物(包括中药)治疗,效果不佳。

拔罐前查:周身可见片状红色丘疹块,以胸背为重,面唇俱肿,自述夜间奇痒难眠。

诊断:荨麻疹。经用此法治疗1次,疹块明显消退,痒明显减轻3次痊愈。随访半年未再复发。

(作者简介:叶立华,男,34岁,河北景县人。于1980年毕业于国防科工委军医训练队,现任国防科工委兴城疗养院针灸室技师。)

## 针刺治疗痹证

锦州古塔中医院

李伟

高××,男,49岁,农民,87

年11月20日初诊。

该患者3年前,因久坐凉地,引起右臀部隐痛麻木。经多种治疗方法,不见好转,病情时轻时重。近一段时间,因气候较冷而感右臀部疼痛麻木加重,活动受限,痛时走窜到足跟部。近热则舒、近寒则加重,舌苔黄腻,脉浮紧。

治疗:交替针刺环跳、承山、委中、承扶秩边、阳陵泉、丘墟等穴,臀部配特定电磁波器,每次30分钟,仅10次而愈。

体会:针刺具有使经络气血通畅,血流加快,血管收缩增强,而达到脉道以通,气血乃行。持定电磁波器具有改善局部血液循环,加强新陈代谢,促进局部渗出物以吸收,消肿,镇痛,消炎等作用。在针刺治疗痹证时,在患处配以持定电磁波器治疗,能充分起到温针的效果,可收到良好的治疗效果。

(作者简介:李伟,女,30岁,辽宁省锦州市人。于1987年随师学医,现任中医师。)