

(三)服法：每日3次，每次100~150ml左右。十天为一疗程，连服2~3疗程(少数病例服用40天)，至黄疸消退，肝功能恢复正常，全部症状消失为止。

全部病例都以内服复方茵陈合剂为主，酌情配合其他药物辅助治疗如食母生、维生素C、维生素B、葡萄糖等。

(四)疗效：

我站应用复方茵陈合剂治疗急性黄疸型肝炎的22例中，其中治愈者20例，占91%；好转者2例，占9%；疗程最长为38天，最短20天，平均治愈天数31.5天。

轻度患者于一周内黄疸消退，中度及重度患者于2~3周内黄疸消退。一般患者在15天左右自觉症状消失，黄疸指数及谷丙转氨酶等肝功能项目，大多在服药后15~20天左右恢复正常。

江苏无锡市皮箱皮件厂保健站 陈荣灼

大叶桉煎汁治疗带状疱疹

带状疱疹是一种病毒感染的皮肤病，得病后，皮疹沿周围神经分布，可发生不同程度的疼痛及灼热感，对一般抗菌药物治疗效果不好。近二年来我院内科住院病人中，并发带状疱疹共五例，经用大叶桉煎水湿敷，效果明显。

治疗方法：取大叶桉二斤，放水煎熬浓缩至10%溶液，用纱布湿敷患处，一日三次，每次1~2小时。

病例	姓名	原发病	桉叶汁治疗后变化	治愈天数	治疗前用药情况
1	韩××	肺结核	疼痛减轻，疱疹干燥结痂	4	曾用金霉素、龙胆紫及肋间神经封闭均无效
2	韩××	再障	疼痛减轻，疱疹干燥结痂	4	用青霉素、金霉素、龙胆泻肝汤口服，鱼肝油局部敷神经封闭无效
3	罗××	肺心病	疼痛减轻，疱疹干燥结痂	5	
4	黄××	红斑狼疮	止痛分止，分泌物减少后结痂	3	板兰根注射同时用
5	吴××	慢性肾炎	止痛分止，分泌物减少后结痂	3	

从表中可以观察到，经大叶桉煎汁湿敷后，均可达到止痛、消炎3~4天后疱疹干燥结痂脱落，

柳州铁路中心医院内科

“松矾丹”治疗黄水疮

一、方药：松香、枯矾、野菊花粉各适量。

二、制法：先采集野菊花秧的嫩梢，洗净，晒干，研为细末。后取上三味药末等量，过筛，瓶装备用。

三、用法：用温盐开水洗净患部，取此药加青油调成清糊状，涂搽患处，每日2~3次。

典型病例：

杨××，女，8岁，小学生。头部患黄水疮约占3/4的面积，脓液外溢，布满发根，搔痒异常。用“松矾丹”治疗，第二天控制了脓液外渗，搔痒显著减轻，第四、五天结成蜜黄色厚痂，第七天脓疱干涸，痂皮逐渐脱落，第十天痂皮全部脱落而愈，只留下了色素斑，数月后未见复发。治疗期，未用其他药物。

四川省宣汉县中学“五·七”教研组

鹅不食草治疗面神经麻痹

用鹅不食草Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers. 治疗面神经麻痹(即口眼歪斜)，四年来，共收治40例，39例痊愈，仅一例未愈(但有一定疗效)。最短疗程一个月，最长疗程为一年。在治疗过程中，面部有痒感、虫爬感或出现小疱疹，2~3日可自行消退。

取鹅不食草干品3钱，研为细末，加凡士林调成软膏，涂在纱布上，再用鲜草5钱捣烂如泥，铺在软膏上。患者左侧歪斜贴右边，反之则贴左边。两天换药一次，一般2~3次即可痊愈。

典型病例：陈××，女，19岁，患面神经麻痹已8个月，并伴有半身瘫痪，经医院治疗月余，无效。后来我所，用鹅不食草外敷四次痊愈。

赤脚医生 廖鸿凯