

妄行”。由此看出,祖国医学认为上消化道出血多因胃中积热伤胃络所致。《医宗金鉴》记载“阳乘阴热血妄行,血犯气分不归经……”。治疗组中根据临床症状,舌脉表现,中医辨证属实热证者62例(82.67%)。进一步说明了以火证、热证为多。在治疗方面《金匱要略》记载:“心气不足吐血、衄血者泻心汤主之。吐血不止者,侧柏叶汤主之,肠风下血,槐花散主之”。《医宗金鉴》云“热伤一切失血症,犀角地黄芍牡丹”。根据上述中医论述,以泻心汤、犀角地黄汤、槐花散三方集于一体有清热祛瘀止血生肌的功效,故取得了满意的疗效。无副作用,方便,药源充足,价格便宜,值得推广。

关于大黄的应用,大黄是方中主要成分,性苦寒具有泻热、破积滞、行瘀血、收敛止血之功用。不要畏大黄有泻下作用会使出血加重,相反因有收敛之功,

故可止出血。临床证明:用生大黄为宜。大黄有增加肠蠕动作用,服用泻热止血汤2小时后口渴减轻;肠鸣音出现;4~6小时明显增强,6~8小时排便。此时不要因为肠鸣音,增强排便认为又有新的出血,要脉证合参,结合口渴与否及血压、脉搏、血红蛋白等综合判定为宜。西医判断是否继续出血或者停止,靠血压、脉搏、血红蛋白等情况测定。而中医也有独到之处。《医宗金鉴》云:“出血身凉脉小顺,大疾身热卧难凶……”。即明示了如果出血者身上凉爽,脉搏小、慢则预后良好,出血可止。如果脉大(弦、洪、疾)身热烦躁不安则可继续出血。要密切观察。注意并发症,治疗组中有5例因并发症转外科手术治疗、这就要求我们仔细观察病情变化,才能不致延误病情。

(收稿日期:1997-02-22)

银翘散用荆芥析

北京中医药大学(100029) 肖培新
山东省淄博市中医院 张晓梅

主题词 银翘散

银翘散是治疗太阴风温之名方,吴鞠通称之为辛凉平剂,方中应用了辛温的荆芥穗,《温病学》(五版)教材说:“方中芥穗、豆豉、薄荷解表发汗,祛邪外出”,又说:银翘散“用于风热客表而发热、恶寒、无汗者最为合适。如果恶寒已罢,则荆芥、豆豉亦非所宜。”显然认为荆芥是解表发汗,用荆芥时当有恶寒、无汗。然而从吴氏的原意看,荆芥之用并非此意。

1 组方原则

银翘散的组方一本于《内经》:一本于嘉言,选用东垣清心凉膈散为基础组成。吴氏自注云:“本方谨遵内经‘风淫于内,治以辛凉,佐以苦苦;热淫于内,治以咸寒,佐以甘苦’之训”。因此,银翘散方并不涉及表闭,也未提及用辛温法。吴氏宗喻嘉言芳香逐秽之说,认为“荆芥芳香,散热散毒”,所以荆芥之用也不涉及恶寒及汗的有无。

2 临床表现

《温病条辨·上焦篇》第三条“太阴之为病,脉不缓不紧而动数,或两寸独大,尺肤热,头痛。微恶风

寒,身热自汗,口渴,或不渴,而咳,午后热甚者,名曰温病。”第四条指出“太阴风温、温热、温疫、冬温,初起恶风寒者,桂枝汤主之;但热不恶寒而渴者,辛凉平剂银翘散主之。”由此可见,银翘散所治之证“不恶寒”、“自汗”。第五条又说“太阴温病,恶风寒,服桂枝汤已,恶寒解,余病不解者,银翘散主之。”因此银翘散证没有恶寒很明确。

3 温病治则

“温病忌汗,汗之不唯不解,反生他患。”由此可见,吴氏不主张治温病用汗法,那么将荆芥解释为“解表发汗”显然不妥。

荆芥辛温芳香。吴氏认为“散热散毒”,是银翘散的重要组成部分,并不是专为解表而设。因此,不能以表现是否具有恶寒及无汗来确定是否应用荆芥。通过对原文的分析,可以看到,银翘散证表现有自汗出而不恶寒。临床应用银翘散,不管是否有恶寒及无汗(确是卫分证),有荆芥、薄荷、豆豉者退热作用较快,这主要是因为荆、薄、豉之辛与其他药组成了辛凉之剂,使风热得以疏散,上焦气机得以开达。

(收稿:1997-04-05)