

朴 18g, 莱菔子 45g, 元明粉 15g。服法同上。体虚者去元明粉, 加火麻仁 45g, 郁李仁 18g。

麻痹性肠梗阻宜益气宽肠、润下通结, 常用黄芪 30g, 白萝卜 1000g (煎汤代水), 瓜蒌仁 45g, 火麻仁 45g, 枳壳 12g, 郁李仁 15g, 广木香 6g。煎服法同上。若在妊娠期间患麻痹性肠梗阻者, 加当归 18g, 炒白芍 15g, 黄芩 12g 以养血安胎。

肠套叠多见于小儿, 常以理气活血通结之法, 药用白萝卜 120g (煎汤代水), 元明粉 18g (冲服), 郁李仁 18g, 火麻仁 18g, 瓜蒌仁 30g, 制香附 12g, 鸡血藤 30g。煎服法同前, 便通后即停药。

蛔虫性肠梗阻治宜驱虫安蛔为主, 佐以健脾燥湿, 药用乌梅 30g, 制大黄 30g, 黄连 20g, 黄柏 20g, 细辛 6g, 川楝子 20g, 槟榔 24g, 雷丸 10g, 川椒 10g, 使君子 10g, 甘草 10g, 干姜 6g。上药煎 2 次, 混合分 4 次服, 每 3 小时服 1 次。

益肺消水汤合消瘤芥治疗癌性胸水

郑玉玲

(河南省中医院, 河南 450002)

癌性胸水是恶性肿瘤常见的并发症。及时有效地控制胸水, 缓解因胸水所致的各种压迫症状, 是治疗中的重要内容。我们采用益肺消水汤合消瘤芥胸腔化疗治疗癌性胸水 18 例, 收到满意疗效。

益肺消水汤为生黄芪 30g, 桑皮 15g, 瓜蒌皮 10g, 虎杖 15g, 葶苈子 20g, 三哥王 15g, 龙葵 30g。若动则汗出, 神疲肢倦者加生白术 30g, 党参 30g; 心烦、口渴者加栀子 9g, 知母 15g; 咳嗽痰多者加苏子 15g, 白芥子 15g; 身热, 咳吐黄痰者加黄芩 9g, 鱼腥草 30g。治疗组每日 1 剂, 水煎服, 与消瘤芥胸腔化疗同步进行。

患者 18 例, 经服用益肺消水汤合消瘤芥胸腔化疗 3 次后, 完全缓解 9 例, 部分缓解 8 例, 稳定不变 1 例。

癌性胸腔积液属中医“悬饮”的范畴, 它不同于一般的积液, 而是因素体虚弱, 邪毒(癌)入侵致脏腑功能失调, 三焦水道不通, 湿毒结聚胸胁所致, 故用一般宣肺利水药难以奏效。我们在临床实践中总结的益肺消水汤具有益气宣肺, 解毒利水的功效。方中黄芪益气补肺, 利水消肿, 是治疗癌性胸腔积液的要药; 桑皮、瓜蒌

皮宣肺理气, 消胀行水; 虎杖、三哥王、龙葵、葶苈子具有较强的解毒利水作用, 是消除癌性积液的必用药。

消瘤芥为甲基氮芥衍生物, 属细胞周期特异性药物, 抗癌谱广, 作用迅速, 毒性较低, 对各种肿瘤引起的癌性胸水有确切的疗效。临床实践证明, 益肺消水汤合消瘤芥胸腔注入是治疗癌性胸水较理想的方法。

益气降逆治呃逆

侯志敏

(北京医院, 北京 100730)

患者周某, 男 52 岁, 干部, 1986 年 8 月 7 日来诊。五年前脘部胀闷不适, 时而呃逆, 自觉胃脘部有气自下上冲, 随即呃逆。呃声断断续续, 1—2 小时后自行缓解。

故素日纳食不馨, 形体瘦弱, 服中西药效均不显。近 20 日外出劳累, 病情加重, 昼夜呃声连连, 尤以夜间呃声频频不得入寐; 伴恶心纳呆, 形瘦肢倦, 面色不华。刻诊舌质淡, 苔微白腻, 脉沉细无力。脉症互参, 乃属气虚脾胃不和, 升降失调, 致使胃气不得下行之呃逆症。治宜益气降逆, 和胃止呃。方选旋复代赭汤加味: 旋复花(包) 10g, 代赭石 30g (先煎), 党参 10g, 甘草 3g, 半夏 10g, 大枣 5 枚, 生姜 3 片, 刀豆子 10g, 柿蒂 10g。

此 5 付水煎服, 日 1 剂, 频服。

二诊: 药后呃逆有减, 纳食有增, 舌苔薄白, 脉沉细。药已见效, 不更方, 继 5 剂。

三诊: 患者呃逆大减, 尤以夜间明显, 但脘部仍有隐隐不适。上方加焦三仙 30g, 砂仁 5g (后下) 以理气化滞和胃, 再 5 剂。

四诊: 患者呃逆已止, 纳食如常, 精神大振, 舌质淡红, 脉细。上方加生芪 30g, 寄生 30g。5 剂善后。1 周后病告痊愈, 后继信访, 再未复发。

本例呃逆为邪扰胃气, 正邪相攻, 气并相连, 致胃气上冲。此病多在气分, 故方选旋复代赭汤加味。方中“生赭石压力最胜, 能镇胃气冲气上逆”; 旋覆花性甚和平, 虽能降逆但不伤元气; 半夏、生姜、大枣卫护脾胃; 柿蒂、刀豆子增强降逆作用; 砂仁、焦三仙理气和胃化滞。故辨病时必须观察患者正气的强弱, 邪气的盛衰, 病在气分还是在血分, 投药准确, 有的放矢, 方可药到病除。