## 节损伤者,不失为一种可取的保守疗法。 参考文献

- [1] Ohishi T, Takahashi M, Suzuki D, et al. Treatment of-popliteal cysts via arthroscopic enlargement of unidirectional valvular slits[J]. Mod Rheumatol, 2015, 25 (5): 772-778.
- [2] Rupp S,Seil R, Jochum P, et al. Popliteal cysts in adults. prevalence, associated intra-articular lesions, and results after arthroscopic treatment[J]. Am J Sports Med,2002,30(1):112-115.

(收稿日期:2015-11-24,编辑:王晓红)

DOI:10.13703/j.0255-2930.2016.04.012 中图分类号:R246.3 文献标志码:B

## 医案选辑

## 产后崩漏症案

王 红 $^{\triangle}$ ,王亚东,杨宗保 $^{\boxtimes}$ ,陈娇龙,马富强(厦门大学医学院国医堂,福建厦门 361005)

患者,女,25岁。初诊日期:2015年8月2日。 主诉:月经淋漓不断 9 个月,加重 1 个月。病史: 9 个月前在厦门市妇幼保健院接受剖宫产手术,产 后即月经淋漓不断,每日月经量3 mL 左右,色鲜 红,偶有血块,稍微劳累后加剧,诊断为产后功能性 子宫出血,因在哺乳期,未予服用相关药物。曾就诊 于厦门大学医院中医科,诊断为产后崩漏,予服相关 中药(具体不详),亦无明显好转。1月前因劳累后 月经淋漓不断加重,每日月经量 5 mL 左右,遂到我 科就诊。现症见:月经淋漓不尽,色鲜红,劳累后加 剧,小腹偶有隐痛,右乳房内上侧胀痛、有结块,神疲 乏力,纳呆,便溏,舌淡、苔白有齿痕,脉细弱。西医 诊断:产后功能性子宫出血。中医诊断:产后崩漏 (证属脾气虚弱,中气下陷)。治疗以健脾益气、升阳 止血为原则。采用百会压灸、悬灸隐白和针刺治疗, 停服一切药物。取穴:任脉气海、关元和中极,督脉 百会,脾经隐白和三阴交,胃经足三里,经外奇穴子 宫(下腹部,脐中下4寸,前正中线旁开3寸)。操 作:①百会压灸:助手用双手按压百会两侧头发以防 止烧伤,然后在百会处涂抹万花油,放置一中型艾炷 (直径和高度均为 5 mm),点燃艾炷,当艾炷燃烧至 一半时,用铁质压舌板按压艾炷  $3\sim5$  min,然后移 开压舌板,再将新艾炷放置原处重新点燃重复操作, 患者可有强烈的温热感自百会向头部渗透,每次灸 5 壮,隔日1次。②艾灸隐白穴:双手分别持3 根艾 条,点燃后悬灸双侧隐白,距离皮肤  $2\sim3$  cm,防止 烫伤皮肤,灸至皮肤泛红并感到热量自隐白沿腿内 侧传递至小腹,每次&ppi35 min,隔日1次。③针刺: 用 75% 乙醇棉球常规消毒所选穴位,选用

☑ 通信作者:杨宗保(1973-),男,副教授。研究方向:针灸治疗神 经症和痛证的临床及机制研究。E-mail:yzbldq@163.com

△王红(1991-),女,厦门大学 2015 级针灸专业硕士研究生。

E-mail: 438747954@qq. com

0.30 mm×40 mm 毫针,子宫和中极,针尖向下与皮肤呈 15°沿皮刺入,向下平刺 25 mm,患者可有酸胀感向会阴部放射;气海、关元采用舒张进针法,直刺 25 mm;足三里、三阴交以弹入进针法,直刺 40 mm,以上穴位均施捻转补法每 10 分钟行针一次,留针 30 min。第 1 次针灸后患者无明显好转,经第 2 次针灸后觉月经量有所减少,小腹疼痛消失,右乳房胀痛减轻。第 3 次就诊后患者未见月经淋漓不断,无明显自觉症状。后复诊治疗两次以巩固疗效,未见症状复发。

按语:产后崩漏是指妇女产后出现异常的阴道 出血,现代医学治疗以孕酮类药物、雌激素抑制剂配 合对症治疗为主,但上述药物不良反应大、依赖性 强,在哺乳期不宜服用。中医治疗产后崩漏效果明 显,《血证论》曰:"古名崩中,谓血乃中州脾土所统 摄,脾不摄血,是以崩溃,名曰崩,崩中虽是血病,而 实则因气虚也",说明崩漏是由气虚血脱所致,其治 宜健脾益气、固脱止血。岭南针灸名家司徒铃,积数 十年之经验,独创直接灸百会疗法,其认为百会在巅 之正中,为手足三阳经与督脉交会之处,属督脉,灸 之能振奋阳气。故压灸百会能起升阳举陷、益气固 脱之功,有助于改善气虚下陷症状。隐白为脾经井 穴,为治疗血症要穴,《针灸大成》曰:"隐白穴,能治 妇人月事过时而不止",故大剂量艾灸给予强烈的温 热刺激,能有效治疗脾不统血之崩漏。三阴交为妇 科调经常用穴,故针刺之。崩漏一症"先损脾胃,次 及冲任",故针刺任脉穴气海、关元、中极以加强固冲 止血之功,配合足三里穴固护脾胃巩固后天之本。 子宫穴为经外奇穴,能固崩止血兼缓解小腹不适。 综合上述经穴能有效治疗产后崩漏,效果显著,值得 临床推广应用。

(收稿日期:2015-08-20,编辑:杨立丽)