# 《全匮要略》对心水的辨证施治

山东省肥城市中医院(271600) 刘海云 徐秀华

### 主题词 《金匮要略方论》心病辨证

1998年4月 第17卷第2期

《金匮要略·水气病脉证并治》曰:"心水者,其 身重而少气,不得卧,烦而躁,其人阴肿。"本病主 要见于现代医学各种心脏病导致的左心衰竭、右心 衰竭、全心衰竭,以及其他疾病发生严重心脏功能不 全有水肿者,是常见的危急病证,病情复杂,变化多 端。笔者根据本病不同时期、不同证候辨证施治,每 收良效。

## 1 证治分类

1.1 心胸爽仗型 症见心悸不宁,胸闷气短,咳吐痰涎,不能平卧,胃脘痞满,畏寒肢冷,浮肿尿少,舌淡苔白滑,脉滑数。治宜温阳化饮,祛痰泻水。方用小青龙汤合葶苈大枣泻肺汤加味:炙麻黄 5g,桂枝 10g,白芍 10g,细辛 2g,法半夏 10g,苏子(布包)15g,五味子 3g,杏仁 10g,葶苈子(布包)30g,丹参 30g,干姜 5g,大枣 10 枚,甘草 5g。

1.2 心气阳衰型 症见心慌气急,心胸憋闷,不得平卧,精神萎靡,体倦乏力,面色恍白,形寒肢冷,自汗、浮肿、腹胀尿少,舌淡紫胖嫩有齿痕、苔白滑、脉沉细数。治宜益气温阳,化瘀行水。方用利心水汤:人参10g,黄芪20g,炙附片(先煎)10g,白术20g,猪苓30g,泽泻30g,桂枝10g,丹参30g,当归10g,茯苓30g,葶苈子(布包)30g,北五加皮10g,炙甘草5g。

1.3 心阴亏虚型 症见心悸易惊,胸闷隐痛,不能 平卧,咳嗽咯血,头晕目眩,失眠多梦,盗汗颧红, 浮肿尿少,舌红少津,脉弱细数。治宜益气滋阴,活 血利水,养心安神,方用天王补心丹合葶苈生脉散加 减。

1.4 心血療滞型 症见心悸憋闷,胸部作痛,不能 平卧,畏寒肢冷,唇甲青紫,腹胀食少,下肢浮肿, 小便短少,舌质紫暗,脉象细涩。治宜活血化瘀,温 阳利水。方用血府逐瘀汤合真武汤加减。

### 2 典型病例

姜某,女,68岁。1993年12月5日初诊。 患肺心病20余年。近半月来,病情加剧,症见 心悸喘促,咳吐痰涎,畏寒肢冷,浮肿尿少,胃脘痞 满,口唇爪甲青紫,端坐呼吸,不能平卧,舌紫苔白 滑,脉滑数。查颈静脉怒张,桶状胸,双肺呼吸音低, 两肺满布干湿性罗音,心率 130 次/分; 律齐,心音 遥远, 肝肋缘下 3.0cm, 腹水征阳性, 双下肢呈凹陷 性水肿。心电图示:窦性心动过速、右心室肥厚伴心 肌劳损。x 线片示: 肺气肿征象, 全心扩大, 肺动脉 段突出。西医诊断:阻塞性肺气肿合并肺内感染、慢 性肺心病、心衰 II°。中医辨证属心胸痰饮型,兼心 血瘀滞。治宜温阳化饮,祛痰泻水,活血化瘀,通调 心脉而纠正心衰。药用炙麻黄 6g, 炙附片 (先煎) 12g, 桂枝 10g, 白芍 10g, 细辛 2g, 法半夏 10g, 五 味子 6g, 丹参 30g, 桃仁 10g, 红花 10g, 桑白皮 30g, 苏子(布包)15g,干姜5g,茯苓30g,葶苈子18g (研末每次 6g, 每日分 3 次食后服)。每日 1 剂, 煎 汤频饮,服方7剂后,心悸喘促明显减轻,水肿消退 大半,口唇爪甲紫绀改善,以本方调治月余,症状缓 解,随访1年,未见复发。

## 3 体 会

据现代药理研究证明,小青龙汤具有抗炎抗过敏作用,有气管扩张剂的效果;葶苈子有强心利尿作用,增加心肌收缩力,减慢心率,减慢传导;天王补心丹主要表现对中枢神经系统的调整及改善心血管功能作用;生脉散有强心,改善心肌供血,调整心肌供血,调整心肌供血,调整心肌供血,调整心肌供血,调整心胀度,抑制血小板聚集、粘附,抑制血栓形成,降低全血比粘度,抑制血小板聚集、粘附,抑制血栓形成,降低全血、流量,改善心肌供血;真武汤有减低血流阻力,减轻心脏负荷,增加肾血流量,使尿量增加,达到消肿化癌功效,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心脏负效,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心即的效,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心即的效,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心则的较级,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心则的较级,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心则的数,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心则的数,并有强心作用;利心水汤则可明显地增加心则的数,并有强心作用,利心水汤则可明显地增加心则的数,并有强心作用,利心水汤则可明显地增加心则的数,并不强心性,减轻水肿,减轻心脏负荷,提高心脏泵血之功能。

(作者简介: 刘海云, 女, 43 岁, 湖南岳阳市人。 1977 年毕业于青海医学院, 现任山东省肥城市中医 院内科主治医师。)

(收稿日期 1997-03-19)