CHINESE ARCHIVES OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Mar 2008

证治纵

横

疏肝理气治胃病

张舒雁 (浙江省中医院, 浙江 杭州 310006)

摘 要: 阐述疏肝理气在胃病治疗中的作用, 讨论 8种胃证的遗方用药方法。 关键词: 胃病: 中医治疗: 疏肝理气

中图分类号: R259.73 文献标识码: A 文章编号: 1673 - 7717(2008) 03 - 0627 - 03

1 依照传统的中医理论, 胃是水谷之海、多气多血之腑, 生理上胃主受纳而不藏, 喜条畅而恶抑郁, 病理上由于各种病因侵犯胃腑, 如: 寒热不均、饮食失节、情绪紊乱,或因脾胃自身失调而产生气血瘀滞, 则胃病易生。肝主疏泄而藏血, 因而肝与气血运行密切相关, 气血瘀滞时亦应责之于肝。此外, 肝气犯胃是胃病产生的常见因素 (木乘土一依据五行学说)。因此, 疏肝理气是治疗胃病的非常重要的一个方面。临床实践也证明: 治疗有些胃证时如果处方中未包含疏肝理气之药, 就难以奏效。

1 临床应用

临床上常选用气薄质清,能有效疏理肝胃不和之气的中药,如:柴胡、香附、佛手、木香、枳壳和陈皮。常用处方如:四逆散、柴胡疏肝散和金铃子散。胃脘疾病可归纳为以下8种证型。

11 脾胃气虚 证见:胃脘隐痛日久, 饥则痛甚, 食后痛缓, 或痛势绵绵休无止时, 纳减, 便溏, 头晕乏力, 苔白薄腻, 脉弦缓。证以痛势缓、病程长为特点。常用方药: 党参、茯苓、焦冬术、炙甘草、广木香、陈皮、炒扁豆、焦谷麦芽、玫瑰花、苏梗、佛手、杭白芍。

加减: (1)若泛吐清水, 可加代赭石、旋复花以镇降肝胃之逆气。 (2)若腹痛肠鸣, 便溏明显者, 乃肝气乘 脾为主, 可加防风炭而成痛泻要方, 另加车前草利小便以实大便。

12 肝胃寒凝 证见:胃痛暴作或隐隐,喜暖喜按,口不渴,喜热饮,苔薄白,脉弦紧。常用方药:吴茱萸、炮姜、党参、炙甘草、杭白芍、制香附,娑罗子、玫瑰花、广木香、佛手。 13 肝胃郁热 证见:胃脘胀痛,有灼热感,嘈杂不舒,嗳气泛酸,口干味苦,或见口舌糜烂,牙龈肿痛,大便燥结,苔薄黄,舌质红,脉弦数。常用方药:黄连、吴茱萸、红藤、蒲公英、绿萼梅、川楝子、香附、八月扎。

加减: (1)胃酸过多,可用乌贼骨、象贝以抑酸和胃。 (2)胃酸过少,则用乌梅以促进胃酸分泌。 (3)若口干甚, 舌干少津,苔光,脉细者乃热伤胃阴,当酌加北沙参、麦冬、川石斛、天花粉以滋养胃阴。 (4)大便干结,则用火麻仁、炙瓜蒌仁以润肠通便。

14 食结胃腑 证见: 脘腹胀甚而痛, 不思饮食, 嗳腐吞酸或呕吐不消化食物, 便溏不爽, 苔白腻或黄腻, 脉弦滑。

收稿日期: 2007 - 10 - 14

作者简介: 张舒雁(1959-), 女, 浙江杭州人, 主任医师, 学士, 主要 从事中医针灸学研究。 常用方药:广木香、杭白芍、生甘草、川朴、焦冬术、茯苓、陈皮、枳壳、焦谷麦芽、鸡内金。

加减: 若食积湿滞化热则加用黄芩、川连以清热化湿。 1.5 胆胃不和 证见: 右胁疼痛牵及胃脘甚或肩背, 嗳气, 口苦, 纳减, 苔黄薄腻, 脉弦。患者多有胆囊炎、胆结石病史。 常用方药: 柴胡、炒枳壳、杭白芍、生甘草、川楝子、鸡内金、 金钱草、广郁金、忍冬藤、蒲公英、黄芩、制军。

1. 6 肝血不足所致肝胃不和 证见:胃脘疼痛,胸闷嗳气,纳减,头晕乏力,寐劣心悸,面色不华,唇甲色淡,舌淡脉细。常用方药:当归、白芍、炙甘草、茯苓、柴胡、大枣、淮小麦、枸杞子、佛手、玫瑰花、绿萼梅、焦麦芽。

加减: 若兼见头昏胀痛, 恶心, 烦躁, 则属阴虚阳亢, 可用生地、麦冬、川石斛、钩藤、石决明、代赭石、白蒺藜以平肝潜阳。

17 肺胃痰滞 证见:胃痛脘痞,痰多,胸闷,泛恶,纳食呆钝,苔白腻,脉滑。常用方药:制半夏、茯苓、陈皮、生甘草,杏仁、旋复花、淡竹茹、 代赭石、炒枳壳、川朴、苏梗、玫瑰花。

1.8 瘀血阻胃 证见:胃脘刺痛,痛处固定,舌见瘀斑或 泛紫,脉弦涩。常用方药:当归、赤芍、白芍、炙甘草、玫瑰 花、延胡索、橘络、郁金、旋复花、女贞子、墨旱莲。

加减: 若胃痛继见呕血便血, 用墨旱莲、仙鹤草收敛止血, 藕节、参三七止血而不留瘀, 加党参、黄芪以益气调血。 2 结 语

鉴于疏肝理气在胃病治疗中的重要性, 临床上需注意选择味薄、气清之品, 所用计量亦轻。盖气机郁滞变换不定, 唯轻清灵动而不重浊滋腻之品调理气机最佳。且肝胃性刚而脾性柔, 过刚易伤肝胃, 过柔则易伤脾。故切记用药清轻, 点到即止, 以平为期。

欧盟批准阿瓦斯丁用于治疗肺癌

据新华社讯: 罗氏公司近日宣布, 欧盟已经批准该公司 阿瓦斯丁 (贝伐单抗)的两种剂量 (7.5mg和 15mg)用于治疗晚期非小细胞肺癌 (NSCLC)。

阿瓦斯丁早已在美国获得批准用于治疗 NSCLS。2007年7月, 欧盟专家组也建议将该药物用于治疗 NSCLDC。研究数据显示, 半剂量与常规剂量阿瓦斯丁用于延缓晚期肺癌肿瘤生长的效果相同。

阿瓦斯丁最初被批准用于治疗结肠癌,目前也可以用于治疗乳腺癌和肺癌。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中华中

医药

刊