经典医籍析疑

桂枝在《伤寒论》中的具体应 用非常广泛,在不同的方剂配伍中, 发挥着不同的治疗作用。但其主要 作用可归纳如下七方面:

一、解肌和营疗表虑

《伤寒论》云:"太阳病,发 热汗出,恶风,脉缓者,名为中风。" (2条)"太阳中风,阳浮而阴弱, · 阳浮者热自发, 阴弱者汗自出, 啬 **啬恶寒,淅淅恶风,蠢蠢发热,鼻** 鸣干呕者,桂枝汤主之"(12条), 由于风寒外袭时,卫气盛于外与邪 相争、卫气受邪, 不能固外, 使营 阴不能内守, 则卫强于外, 营弱于 内,因而出现"卫气不共.营气 谐 和", 营卫功能失调的病理状态。 故主以桂枝汤调和营卫,其间桂枝 辛温宣通卫阳,祛风散寒,驱邪外 出; 芍药酸苦微寒,能敛阴液,和 营于内, 两者相伍于解表之中寓敛 汗之意,和营之中有调卫之功。故 张锡纯认为:"桂枝非发汗之品, 亦非止汗之品,其宣通表散之力, 旋转于表里之间,能和营卫……其 功用在半散半补之间也。"由此可 知,桂、芍相伍,解肌和营,它如 桂枝汤的加减方,桂枝加葛根汤、 桂枝加厚朴杏仁汤、桂枝加芍药生 姜各一两人参三两新加汤等方,均 寓此义。

二、发表散寒治表实

试论《伤寒论》中的桂枝及其应用

637325 四川省南部县升中医院 邱明国 何仁君

主题词 《伤寒论》 太阳病/中医药疗法 痹证/中医药疗法 桂枝/治疗应用

亦如同功。

三、温助心阳镇惊悸

《伤寒论》常取桂枝与甘草、 龙、牡配用, 达温助心阳以镇惊悸 之功。仲师云:"伤寒脉浮,医以 火迫刼之, 亡阳必惊狂, 起卧不安 者, 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎 龙骨软 逆汤主之。"(115条)发汗过多,其 人叉手自冒心,心下惊,欲得按者, 桂枝甘草汤主之。"(64条)太阳病 本应发汗,但不能发汗过多。因汗 乃心之液, 是阳气蒸化津液而成, 若发汗不当,火刼、烧针等强发其' 汗,汗出过多则心阳随之而耗,阳 为心之神,阳虚不能养神,心脏失 去阳气的庇护,则空虚无主,或心 神浮越不敛而致惊狂,起卧不安等 证作矣,故用桂枝以入心补助心阳; 甘草甘温以滋心液,且二药相合, 辛甘合化为阳, 又以补阳为主, 阳 生阴化以奉于心; 龙牡以潜镇浮越 之神气。桂枝甘草、龙牡合用使心 阳得充, 浮神得潜, 则悸动, 惊狂 得平。它如桂枝甘草龙牡汤等,均 取此义。

还有重用桂枝平冲降逆的,桂 枝加桂汤也取其温助心阳,而使冲 逆平降的。

四、温经诵络止痹痛

 痛剧,汗出短气,小便不利、恶风 不欲去衣,或身微肿者,甘草附子. 汤主之。" (180条)

由于风寒湿邪伤于肌表,留注 关节,凝滞不解,筋脉不利,障碍 、凝滞不解,筋脉不利,障碍 、避寒不至合而为痹也"。 疾湿三气杂至合而为痹也"。 疾寒不通则痛。故用桂枝既能则;。 放果不通则,能温经短阳;附此。 数果。 以来,善温经扶阳,凝邪得散,加阳等。 发络畅通,发那得行,痹痛, 是少如因血虚寒凝,血脉不散风寒。 少如因血虚寒凝,血脉不散风畅血。 生枝温经,以使脉畅血 复辨,以使脉畅血 复辨通。

五、健脾扶虚愈腹痛

六、通阳化气行蓄水

在《伤寒论》中用治太阳蓄水 之"消渴"、"水逆"等证。常与 茯苓、白术相须为用,以达通阳化 气行水之功。

《伤寒论》曰:"太阳病,发 汗后,大汗出,胃中干,烦燥不得 眠,欲得水者,少少与饮之,令胃

经典 医籍 析 疑 때때때때

《伤寒论》年代久远,屡经传抄、撰次、翻刻,存在衍文、讹误、错简等现象。本文试就《伤寒论》 二条条文进行考订辨析,以期正于同道。

第145条之"上二焦"应为"上三焦"。

《伤寒论》第145条谓:"妇人 伤寒,发热,经水适来,昼日明了, 暮则谵语如见鬼状,此为热入血室, 无犯胃气,及上二焦,必自愈。" 通过考证,此文"上二焦"是"上 三焦"讹误,理由如次。

其次,秦汉时期,三醮与上焦、 中焦、下焦每多互称。关于"膲"

气和则愈。若脉浮, 小便不利, 微 热消渴者, 五苓散主之。"(72条) "中风发热,六七日不解而烦,有 表里证。渴欲引水,水入则吐者, 名曰水逆。五苓散主之。"(71条) 由于太阳表邪未解,随经传太阳之 腑致膀胱气化不利、水蓄下焦,而 成经腑同病。《灵兰秘典论》曰: "膀胱者,州都之官、津液藏焉,气 化则能出矣。"用桂枝之辛温,宣 通阳气,化气行水,并能散肌表之 邪、伍白术燥湿助土,恃桂上升、 通阳之效捷, 茯苓健脾利小便, 导 水下行, 桂、术、芬合用使气腾津 化, 蓄水得消、则"渴"、逆自止 也。可见、五苓散之行水, 主要取决

《伤寒论》条文辨误二则

100029 北京中医学院 黄金昶

主题词 《伤寒论》——考证

字,《集韵》言"膲,通作焦", 《甲乙经》,《太素》瞧皆作焦, 《血证论》复云"三焦,古作膲。" "焦"、"膲"二字古可通假。"膲" 字从肉, "三膲"当为人体一种组 织所构成的特殊器官。秦汉之际, 三焦有广义、狭义之别,广义三焦 为该特殊器官的总称, 狭义三焦则 指其中的上、中、下某一部分。狭 义的三焦在当时文献中摭拾不鲜, 如《素问·灵兰秘典论》曰: "三 系《灵枢·营卫生会篇》"下焦如 渎"之语,不难推知此"三焦"乃 指下部之三焦,即"下三焦",简 称"下焦"。又如《黄庭经》曰"肝 之为气且长, 罗列五脏生三光, 上. 合三焦饮胃浆,我神魂魄在中央"。 此"三焦"即为"上三焦"。

再次、作"上三焦"前后文理 相贯。因为三焦分为上中下,则不 应有上二焦。古有"胃之二焦"乃 指中上二焦。病可刺证所说的上三 膲即是上焦,其意为病在下焦,勿 要犯其胃气及上焦,待其血下而愈。

综上观之,"上二焦"当是"上 三焦"之讹误。

第133条"烦"为衍文。

为该特殊器官的总称,狭义三焦则 指其中的上、中、下某一部分。狭 义的三焦在当时文献中摭拾不鲜, 经》第七卷·热病阴阳交并少阴厥 如《素问·灵兰秘典论》曰: "三 焦者,决渎之官,水道出焉,"联 证悉具而躁者死。"二者文中虽为 系《灵枢·营卫生会篇》"下焦如 "烦躁"与"躁"一字之差,则治 读"之语,不难推知此"三焦"乃 指下部之三焦,即"下三焦",简 上下文判断,当以《脉经》文句为 称"下焦"。又如《黄庭经》曰"肝 是,宜用"躁"字。

《伤寒论》第134条言:"太阳病,脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚,头痛发热,微盗汗出,而反恶寒者,表未解也。医反下之,动数变迟,膈

于桂枝气化作用的结果。近年来有人用含桂枝的五苓散0.25克/公斤给麻醉犬静脉注射,可使犬尿量明显增加,单用桂枝静注(0.029/公斤)利尿作用比其他四药单用显著。由此可见,在五苓散的化气行水功效中,桂枝是其主要成分。茯苓桂枝甘草汤、茯苓桂枝甘草大枣汤等,均寓此义。

七、通络活血治血瘀

在《伤寒论》中主要用治邪热 内入与瘀血相结于少腹部位的蓄血 证。仲师云:"太阳病不解,热结 膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。 其外不解者,尚未可攻,当先解其 外。外解已,但少急结者,乃可攻,

结语

1. 《伤寒论》所用之桂枝应 当是桂树的粗枝皮,即今之"肉桂"

证辨析

表虚证"

629100 四川省蓬溪县中等卫生职业学校 张

主题词 中风(中医) 气虚

表虚证分为"中风表虚证"似 下称"中风证")和"气亏表虚证" (以下称"表虚证"),二者类似 之处颇多,兹辨析如下。 一、病因病机辨析

二者均有卫气失常,肌表不固, 腠理疏松的病理特点。中风证是因 外感风邪, 使营卫不和所致。风邪 袭人,与卫相遭,卫气不固护肌表 而浮起迎邪, 复因风性开泄, 导致 肌腠疏松,营阴不内守而外泄,形 成《伤寒论·第53条》所云的"卫 气不共荣气谐和"的中风证。气虚 证是气虚不能营养肌肤,腠理不密, 失去屏障作用所致。气的生成和布 达与脾肺关系极为密切。肺主气, 外合皮毛, 脾生气, 外荣肌肉。二 者正常则气能"熏肤,充身,泽毛" (《灵枢·决气》),亏虚则卫气 乏源, 肌腠失养, 藩篱疏松, 成为 表虚证。

二、主症辨析

二者都有汗自出,恶风(寒) 的主要表现。

1. 汗自出: 中风证的特点是: ①因邪正相争, 互为进退, 故汗出 时止时作;②《伤寒论·第95条》 有"发热汗出"之说,《医宗金鉴》注 曰: "卫为风入则发热",故汗出 之前有翕翕发热的征兆;③"病人 脏无它病"(《伤寒论·第54条》), 故虽汗出而无脏腑虚衰的表现; ④ 气无亏耗,故汗出不受劳作影响。

气虚证的特点是: ①气虚不能 摄津,故汗液"不因劳动,不因发 散, 戟然自出"(《类证治裁·汗 症论治》);②《素问·刺志论》。 谓:"气虚者, 寒也", 故汗出时或

汗出后常有形寒畏冷的现象; ③气 虚主要责之脾肺,故汗出时常伴内 脏亏虚的表现; ④"劳则气耗"(傃 问·举痛论》),表气愈虚,故劳 作时汗出更甚。

2. 恶风 (寒): 中风证因风 阻卫阳,肌表不胜风袭,故病人虽 加衣近火, 仍见风 (寒) 即恶, 无 有已时。

表虚证因气虚生寒,肌肤失去 温养,故病人时时憎风恶寒,但覆 被趋温即可缓解。

三、舌脉辨析

二者舌苔变化均不明显。如表 虚证复感外邪,二者都可见到浮脉。 中风证邪在肌表, 故舌质亦多属正 常;风性疏泄弛张,故中风证脉多 为浮缓。气虚证因气虚无力运血于 舌,故舌质多为淡白;无力推动血 脉,故脉多为细弱。若新感外邪, 脉叉以浮弱无力为主。

四、兼症辨析

中风证常兼表症。如邪來太阳, 经输不利, 可见头痛颈强; 邪袭肺 卫, 肺气不利, 可见鼻塞鼻鸣, 咳 嗽; 邪正相争, 卫气抗邪, 可见濈 濈发热等。

表虚证常兼气虚之症。如气衰 神弱,功能减退,可见精神萎靡, 声低乏力;气虚则血弱肌肤失养, 可见面色㿠白; 气虚机体防御功能 减退,故易于感冒等。新感之后, 虽亦兼表症但同时必见气虚指征, 这又是表虚证新感外邪之后与中风 证的重要区别。

五、治法辨析

中风证宜发汗解肌,调和营卫。 因风伤肌脏, 致营阴外泄, 病在表

内拒痛, 胃中空虚, 客气动膈, 短, 气躁烦,心中懊怅,阳气内陷,心 下因硬,则为结胸,大陷胸汤主之"。 "躁烦"本为结胸一主证,而第133 条却以"烦躁"为目,来断生死, 此前后矛盾, 医理不通。故此先贤 多有疑义,如魏荔形氏认为"此条 乃承上条,脉见浮大而言,必结胸 证具,脉兼浮大而加以烦躁,方可 言其死。不然,烦躁亦结胸之证也。 何递然死耶。"因魏氏未作校堪考 订,注释欠妥,遍遭后人非议。殆 《伤寒论》言烦、躁者,凡84条, 其中烦证57条,躁证7条,烦躁证 16条, 躁烦证 5条, 病症不同, 预 后有异。临床表现由烦→烦躁→躁 烦→躁是病情加重趋势。一般而论, 只烦不躁, 病势轻浅, 预后较佳。 烦、躁并见,病情较重,尚可治疗, 但亦易致死。惟躁而不烦之证,是 绝证、死证。第134条结胸证躁烦不 死,第133条烦躁却死。此与仲景之 "躁烦"重于"烦躁"本意不合,又与 仲师"但躁不烦者,死"明训相悖。 追溯其源,乃本于误衍一"烦"字。 窃思仲景著书,别具一格,一字千 金,后学不识,妄作横批修易,致使 仲景本意腌昧不明如此,岂不悲哉! արումանության ուսարդություն արդանում անումանում անումանում արդանակության ու արդանում անումանի հայուրա անումանո

同属,与今日习用之桂枝——"柳 桂"有着药用部位上的差异,弄清 了这个问题,至于"去皮"的问题就 迎刃而解了。

2. 根据辩证的,继承 的 观 点、笔者认为在《伤寒论》用桂方 中,还是以今之桂枝——"柳桂" 为好,也就是不存在其"表层之粗 可去的问题了。若意取补火助阳, 引火归源之功时还是以古之桂枝— "肉桂"为优。

3. 《伤寒论》一书对桂枝的应 用虽然广泛,但归结起来,不外以 上七个基本方面。明乎此,对于仲 师的用"桂"规律,则能思过半 矣。

经典医籍析疑 咖啡咖啡