- (8) 生山楂冲剂, 制备方法同焦山楂冲剂。
- 2.试验菌种的准备: (1) 福氏痢疾杆菌 (F2a)。(2) 宋内氏痢疾杆菌。(3) 普通变形杆菌。(4) 大肠杆菌。

上述菌种皆从临床标本分离而得,并经常规方法鉴定。先分别选取典型菌落种入 1 毫升 肉汤培养基内, 37°C 解育18小时,然后取出稀释之,分别加入试管或倾注入平皿内。

- 3.试验方法,(1) 试管稀释法。(2) 平皿打孔法。
- 4.试验结果, 见表3。

表5		和 酶	试 验	结	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					 -
药	物	福氏痢疾杆菌	宋内氏痢疾杆	歯 变	形 杆	菌	大	肠	杆	歯
白扁豆花水煎剂		_	-				_			
白扁豆花95%醇提取物		+	_		+	-				
生山楂水煎剂		++++	++		+ +		+ +			
生山楂95%醇提取物		++++	+++		+ + +		+++			
焦山楂水煎剂		+++	+++		+ +		тг			
焦山楂95%醇提取物		++++	+++		+ + + +		+++			
生山楂冲剂		++++	++++		+++		++++			
焦山楂冲剂		++++	++++	1	+++		++++			

注:"一"代表无抑制细菌生长的作用 "+"表示有微弱的抑制细菌生长作用 "++++"表示抑菌作用较强 四、讨论

1.焦山楂、白扁豆花对急性菌痢和肠炎有较好的疗效。符合验、普、简、廉的原则,便于广大农村推广。2.从初步临床观察,焦山楂治疗菌痢效果较好(治愈率83.33%),白扁豆花治疗急性肠炎效果较好(治愈率71.43%,有效率100%)。3.从表3可以看出白扁豆花、生山楂、焦山楂的乙醇提取物有抑菌作用,其抑菌作用较水煎剂有所增强。4.生山楂和焦山楂的抑菌作用无明显差别,因此临床可考虑直接用生山楂治菌痢、肠炎。

芫 花 根 皮 治 疗 牙 疼

河南省桐柏县城郊公社卫生院

在中草药群众运动中,我院深入群众,对芜花根皮做了一些研究。制出了牙疼水。

- 一、处方: 芫花根二层皮。
- 二、制法: 加75%酒精适量浸泡(或用开水浸泡)三至五天。
- 三、用法: 用棉球沾药液放患牙上三至五分钟。
- 四、疗效:试验多种牙疼130例,只有2例无效,其余绝大多数病例在三至五分钟止疼,极个别二十分钟止疼。
- 五、病例:王××之母,63岁,15年来龋齿牙疼,时轻时重。1972年6月份连续疼痛二十余天,曹服中西药无效。经用此药后三分钟止疼,当晚吃饭睡觉正常。第二天复又微疼,又用此药一次三分钟止疼,至今三个月(7~9月)未再复发。
- 六、体会: 1.对各种牙疼疗效较好,见效快,经济简便,易于制作,方便群众。2.经过初步观察,此药外用对于外伤,化脓性疮疖、湿疹、皮炎、白癜风等有一定疗效。另外用芜花根二层皮(鲜的)一两用水久煎内服,对于一般腹痛和跌打损伤,也有一定疗效。

1978年第8期 (总161) • 33 •