(总 147)・3・

一、寒厥:

- 2. 纯阴无阳之脏厥:"伤寒,脉微而敞,至七八日肤冷,其人躁无暂安时者,此为脏厥……" (第338条)证属阴寒极甚,有阴无阳,合柯韵伯所谓"伤寒脉微而厥,烦强者……此至七八日而肤冷不厥") 躁,是纯阴无阳,因脏寒而厥" 之理,治当急救回阳、益气固脱、宜、食投大剂参附及四逆之属,以挽救生命垂危之倾刻。

二、热厥

- 1. 阳明经证热版:"伤寒脉滑而厥者、里有热、白虎汤主之。" (第350条) 因邪热深伏于里、阳气 毋能通达四肢、故手足厥冷、方用 白虎汤,以清解阳明独胜之热。里 热得清,阳气自可宣通,则肢厥可愈。如《医宗金鉴》云:"今脉滑 而厥、滑为阳脉、里热可知,是热 厥也。然内无腹满痛,不大便之证, 是虽有热而里未实,不可下而可清, 故以白虎汤主之。"
- 2. 阳明腑实热厥: "伤寒,一二日至四五日,厥者必发热,前热者后必厥,厥深者热亦深,厥微者热亦微。厥应下之……" (第335条) "厥应下之"乃本厥之治则。所谓"下之",乃"泻下"、"攻下"之意,诚然也含清涤蕴热之义。攻下当用承气之属,因此厥纯属阳阴腑实之热厥,系胃肠积热、燥屎内

《伤寒论》厥 证论治

332300 江西省武宁县中医院 周平龙

主题词 《伤寒论》

厥证/中医药疗法

结、腑气不通而致,而临床应据其证情之轻重,分别选用三承气汤。如高学山云:"此条之厥与他处不同,他处为冷厥,此为热厥故也…… 热厥与阳明胃实同治,以胃实而阻塞阳气,不得外通也,当视其热之深微而量主大小承气而下之。"

三、气厥

肝郁气滞之厥:"少阴病,四逆……四逆散主之。"(第318条)本条因肝胃气滞、阳郁不达而致厥。方选四逆散,以疏肝和胃、透达郁阳,则厥自止。《医宗金鉴》解释本方曰:"故君柴胡以疏肝之阳,臣芍药以泻肝之阴,三物得柴胡能外走少阳之阳,内走厥阴之阴,则肝胆疏之性遂而厥可通也。"

四、血厥

五、痰厥

痰涎壅盛之厥: "病人手足厥冷……邪结在胸中……当须吐之,宜瓜蒂散。" (第355条)证因痰涎壅塞、食积停滞、胸阳被遏而不达,故手足厥冷。宜用瓜蒂散因势利导,涌吐胸中之邪,邪除而阳气通,厥

冷可回。《医宗金鉴》云: "寒饮实邪,壅塞胸中,则胸中阳气为邪所遏,不能外达四肢,是以手足厥冷……当吐之,宜瓜蒂散涌其在上之邪,则满可消而厥可回矣。"

六、浊厥

胃寒浊阴上逆之厥:"少阴病, 吐利,手足逆冷……吴茱萸汤主之。" (第309条) 证属寒邪犯胃、 浊阴中阻上逆、胃阳失布而手足逆冷。治用吴茱萸汤,以温中和胃、 泄浊通阳。胃寒得散,浊阴亦除, 胃阳布而厥冷回。

七、水厥

水饮内停之厥: "伤寒,厥而心下悸,宜先治水,当服茯苓与则不少有。" (第356条)水饮内停则阳气被遇,乃见手足厥冷。治当温阳化饮,方用茯苓甘草汤。汪苓友曰: "厥而心下悸者,明系消渴饮水乡,寒饮留于心下,胸中之阳,不能四布,故见厥,此非外来之寒比也。故中景之法,宜先治水,须与茯苓甘草汤,而治厥之法,即在其中,盖水去则厥自除也。"

八、蚘厥

(作者简介:周平龙,男,28 岁。1986年毕业于江西中医学院, 现任江西省武宁县中医院中医师。)