

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Izak Jenko

Kompleksni torusi in eliptične krivulje

Delo diplomskega seminarja

Mentor: izr. prof. dr. Sašo Strle

Ljubljana, 2022

KAZALO

1. Uvod	4
2. Algebraične krivulje	4
2.1. Afine algebraične krivulje	5
2.2. Projektivne algebraične krivulje	7
2.3. Nesingularne kubike	11
3. Eliptične funkcije	16
3.1. Lastnosti eliptičnih funkcij	17
3.2. Weierstrassova funkcija \wp	22
4. Kompleksna struktura in holomorfne preslikave	28
4.1. Definicije in lastnosti	28
4.2. Kompleksna struktura na eliptični krivulji	32
4.3. Kompleksna struktura na torusu	38
5. Uniformizacija	43
5.1. Izomorfizem $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C})$	43
5.2. j -invarianta	46
Slovar strokovnih izrazov	48
Literatura	48

Kompleksni torusi in eliptične krivulje

POVZETEK

Complex tori and elliptic curves

ABSTRACT

Math. Subj. Class. (2020):

Ključne besede:

Keywords:

1. UVOD

Matematike pogosto zanimajo rešitve različnih enačb. Obstoj rešitev, kakšne lastnosti imajo in kako se obnašajo pod raznimi transformacijami. Osrednja tema moje naloge bo preučiti in ustvariti geometrijsko predstavo množice ničel kompleksnega polinoma tretje stopnje posebne oblike. To množico ničel si lahko predstavljamo kot realno ploskev in ji pravimo eliptična krivulja. Zgodovinsko je eliptična krivulja množica ničel enačbe

$$y^2 = x^3 + ax + b.$$

V tem delu pa se bomo ukvarjali z nekoliko prilagojeno – projektivno – obliko te enačbe. Množicam ničel polinomov več spremenljivk pravimo *algebraične krivulje* in z njimi bomo začeli v poglavju 2.

Pri iskanju rešitev polinomskih enačb se razmeroma hitro porodi vprašanje, iz katerega ambientnega prostora sploh sprejemamo veljavne rešitve. Spomnimo se fundamentalnega izreka algebre, ki pravi, da ima vsak nekonstanten polinom s kompleksnimi koeficienti ničlo v polju kompleksnih števil, med tem ko brez težav poiščemo realne polinome, ki realnih ničel nimajo. Podobno situacijo imamo tukaj. Eliptične krivulje se namreč da študirati nad mnogo različnimi polji. Nad končnimi polji igrajo eliptične krivulje pomembno vlogo v kriptografiji, nad poljem racionalnih števil in njihovih razširitvah pridejo do izraza v algebraični teoriji števil, mi pa jih bomo v tem delu gledali nad poljem kompleksnih števil.

V primeru obravnave nad poljem kompleksnih števil eliptične krivulje naravno pridobijo dodatno kompleksno strukturo in na ta način postanejo t. i. *Riemannove ploskve*. Ta struktura nam omogoči analizo holomorfnih funkcij na prostorih, ki niso nujno domene v kompleksni ravnini in jo bomo bolj podrobno preiskali v poglavju 4. V nadaljevanju bomo videli, da tudi torus premore strukturo Riemannove ploskve in ga bomo skupaj s to strukturo imenovali kompleksni torus. Izkaže se, da je kompleksni torus najbolj smiselna domena dvojno periodičnih oz. eliptičnih funkcij. Lastnosti in obnašanje eliptičnih funkcij si bomo ogledali v poglavju 3, ključno vlogo pa bo igrala prav posebna Weierstrassova eliptična funkcija \wp . Skupaj s svojim kompleksnim odvodom Weierstrassova funkcija \wp zadošča enačbi

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3,$$

ki je po obliki presenetljivo podobna enačbi eliptične krivulje. Ta zveza nam bo nazadnje v poglavju 5.1 omogočila konstrukcijo preslikave, ki bo pokazala, da sta kompleksni torus in eliptična krivulja v nekem smislu enaka matematična objekta.

Vredno je še opomniti, da eliptične krivulje in področja, v katerih se uporabljajo, nimajo več vsebinsko praktično nič opravka z elipsami. Izkazalo se je, da so inverzi funkcij, s katerimi računamo dolžine lokov elips, dvojno periodični oz. eliptični, če jih gledamo kot funkcije kompleksne spremenljivke. Te dvojno periodične funkcije pa so tesno povezane z enačbo, ki ji zadoščajo eliptične krivulje in se bomo k njim vrnili v poglavju 3.

2. ALGEBRAIČNE KRIVULJE

Algebraične krivulje so množice ničel polinomov nad različnimi polji. V tem poglavju bomo začeli z afinimi algebraičnimi krivuljami, ki jih v nadaljevanju sicer ne bomo direktno potrebovali, bodo pa igrale pomembno vlogo pri razumevanju projektivnih algebraičnih krivulj, ki jih bomo vpeljali takoj za tem. Zaradi namenov

tega dela, algebraičnih krivulj ne bomo obravnavali nad povsem splošnimi polji, pač pa se bomo omejili na polje kompleksnih števil, ki ga bomo označevali s \mathbb{C} . V smislu enodimenzionalnega kompleksnega prostora bomo množici kompleksnih števil pravili tudi kompleksna premica.

2.1. Afine algebraične krivulje. Naj $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ označuje kolobar polinomov n spremenljivk s kompleksnimi koeficienti. Množica ničel poljubnega polinoma $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ je

$$V(f) = \{p \in \mathbb{C}^n \mid f(p) = 0\} \subseteq \mathbb{C}^n.$$

Definicija 2.1. Množica $C \subseteq \mathbb{C}^2$ je *afina algebraična krivulja*, če obstaja tak polinom $f \in \mathbb{C}[x, y]$ stopnje vsaj 1, da je

$$C = V(f).$$

Afine algebraične krivulje si lahko predstavljamo, kot nekaj podobnega ploskvam v prostoru \mathbb{R}^4 , če naredimo identifikacijo $\mathbb{C} \equiv \mathbb{R}^2$. Dve kompleksni spremenljivki polinoma lahko zamenjamo s štirimi realnimi, prav tako pa tedaj tudi polinomska enačba $f(x, y) = 0$ razpade na dve realni. To sta

$$\operatorname{Re} f(x_1 + ix_2, y_1 + iy_2) = 0 \quad \text{in} \quad \operatorname{Im} f(x_1 + ix_2, y_1 + iy_2) = 0,$$

kjer so $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ realne spremenljivke. Pogoji, ki jim zadoščajo točke na afini algebraični krivulji $C \subseteq \mathbb{R}^4$, so zelo podobni tistim, ki definirajo gladke podmnogoterosti z glavno razliko, da gradienti teh definicijskih funkcij niso nujno (realno) linearno neodvisni. To bi bilo na C razvidno kot samopresečišča ali osti, ki pa jih podmnogoterosti seveda nimajo.

V ta namen bi radi definirali singularne točke na afini algebraični krivulji $C = V(f)$ kot rešitve sistema enačb

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0, \quad f(x_0, y_0) = 0.$$

Toda ta definicija zaenkrat ni dobra, saj polinom $f \in \mathbb{C}[x, y]$ ni enolično določen s krivuljo C . Zato uvedemo pojem minimalnega polinoma krivulje C .

Definicija 2.2. Naj bo C afina algebraična krivulja. *Minimalni polinom* krivulje C je polinom $f \in \mathbb{C}[x, y]$ najmanjše stopnje, za katerega velja $V(f) = C$.

Opomba 2.3. Če je f minimalni polinom krivulje C , je to tudi αf za $\alpha \in \mathbb{C}^\times$, saj je $V(f) = V(\alpha f)$. Minimalni polinomi afine algebraične krivulje se tako lahko razlikujejo za neničelno konstanto.

S pomočjo minimalnega polinoma krivulje, lahko sedaj definiramo singularne in regularne točke na njej.

Definicija 2.4. Naj bo C afina algebraična krivulja in $f \in \mathbb{C}[x, y]$ njen minimalni polinom. Točka $(x_0, y_0) \in C$ je *regularna*, če velja

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0 \quad \text{ali} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0,$$

in *singularna* sicer. Pravimo, da je afina algebraična krivulja *singularna*, če vsebuje kakšno singularno točko, in je *nesingularna* sicer.

Primer 2.5. Naj bo $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ in $g(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2$. Jasno je $V(f) = V(g)$, kar pomeni, da f in g določata isto algebraično krivuljo. Toda sistem

$$(2.1) \quad f_x(x, y) = 2x = 0, \quad f_y(x, y) = 2y = 0, \quad f(x, y) = 0$$

nima nobene rešitve, sistem

$$(2.2) \quad \begin{aligned} g_x(x, y) &= 4x(x^2 + y^2 - 1) = 0, \\ g_y(x, y) &= 4y(x^2 + y^2 - 1) = 0, \\ g(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

pa jih ima veliko. Namreč vsaka rešitev enačbe $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ reši sistem 2.2 od koder bi lahko napačno sklepali, da je vsaka točka krivulje $V(f)$ singularna. Minimalni polinom opazovane krivulje je f in iz sistema 2.1 vidimo, da singularnih točk nimamo, torej je krivulja nesingularna.

Definicija 2.4 nam omogoči formulirati prvo opazko.

Trditev 2.6. *Vsaka nesingularna afina algebraična krivulja $C \subseteq \mathbb{C}^2$ je z identifikacijo $\mathbb{C}^2 \equiv \mathbb{R}^4$ gladka 2-podmnogoterost oz. ploskev.*

Dokaz. Najprej se spomnimo definicije podmnogoterosti. Neprazna podmnožica $X \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$ je n -podmnogoterost razreda gladkosti \mathcal{C}^r , za $r \in \{0, 1, \dots, \infty, \omega\}$, če za vsako točko $x_0 \in X$ obstaja okolica $U \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$ točke x_0 in t. i. definicijska funkcija $F : U \subseteq \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ razreda \mathcal{C}^r na U , da velja

- (1) $X \cap U = F^{-1}(\{0\}) = \{x \in U \mid F(x) = 0\}$ in
- (2) Jacobijeva matrika definicijske funkcije F ima poln rang povsod na $X \cap U$, tj. rang $JF(x) = k$ za vsak $x \in X \cap U$.

Številu n pravimo *dimenzija* podmnogoterosti X , številu k pa *kodimenzija*.

Sedaj pogledajmo, da je pri nesingularnih afinih krivuljah tej definiciji zadoščeno. Definicijsko funkcijo imamo tokrat podano kar globalno na celotnem \mathbb{R}^4 . Njeno vlogo igra minimalni polinom $f \in \mathbb{C}[x, y]$, ki podaja krivuljo $C = V(f)$. Polinom f namesto kot funkcijo dveh kompleksnih spremenljivk interpretiramo kot funkcijo štirih realnih spremenljivk, njeno kodomeno, ki je \mathbb{C} , pa identificiramo z \mathbb{R}^2 , tako da ločimo realni in imaginarni del funkcije $f(x_1 + ix_2, y_1 + iy_2) = u(x_1, x_2, y_1, y_2) + iv(x_1, x_2, y_1, y_2)$. Naj bo torej $g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ podana s predpisom

$$g(x_1, x_2, y_1, y_2) = (u(x_1, x_2, y_1, y_2), v(x_1, x_2, y_1, y_2)).$$

Jacobijeva matrika te preslikave je

$$Jg = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x_1} & \frac{\partial u}{\partial x_2} & \frac{\partial u}{\partial y_1} & \frac{\partial u}{\partial y_2} \\ \frac{\partial v}{\partial x_1} & \frac{\partial v}{\partial x_2} & \frac{\partial v}{\partial y_1} & \frac{\partial v}{\partial y_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underbrace{u_{x_1} & -v_{x_1}}_{\frac{\partial f}{\partial x}} & \underbrace{u_{y_1} & -v_{y_1}}_{\frac{\partial f}{\partial y}} \\ \underbrace{v_{x_1} & u_{x_1}}_{\frac{\partial f}{\partial x}} & \underbrace{v_{y_1} & u_{y_1}}_{\frac{\partial f}{\partial y}} \end{pmatrix},$$

kjer smo v drugi enakosti po 2×2 blokih upoštevali Cauchy-Riemannov sistem enačb, saj imamo opravka s polinomi, ki so kot funkcije holomorfni v obeh svojih kompleksnih spremenljivkah. Izračun

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} - i \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = \frac{1}{2} (u_{x_1} + iv_{x_1} - iu_{x_2} + v_{x_2}) = u_{x_1} + iv_{x_1}$$

(analogno dobimo za odvod po y) in predpostavka o nesingularnosti krivulje nam zagotovita, da je v vsaki točki na C vsaj eden od parcialnih odvodov $u_{x_1}, v_{x_1}, u_{x_2}, v_{x_2}$ različen od 0. To pa že zadošča za polnost ranga Jacobijeve matrike Jg v dani točki, saj sta leva in desna 2×2 bloka alternativna predstavitev kompleksnih števil kot matrična algebra znotraj realnih 2×2 matrik $M_2(\mathbb{R})$. \square

Ta trditev pove, katere od afinih algebraičnih krivulj ne le lokalno v okolici regularnih točk izgledajo kot ploskve, temveč tudi so zares ploskve.

Na tem mestu se pojavi manjša nejasnost, zakaj afine algebraične krivulje poimenujemo ravno *krivulje*. V kontekstu realnih podmnogoterosti se sprva to poimenovanje res zdi malce neusklajeno, toda v okviru kompleksnih dimenzij ta terminologija postane smiselna. Če v definiciji podmnogoterosti namreč zgolj zamenjamo polje realnih števil s \mathbb{C} , se povedano bistveno ne spremeni. Še vedno ohranimo dejstvo, da število “linearno neodvisnih” enačb ustreza kodimenziji podmnogoterosti in analogno tudi dimenzija podmnogoterosti ustreza razliki (kompleksne) dimenzije ambientnega prostora in kodimenzije. V tem smislu so potem ti objekti, ki jih realno vidimo kot ploskve, zares tudi kompleksne 1-podmnogoterosti oziroma krivulje.

2.2. Projektivne algebraične krivulje. V tem razdelku bomo algebraične krivulje obravnavali še v projektivnem smislu. Definirali bomo kompleksno projektivno ravnino in krivulje na njej. Vpeljavo projektivne ravnine opravičujemo z mnogimi lepimi lastnostmi v povezavi s presečišči krivulj v njej, pa tudi z raznimi bolj topološkimi razlogi, kot so na primer kompaktnost algebraičnih krivulj.

Najprej bomo obravnavali kompleksno projektivno ravnino in njene lastnosti.

Definicija 2.7. *Kompleksen projektivni prostor* dimenzije n je

$$\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \langle v \sim \lambda v; \lambda \in \mathbb{C}^{\times} \rangle.$$

Tukaj \mathbb{C}^{\times} označuje multiplikativno grupo kompleksnih števil oz. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Pri tem bomo $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ – kot projektiven prostor dimenzije 2 – imenovali *kompleksna projektivna ravnina*. Pridevnik kompleksna bomo v nadaljevanju pogosto izpustili.

Primer 2.8. Kompleksen projektiven prostor dimenzije 1 smo že srečali. To je *Riemannova sfera* $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$. Včasih jo bomo imenovali tudi (kompleksna) projektivna premica. Riemannova sfera ima sicer še nekoliko več strukture, ki smo jo zaenkrat pri projektivnih prostorih izpustili, a se bomo k temu vrnili v 4. poglavju o Riemannovih ploskvah.

Projektivni prostor si lahko predstavljamo kot množico vseh enodimenzionalnih vektorskih podprostorov v \mathbb{C}^{n+1} . Ti so v našem primeru vse kompleksne premice, ki potekajo skozi izhodišče. Vse točke na posamezni kompleksni premici brez izhodišča identificiramo, ta ekvivalenčni razred pa potem tvori eno samo točko projektivnega prostora. Vsak tak ekvivalenčni razred oz. točko v projektivnem prostoru predstavimo s t. i. homogenimi koordinatami. Poljuben $x = (x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ je predstavnik ekvivalenčnega razreda $[x]_{\sim} = \{(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \lambda \in \mathbb{C}^{\times}\} \in P^n(\mathbb{C})$ kar v homogenih koordinatah zapišemo z

$$[x]_{\sim} = [x_0 : \dots : x_n]$$

in zanje velja

$$[x_0 : \dots : x_n] = [\lambda x_0 : \dots : \lambda x_n]$$

za poljuben $\lambda \in \mathbb{C}^{\times}$.

Opomba 2.9. Projektivne prostore lahko opremimo tudi s topologijo, ki nam bo omogočila govoriti o zveznosti kvocientne projekcije

$$q : \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow P^n(\mathbb{C}) \quad (x_0, \dots, x_n) \mapsto [x_0 : \dots : x_n].$$

In sicer vzamemo za odprte množice v $P^n(\mathbb{C})$ *natanko* tiste $U \subseteq P^n(\mathbb{C})$ za katere je $q^{-1}(U)$ odprta v $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$. Hkrati je to tudi največja topologija na $P^n(\mathbb{C})$, za katero je projekcija q še vedno zvezna. Tej topologiji pravimo *kvocientna topologija* in o njej si lahko bralec več pogleda v [5, poglavje 3.2.]

Komentar. Projektivne prostore lahko ekvivalentno definiramo tudi kot prostore orbit (desnega) delovanja krožnice $S^1 \subseteq \mathbb{C}$ s skalarnim množenjem na kompleksni enotski sferi

$$S(\mathbb{C}^{n+1}) = \{v \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \|v\| = 1\}.$$

Tedaj je

$$P^n(\mathbb{C}) = S(\mathbb{C}^{n+1})/S^1.$$

Ker je kompleksna enotska sfera $S(\mathbb{C}^{n+1})$ kompakten 2-števen Hausdorffov prostor, je zaradi delovanja kompaktne krožnice S^1 , tudi projektiven prostor $P^n(\mathbb{C})$ kompakten 2-števen in Hausdorffov. Podrobnosti o tem lahko bralec najde v [5, Zgled 3.43. (2)].

Za definicijo projektivnih algebraičnih krivulj potrebujemo polinome, ki so usklajeni s homogenostjo koordinat na $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. To so t. i. *homogeni polinomi*. Polinom $F \in \mathbb{C}[x, y, z]$ stopnje $d = \deg F$ je *homogen*, če so vsi njegovi monomi stopnje d oz. ekvivalentno, če za vsak $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ in vsak $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ velja

$$F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^d F(x, y, z).$$

Od tod opazimo tudi, da je zaradi tega pogoj $F(x, y, z) = 0$ neodvisen od izbire homogenih koordinat točke $[x : y : z]$, ki so zgolj neničelni skalarni večkratniki nekega predstavnika tega ekvivalenčnega razreda.

Zdaj lahko definiramo projektivne algebraične krivulje. Definicija se pričakovano ne bo drastično razlikovala od definicije afinih algebraičnih krivulj.

Definicija 2.10. Množica $C \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ je *projektivna algebraična krivulja*, če obstaja tak nekonstanten homogen polinom $F \in \mathbb{C}[x, y, z]$, da je

$$C = V(F).$$

Podobno kot v afinem primeru, želimo tudi tukaj govoriti o singularnih točkah na projektivnih krivuljah. Naj bo od tod dalje $F \in \mathbb{C}[x, y, z]$ homogeni polinom najnižje stopnje, da velja $V(F) = C$.

Definicija 2.11. Naj bo $C = V(F) \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ projektivna algebraična krivulja. Točka $[x_0 : y_0 : z_0] \in C$ je *singularna*, če velja

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0$$

in je *regularna* sicer. Projektivna algebraična krivulja je *singularna*, če vsebuje kakšno singularno točko, in je *nesingularna* sicer.

Najprej se prepričamo, da so vsi parcialni odvodi homogenega polinoma spet homogeni polinomi. Res, odvod poljubnega monoma po kateri koli spremenljivki, je bodisi 0 ali pa spet monom ene stopnje nižje. To nam zagotovi, da je definicija dobra.

Vidimo torej, da so singularne točke ravno rešitve sistema $F = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial z} = 0$. Izkaže se, da je ena enačba tukaj odveč. To pove naslednja trditev imenovana *Eulerjeva identiteta*.

Trditev 2.12 (Eulerjeva identiteta). Naj bo $F \in \mathbb{C}[x, y, z]$ homogen polinom stopnje n . Tedaj velja

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z)x + \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z)y + \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z)z = nF(x, y, z).$$

Dokaz. Ker je polinom F homogen, velja

$$F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^n F(x, y, z).$$

Če to enakost odvajamo po λ , dobimo

$$\frac{\partial F}{\partial x}(\lambda x, \lambda y, \lambda z)x + \frac{\partial F}{\partial y}(\lambda x, \lambda y, \lambda z)y + \frac{\partial F}{\partial z}(\lambda x, \lambda y, \lambda z)z = n\lambda^{n-1}F(x, y, z).$$

Nazadnje vstavimo $\lambda = 1$ in trditev sledi. \square

Sedaj bi radi razvili način, kako malce bolj “generalno” ločiti projektivne krivulje. Razlikovanje vseh krivulj želimo reducirati zgolj na različne geometrijske karakteristike in nekaj parametrov. Projektivne krivulje bomo tako razlikovali do *projektivne ekvivalence* natančno. To nam bo v nadaljevanju omogočilo omejitev obravnave ne-singularnih kubik na takšne, ki so podane s preprostejšimi polinomskimi enačbami. V ta namen najprej pogledjmo, kaj so projektivne transformacije, ki nam bodo pomagale pri tem.

Definicija 2.13. Naj bo $(a_{ij}) = A \in \text{GL}(3, \mathbb{C})$ obrnljiva kompleksna 3×3 matrika. *Projektivna transformacija* ali *projektivnost* je preslikava

$$\Phi : \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$$

$$[x : y : z] \mapsto [a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z : a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z : a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z].$$

Projektivnosti Φ je pravzaprav določena z linearno preslikavo $\mathcal{A}_{\Phi} : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$, ki predstavlja množenje z matirko A .

Nekoliko manj formalno projektivnost podamo tudi kot uvedbo novih spremenljivk

$$x = a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z', \quad y = a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z', \quad z = a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z'.$$

Opomba 2.14. (1) Analogno lahko definiramo projektivne transformacije tudi na več razsežnih projektivnih prostorih.

(2) S preslikavami te oblike na projektivni premici oz. Riemannovi sferi, smo se že srečali. Te so natanko *Möbiusove* ali *lomljene linearne preslikave*, ki tvorijo grupo (kompleksnih) avtomorfizmov Riemannove sfere.

$$\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}}) = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{C} \text{ in } ad - bc \neq 0 \right\}.$$

Preslikavo $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ lahko namreč identificiramo s preslikavo

$$[x : y] \mapsto [ax + by : cx + dy],$$

kjer ima vlogo točke $\infty \in \widehat{\mathbb{C}}$ projektivna točka $[0 : 1]$.

(3) Če definiramo kvocientno projekcijo $\pi : \mathbb{C}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, ki točki (x, y, z) priredi projektivno točko $[x : y : z]$, potem velja

$$\pi \circ \mathcal{A}_{\Phi} = \Phi \circ \pi.$$

Projektivne transformacije tvorijo grupo za kompozitum, ki jo označujemo s $\text{PGL}(3, \mathbb{C}) = \text{GL}(3, \mathbb{C})/\mathbb{C}^{\times}$, posebej je $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}}) \cong \text{PGL}(2, \mathbb{C})$. Več o tem lahko bralec najde v [2, poglavje 11]. //mogoče bi bilo fino tudi to dokazati kot trditev.

Definicija 2.15. Homogena polinoma $F, G \in \mathbb{C}[x, y, z]$ sta *projektivno ekvivalentna*, če obstajata taka projektivna transformacija Φ in $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, da velja

$$G = \lambda(F \circ \mathcal{A}_\Phi).$$

Če sta F in G minimalna polinoma projektivnih krivulj $C = V(F)$ in $C' = V(G)$, pravimo, da sta krivulji C in C' *projektivno ekvivalentni* ali *izomorfni kot projektivni algebraični krivulji*, kadar sta njuna minimalna polinoma projektivno ekvivalentna, tedaj označimo $C \cong C'$.

Projektivno ekvivalenco dveh krivulj lahko interpretiramo kot prehajanje med njunima minimalnima polinomoma z uvedbo novih spremenljivk.

Primer 2.16. //demonstriram projektivno ekvivalenco

Trditev 2.17. *Projektivna ekvivalenca je ekvivalenčna relacija na množici vseh projektivnih algebraičnih krivulj.*

Dokaz. Naj bodo $C, C', C'' \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ projektivne algebraične krivulje in $F, G, H \in \mathbb{C}[x, y, z]$ njihovi minimalni polinomi.

Relacija je refleksivna. Za projektivnost vzamemo $\Phi = \text{id}_{\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2}$ in konstanto $\lambda = 1$.

Denimo, da velja $C \cong C'$, torej je $G = \lambda(F \circ \mathcal{A}_\Phi)$ za neko projektivnost $\Phi \in \text{PGL}(3, \mathbb{C})$ in $\lambda \in \mathbb{C}^\times$. Tedaj velja $F = \frac{1}{\lambda}(G \circ \mathcal{A}_\Phi^{-1})$. Ker je $\mathcal{A}_\Phi^{-1} = \mathcal{A}_{\Phi^{-1}}$, velja tudi $C' \cong C$, zato je relacija simetrična.

Denimo, da sta projektivno ekvivalentni C in C' ter C' in C'' . Tedaj imamo $G = \lambda(F \circ \mathcal{A}_\Phi)$ in $H = \mu(G \circ \mathcal{A}_\Psi)$. Od tod vidimo, da je $H = \mu\lambda(G \circ \mathcal{A}_\Phi \circ \mathcal{A}_\Psi)$. Tako iz $\mathcal{A}_\Phi \circ \mathcal{A}_\Psi = \mathcal{A}_{\Phi \circ \Psi}$ sledi $C \cong C''$, torej je projektivna ekvivalenca tudi tranzitivna. \square

Posebej bo za nas pomembno, da je projektivna ekvivalenca ekvivalenčna relacija na množici nesingularnih kubik, kot bomo videli v nadaljevanju.

Trditev 2.18. *Naj bosta $C, C' \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ projektivno ekvivalentni krivulji. Tedaj je C singularna natanko tedaj, ko je C' singularna.*

Dokaz. Če sta F in G minimalna polinoma krivulj C oz. C' , zaradi projektivne ekvivalence obstajata projektivnost Φ in $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, da je

$$(2.3) \quad G = \lambda(F \circ \mathcal{A}_\Phi).$$

Če je C nesingularna, je $(F_x, F_y, F_z) \neq 0$ povsod na $\mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$, torej z odvajanjem zveze 2.3 v točki (x, y, z) in upoštevanjem Leibnitzovega pravila za odvajanje produkta dobimo

$$(G_x, G_y, G_z)_{(x,y,z)} = \lambda(F_x, F_y, F_z)_{\mathcal{A}_\Phi(x,y,z)} \cdot A,$$

produkt vrstice in matrike A , ki je konstantna Jacobijeva matrika linearne preslikave \mathcal{A}_Φ . Vrstica $(F_x, F_y, F_z)_{\mathcal{A}_\Phi(x,y,z)}$ je po predpostavki neničelna, matrika A pa obrnljiva, zato je njun produkt spet neničelna vrstica, torej je $(G_x, G_y, G_z)_{(x,y,z)} \neq 0$. \square

Z drugimi besedami ta trditev pove, da projektivna ekvivalenca ohranja singularnost oziroma nesingularnost krivulj. Izkaže se, da ohranja tudi mnoge druge pomembne geometrijske karakteristike, kot so tangente, prevoji, presečne večkratnosti, redi točk ipd., toda v tem delu o njih ne bomo podrobneje govorili. O tem lahko bralec več izve v [2].

2.3. Nesingularne kubike. Začnimo z definicijo projektivne kubike.

Definicija 2.19. *Projektivna kubika* je projektivna algebraična krivulja v $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, katere minimalni polinom je tretje stopnje. V splošnem je podana z enačbo

$$C : \quad ax^3 + by^3 + cz^3 + dx^2y + exy^2 + fx^2z + gy^2z + hxyz + ixz^2 + jyz^2 = 0$$

Pri izbirnem predmetu Algebraične krivulje smo spoznali popolno klasifikacijo projektivnih kubik do projektivne ekvivalence natančno. Najprej jih delimo na nesingularne in singularne, te pa dalje na nerazcepne in razcepne. Podrobneje se v to klasifikacijo ne bomo spuščali, bralec pa si lahko več o tem prebere v [2, poglavje 15]. Za nas bodo posebej zanimive nesingularne projektivne kubike, saj bomo te lahko preko projektivnosti zapisali v lepši obliki, ki jo bo lažje analizirati. Tej klasični obliki pravimo *Weierstrassova normalna forma* in v njej se enačba kubike glasi

$$(2.4) \quad y^2z = x^3 + \alpha xz^2 + \beta z^3.$$

Izkaže se, da ni vsaka kubika te oblike vedno tudi nesingularna. Za koeficienta $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ mora veljati posebna zveza, kar pove naslednja trditev.

Trditev 2.20. *Projektivna kubika $C \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ podana v Weierstrassovi normalni formi*

$$C : \quad y^2z = x^3 + \alpha xz^2 + \beta z^3$$

je nesingularna natanko tedaj, ko velja $4\alpha^3 + 27\beta^2 \neq 0$. Tedaj to krivuljo imenujmo Weierstrassova kubika.

Opomba 2.21. Vrednost $-4\alpha^3 - 27\beta^2$ je med drugim diskriminanta kubičnega polinoma $f(x) = x^3 + \alpha x + \beta$, ki nam pove kako je z večkratnostjo ničel polinoma f . Njena vrednost je enaka 0 natanko tedaj, ko f premore kakšno večkratno ničlo.

To ime privzamemo tudi v kontekstu kubik, kjer *diskriminanto Weierstrassove kubike* vpeljemo kot

$$\Delta = -16(4\alpha^3 + 27\beta^2).$$

Izkaže se, da je faktor 16 ugodno dodati za lepšo obliko računov v nadaljevanju.

Dokaz. Naj bo $F(x, y, z) = y^2z - x^3 - \alpha xz^2 - \beta z^3$. Pokažimo, da obstaja singularna točka na C natanko tedaj, ko je $4\alpha^3 + 27\beta^2 = 0$. To se bo zgodilo natanko tedaj ko bo sistem

$$\begin{aligned} 0 &= F_x(x, y, z) = -3x^2 - \alpha z^2 \\ 0 &= F_y(x, y, z) = 2yz \\ 0 &= F_z(x, y, z) = y^2 - 2\alpha xz - 3\beta z^2 \end{aligned}$$

imel netrivialno rešitev. Če je $z = 0$, dobimo iz prve enačbe $x = 0$ in iz tretje $y = 0$. To niso koordinate nobene projektivne točke, zato lahko privzamemo $z \neq 0$. Druga enačba tedaj implicira $y = 0$, tretjo lahko zaradi $z \neq 0$ delimo z z in tako skupaj dobimo

$$3x^2 + \alpha z^2 = 0 \quad \text{in} \quad 2\alpha x - 3\beta z = 0.$$

Za netrivialno rešitev tega sistema zadošča poiskati že netrivialno rešitev sistema

$$3x^2 + \alpha z^2 = 0 \quad \text{in} \quad (2\alpha x)^2 = (3\beta z)^2.$$

Ta sistem se v matrični obliki glasi

$$\begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ 4\alpha^2 & -9\beta^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 \\ z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

in ima netrivialno rešitev natanko tedaj, ko je determinanta sistema $-4\alpha^3 - 27\beta^2$ enaka 0. \square

Naslednji rezultat – katerega dokaz sicer ni zahteven, a uporablja nekatere pojme, ki jih za nadaljevanje ne bomo potrebovali – bomo samo navedli brez dokaza. Zagotavlja nam, da se lahko brez škode za splošnost pri obravnavi nesingularnih kubik omejimo samo na tiste v Weierstrassovi normalni formi.

Trditev 2.22. *Vsaka nesingularna projektivna kubika je projektivno ekvivalentna neki nesingularni Weierstrassovi kubiki.*

Dokaz. [2, lemma 15.2] \square

Ob tej trditvi pa se porodi vprašanje, kako prosto izbiramo imamo s koeficientoma α in $\beta \in \mathbb{C}$, ali je ta izbira lahko enolična? Za odgovor na to vprašanje najprej opazimo, da sta Weierstrassovi kubiki

$$C : y^2z = x^3 + \alpha xz^2 + \beta z^3 \quad \text{in} \quad C' : y'^2z' = x'^3 + \alpha' x'z'^2 + \beta' z'^3.$$

projektivno ekvivalentni, če velja, denimo $u^4\alpha' = \alpha$ in $u^6\beta' = \beta$ za nek $u \in \mathbb{C}^\times$. Namreč takrat imamo projektivnost

$$\begin{aligned} \Phi : C &\rightarrow C' \\ [x : y : z] &\mapsto [u^{-2}x : u^{-3}y : z], \end{aligned}$$

krajše zapisano

$$x = u^2x' \quad y = u^3y' \quad z = z',$$

ki identificira eno krivuljo z drugo. Ob tem se transformira tudi diskriminanta $u^{12}\Delta' = \Delta$. Naslednja lema pove, da je takšne oblike tudi vsaka projektivnost med dvema projektivno ekvivalentnima Weierstrassovima kubikama.

Lema 2.23. *Naj bosta C, C' projektivno ekvivalentni Weierstrassovi kubiki, kot zgoraj in $\Phi : C \rightarrow C'$ poljubna projektivnost med njima. Tedaj Φ fiksira točko $[0 : 1 : 0]$ in je oblike*

$$(2.5) \quad x = u^2x' \quad y = u^3y' \quad z = z',$$

za nek $u \in \mathbb{C}^\times$. Opazovane količine se tedaj transformirajo

$$(2.6) \quad u^4\alpha' = \alpha, \quad u^6\beta' = \beta \quad \text{in} \quad u^{12}\Delta' = \Delta.$$

Dokaz. Naj bosta $F(x, y, z) = y^2z - x^3 - \alpha xz^2 - \beta z^3$ in $G(x, y, z) = y^2z - x^3 - \alpha' xz^2 - \beta' z^3$ homogene polinoma s katerima sta podani projektivno ekvivalentni krivulji C in C' . Tedaj vemo, da je $G = \lambda(F \circ \mathcal{A}_\Phi)$ in naj bo A matrika linearne preslikave \mathcal{A}_Φ .

Najprej pokažimo, da projektivnost Φ fiksira točko $[0 : 1 : 0]$. Za elemente v matriki $A = (a_{ij})$ moramo torej pokazati $a_{12}, a_{32} = 0$ in $a_{22} \neq 0$.

- Če je $a_{12} \neq 0$, potem v polinomu $F(\mathcal{A}_\Phi(x, y, z))$ nastopa člen x^2z , ki ga na levi strani pri G ni,
- podobno, če je $a_{32} \neq 0$ imamo v polinomu $F(\mathcal{A}_\Phi(x, y, z))$ člen yz^2 , ki ga pravtako ni pri G .

Ker sta $a_{12}, a_{32} = 0$, mora biti $a_{22} \neq 0$, sicer bi v A imeli stolpec poln ničel, kar bi bilo v protislovju z obrnljivostjo A .

Sedaj v enačbo za C oziroma polinom $\lambda F(x, y, z)$ vstavimo

$$x = a_{11}x' + a_{13}z', \quad y = a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z', \quad z = a_{31}x' + a_{33}z'$$

in primerjamo koeficiente pri istoležnih členih z $G(x', y', z')$. Dobimo sistem enačb.

$$\begin{aligned}
x^3 : \quad -1 &= \lambda(-a_{11}^3 + a_{21}^2 a_{31} - a_{11} a_{31}^2 \alpha - a_{31}^3 \beta) \\
x^2 y : \quad 0 &= \lambda(2a_{21} a_{22} a_{31}) \\
xy^2 : \quad 0 &= \lambda(a_{22}^2 a_{31}) \\
x^2 z : \quad 0 &= \lambda(3a_{11}^2 a_{31} + 2a_{21} a_{23} a_{31} + a_{21}^2 a_{33} - a_{31}^3 \alpha - 2a_{11} a_{31} a_{33} \alpha - 3a_{31}^2 a_{33} \beta) \\
xyz : \quad 0 &= \lambda(2a_{22} a_{23} a_{31} + 2a_{21} a_{22} a_{33}) \\
y^2 z : \quad 1 &= \lambda(a_{22}^2 a_{33}) \\
xz^2 : \quad -\alpha' &= \lambda(a_{23}^2 a_{31} - 3a_{11} a_{31}^2 + 2a_{21} a_{23} a_{33} - 2a_{31}^2 a_{33} \alpha - a_{11} a_{33}^2 \alpha - 3a_{31} a_{33}^2 \beta) \\
yz^2 : \quad 0 &= \lambda(2a_{22} a_{23} a_{33}) \\
z^3 : \quad -\beta' &= \lambda(-a_{31}^3 + a_{23}^2 a_{33} - a_{31} a_{33}^2 \alpha - a_{33}^3 \beta)
\end{aligned}$$

Od tod sledi $a_{13}, a_{21}, a_{23}, a_{31} = 0$ in $a_{11}, a_{33} \neq 0$. Ob tem pa dobimo še zveze

$$a_{11}^3 = a_{33} a_{22}^2 = \lambda^{-1}, \quad \alpha' = \lambda a_{11} a_{33}^2 \alpha, \quad \beta' = \lambda a_{33}^3 \beta.$$

Ker vsi neničelni skalarni večkratniki matrike A določajo isto projektivnost, lahko brez škode za splošnost privzamemo $a_{33} = 1$. Če vzamemo $u \in \mathbb{C}^\times$ poljuben, da velja $u^6 = \lambda^{-1}$, bo

$$a_{11} = u^2, \quad a_{22} = u^3, \quad u^4 \alpha' = \alpha, \quad u^6 \beta' = \beta \quad \text{in} \quad u^{12} \Delta' = \Delta$$

in tako vidimo, da je projektivnost Φ oblike

$$x = u^2 x' \quad y = u^3 y' \quad z = z'.$$

□

Ugotovili smo, da lahko dva različna para koeficientov $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ podata projektivno ekvivalentni Weierstrassovi kubiki. Obstaja pa količina, ki se pri tovrstnih transformacijah ne spreminja – ostaja invariantna. Tej količini pravimo *j-invarianta* Weierstrassove kubike, oziroma pozneje, eliptične krivulje. Podana je kot

$$j = -1728(4\alpha)^3 / \Delta = 1728 \frac{4\alpha^3}{4\alpha^3 + 27\beta^2}.$$

Jasno je, da se pri transformaciji (2.5) iz prejšnje leme *j*-invarianta ohranja. To pokaže krajši račun

$$j = -1728(4\alpha)^3 / \Delta = -1728(4u^4 \alpha')^3 / (u^{12} \Delta') = -1728(4\alpha')^3 / \Delta' = j'.$$

Pozneje bomo videli, kako lahko *j*-invarianto gledamo tudi kot funkcijo kompleksne spremenljivke in tako malce pokomentirali “zanimivost” izbire faktorja 1728 pred celotno formulo.

Pomembna ugotovitev, ki je med drugim posledica algebraične zaprtosti polja kompleksnih števil, je naslednja.

Trditev 2.24. *Nesingularni projektivni Weierstrassovi kubiki sta projektivno ekvivalentni natanko tedaj ko imata enaki j-invarianti.*

Dokaz. Implikacija v desno je jasna iz zgornjega premisleka in leme 2.23, preostane nam pokazati še implikacijo v levo.

Denimo, da imata Weierstrassovi kubiki

$$C : \quad y^2 z = x^3 + \alpha x z^2 + \beta z^3 \quad \text{in} \quad C' : \quad y'^2 z' = x'^3 + \alpha' x' z'^2 + \beta' z'^3.$$

enaki j -invarianti, torej, da velja

$$\frac{(4\alpha)^3}{4\alpha^3 + 27\beta^2} = \frac{(4\alpha')^3}{4\alpha'^3 + 27\beta'^2}.$$

Kar nam da

$$(2.7) \quad \alpha^3 \beta'^2 = \alpha'^3 \beta^2.$$

Sedaj iščemo projektivnost oblike $x = u^2 x'$, $y = u^3 y'$, $z = z'$ za nek $u \in \mathbb{C}^\times$. Ločimo tri primere.

- (i) $\alpha = 0$. Tedaj mora biti $\beta \neq 0$, saj bi sicer C bila singularna po 2.20. Od tod iz (2.7) sledi, da je $\alpha' = 0$ in zato je tudi $\beta' \neq 0$, sicer bi bila C' singularna. Zadošča vzeti $u \in \mathbb{C}^\times$ za katerega je $u^6 = \beta/\beta'$.
- (ii) $\beta = 0$. Tedaj iz podobnih razlogov kot pri (i) dobimo $\alpha \neq 0$, $\beta' = 0$ in $\alpha' \neq 0$. Za $u \in \mathbb{C}^\times$ zadošča vzeti rešitev enačbe $u^4 = \alpha/\alpha'$.
- (iii) $\alpha\beta \neq 0$. Tedaj je tudi $\alpha'\beta' \neq 0$, namreč če bi eden od α' , β' bil ničeln, bi zaradi veze 2.7 bil tudi drugi, kar bi bilo v nasprotju z nesingularnostjo krivulje C' . Opazimo, da takrat velja

$$\left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right)^3 = \left(\frac{\beta}{\beta'}\right)^2$$

in za $u \in \mathbb{C}^\times$ zadošča vzeti rešitev enačbe $u^{12} = (\alpha/\alpha')^3 = (\beta/\beta')^2$.

□

Poleg tega pa j -invarianta v celoti popiše vse neizomorfne Weierstrassove kubike. Za poljuben $j_0 \in \mathbb{C}$ obstaja Weierstrassova kubika, ki ima j_0 za svojo j -invarianto. Če je $j_0 \neq 0, 1728$, želimo iz enačbe

$$j_0 = 1728 \frac{4\alpha^3}{4\alpha^3 + 27\beta^2}$$

izraziti koeficient α , pri tem pa imamo svobodo zahtevati $\alpha = \beta$. Tedaj bo $\alpha = 27j_0/4(j_0 - 1728)$ in kubika podana z enačbo

$$y^2 z = x^3 + \frac{27j_0}{4(j_0 - 1728)} x z^2 + \frac{27j_0}{4(j_0 - 1728)} z^3$$

ima j -invarianto enako j_0 . V robnih primerih imamo

- pri $j_0 = 0$ kubiko z enačbo

$$y^2 z = x^3 + z^3$$

- in pri $j_0 = 1728$ kubiko z enačbo

$$y^2 z = x^3 + x z^2.$$

Koncept j -invariante lahko razširimo tudi do poljubne nesingularne projektivne kubike. Pripisemo ji j -invarianto njej projektivno ekvivalentne Weierstrassove kubike, ki nam jo zagotovi trditev 2.22. Tako prostor vseh nesingularnih kubik razpade na izomorfne razrede (glede na izomorfno projektivnih algebrskih krivulj oz. projektivno ekvivalenco), kjer je favorizirani predstavnik vsakega razreda neka nesingularna Weierstrassova kubika. Glede na to razširitev j -invariante na vse nesingularne projektivne kubike, je jasno, da je j -invariantna kot funkcija nesingularnih

projektivnih kubik, na izomorfnostnih razredih konstantna. V tem smislu vidimo j -invarianto kot funkcijo

$$j : \{\text{nesingularne projektivne kubike}\} / \cong \rightarrow \mathbb{C},$$

kjer \cong označuje projektivno ekvivalenco projektivnih kubik. V tem smislu bomo z j_C ali $j(C)$ označevali j -invarianto nesingularne projektivne kubike C oz. j -invarianto njenega izomorfnostnega razreda.

Za konec tega poglavja bomo podali še definicijo eliptične krivulje nad \mathbb{C} . Ta se za naše namene praktično ne bo razlikovala od običajne Weierstrassove kubike, ki smo jo obravnavali v tem razdelku 2.3. Zaradi večje abstraktnosti standardne definicije eliptične krivulje, kot jo podaja Silverman [6, III. §3.] in naših potreb v nadaljevanju, eliptične kriulje vpeljemo nekoliko enostavnje. Presenetljivo pa je naša definicija ekvivalentna standardni, le da za to potrebujemo Riemann–Rochov izrek, ki je izven dosega tega dela.

Definicija 2.25. Nesingularna projektivna kubika $E(\mathbb{C})$ ali samo E skupaj s t. i. izhodiščem $O \in E(\mathbb{C})$ na njej, ki ga pogosto eksplicitno ne omenjamo, se imenuje *eliptična krivulja* nad poljem \mathbb{C} .

Opomba 2.26. (1) Ker nas bodo v nadaljevanju eliptične krivulje zanimale zgolj do projektivne ekvivalence natančno, bomo lahko brez škode za splošnost po trditvi 2.22 zahtevali, da je eliptična krivulja podana z enačbo v Weierstrassovi obliki

$$E : y^2z = x^3 + \alpha xz^2 + \beta z^3,$$

kjer $4\alpha^3 + 27\beta^2 \neq 0$.

- (2) Zaradi completeness smo v definicijo eliptične krivulje vključili še izbiro izhodišča, ki igra vlogo identitete, potem ko eliptično krivuljo opremimo z grupno strukturo. Za lažje računanje se za izhodišče izbere enega od devetih prevojev, ki je najpogostejše točka v neskončnosti $[0 : 1 : 0]$.
- (3) Morda smo nekoliko nepotrebno poudarjali, da je naša eliptična krivulja definirana nad poljem kompleksnih števil. Oznaka $E(\mathbb{C})$ pove, da opazujemo točke na krivulji s koordinatami iz \mathbb{C} , lahko pa bi se recimo omejili samo na tiste, ki v homogenih koordinatah premorejo predstavnika s samimi racionalnimi komponentami, in takrat pisali $E(\mathbb{Q})$. V splošnem se eliptične krivulje obravnava nad poljubnim poljem, kjer pride do izraza njegova karakteristika, ali je algebrski zaprti ipd. V našem primeru nad \mathbb{C} takšnih skrbi ne bomo imeli.

V nadaljevanju bo ugodneje namesto *klasične* Weierstrassove oblike nesingularne kubike 2.4 obravnavati malenkost prilagojeno – še vedno pa projektivno ekvivalentno obliko

$$y^2z = 4x^3 - \alpha xz^2 - \beta z^3.$$

Med to in klasično različico enostavno prehajamo preko projektivnosti

$$x = tx', \quad y = y', \quad z = z', \quad \text{kjer za } t \in \mathbb{C}^\times \text{ velja } t^3 = 4.$$

Osnovne količine se tedaj povežejo preko enakosti

$$a = -t\alpha, \quad b = -\beta$$

diskriminanta in j -invarianta pa se v koeficientih a in b izražata kot

$$(2.8) \quad \Delta = 16(a^3 - 27b^2) \quad \text{in} \quad j = 1728 \frac{a^3}{a^3 - 27b^2}.$$

3. ELIPTIČNE FUNKCIJE


Glavna vez med eliptičnimi krivuljami in kompleksnimi torusi so t. i. *eliptične funkcije*. Da jih vpeljemo, najprej potrebujemo nekaj novih pojmov.

Definicija 3.1. Aditivna podgrupa kompleksnih števil \mathbb{C} izomorfna abelovi grupi \mathbb{Z}^2 se imenuje *mreža*.

Ekvivalentno je mreža prosta abelova grupa na dveh generatorjih $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}^\times$, ki jima pravimo *osnovni periodi*, za kateri velja $\text{Im} \frac{\omega_1}{\omega_2} \neq 0$, kar pomeni, da sta \mathbb{R} -linearne neodvisni. Splošnemu elementu $\omega \in \Lambda$ pravimo *perioda*. Eksplicitno si mrežo predstavljamo kot množico točk v kompleksni ravnini

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{k_1\omega_1 + k_2\omega_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{Z}\},$$

kot kaže slika 1.



SLIKA 1. Mreža Λ in fundamentalni paralelogram D .

Na kompleksno ravnino \mathbb{C} vpeljimo relacijo

$$z \sim w \iff z - w \in \Lambda \quad \text{za vsaka } z, w \in \mathbb{C}.$$

To pomeni, da identificiramo vsaki dve točki, ki se razlikujeta kvečjemu za prišteto periodo $\omega \in \Lambda$. Brez težav se lahko prepričamo, da je to ekvivalenčna relacija na \mathbb{C} . Tako lahko tvorimo kvocientno množico \mathbb{C}/\sim , katere ekvivalenčne razrede bomo označevali z $z + \Lambda$ in jih imenovali *translati*, saj si jih lahko predstavljamo kot za vektor z translirano mrežo Λ . Pripadajoča kvocientna projekcija bo $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\sim$. Kvocient \mathbb{C}/\sim bomo od tod dalje rajši označevali z \mathbb{C}/Λ .

Zaenkrat bomo \mathbb{C}/Λ razumeli zgolj kot kvocientno množico, kasneje pa ga bomo opremili s topologijo, ki nam bo razkrila, da je ta prostor v resnici homeomorfen torusu. Za tem bomo definirali še kompleksno strukturo, ki nam bo na njem omogočila definirati holomorfne preslikave.

Definicija 3.2. *Fundamentalni paralelogram* za mrežo $\Lambda = \langle \omega_1, \omega_2 \rangle$ je

$$D_\alpha = \{ \alpha + t_1 \omega_1 + t_2 \omega_2 \mid t_1, t_2 \in [0, 1] \}.$$

Zaprte fundamentalnega paralelograma D_α v \mathbb{C} bomo označili z \bar{D}_α .

Opomba 3.3. Kadar bomo govorili o fundamentalnih domenah pogosto izbira izhodišča α ne bo pomembna, zato ga bomo tedaj izpustili in pisali samo D . V tem primeru lahko privzamemo, da je s tem mišljen D_0 .

Naslednja lema pove, da je preslikava $D_\alpha \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ bijekcija med možicama.

Lema 3.4. *Poljuben translat $z + \Lambda$ mreže $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ ima natanko enega predstavnika v fundamentalni domeni D_α .*

Dokaz. Ker sta osnovni periodi ω_1, ω_2 \mathbb{R} -linearne neodvisni, tvorita bazo za \mathbb{C} gledano kot realen vektorski prostor. Tako lahko zapišemo $z - \alpha = a_1 \omega_1 + a_2 \omega_2$, kjer sta $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Tedaj za

$$t_i = a_i - [a_i] \in [0, 1) \quad \text{za } i \in \{1, 2\},$$

kjer $[x]$ označuje največje celo število, ki ni večje od x , velja $\alpha + t_1 \omega_1 + t_2 \omega_2 = z - [a_1] \omega_1 - [a_2] \omega_2 \in D_\alpha \cap (z + \Lambda)$. \square

Spomnimo se, da so *holomorfne* funkcije na neki odprti domeni D tiste, ki jih je mogoče odvajati v kompleksnem smislu povsod na D . Kolobar holomorfnih funkcij na D označimo z $\mathcal{O}(D)$. Če je funkcija holomorfna na celotnem \mathbb{C} , pravimo, da je *cela holomorfna* funkcija. Te označimo z $\mathcal{O}(\mathbb{C})$.

Če je $S \subseteq D$ diskretna množica brez stekališč v D , potem funkcijam, ki so holomorfne na $D \setminus S$, v točkah iz S pa imajo pole, pravimo *meromorfne* funkcije, točkam iz S pa *singularnosti*. Vsako meromorfno funkcijo f na $D \subseteq \mathbb{C}$, lahko vidimo tudi kot preslikavo $D \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, kjer dodatno definiramo

$$f(w) = \infty \quad \text{za vsak } w \in S.$$

Definicija 3.5. Naj bo f meromorfna funkcija na \mathbb{C} in $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ mreža. Če za f velja

$$f(z + \omega) = f(z) \quad \text{za vse } \omega \in \Lambda \text{ in } z \in \mathbb{C},$$

potem pravimo, da je f *eliptična* oziroma *dvojno periodična* funkcija. Kadar želimo poudariti, da je f eliptična glede na mrežo Λ , pravimo, da je Λ -*periodična*. Polje Λ -periodičnih funkcij označimo z $\mathbb{C}(\Lambda)$.

3.1. Lastnosti eliptičnih funkcij. Sedaj si bomo pogledali nekaj izrekov, ki opisujejo naravo eliptičnih funkcij in jih lahko povečini priprišemo Liouvillu. Prvi je direktna posledica njegovega slavnega izreka iz kompleksne analize, ki pove, da razen konstant celih omejenih holomorfnih funkcij ni. Bralec ga lahko najde v [1].

Izrek 3.6. *Naj bo f cela eliptična funkcija. Tedaj je f konstantna.*

Dokaz. Ker je f konstantna na ekvivalenčnih razredih množice \mathbb{C}/Λ tj. translatih oblike $z + \Lambda$, je enolično določena že z vrednostjo na enem od predstavnikov vsakega translata. Po lemi 3.4 vidimo, da lahko predstavnika poljubnega translata najdemo v fundamentalnem paralelogramu D , zato bo

$$\sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)| = \sup_{z \in \bar{D}} |f(z)|.$$

Ker je f holomorfna na celotnem \mathbb{C} , je tam seveda zvezna in je zato zvezna tudi na zaprtju fundamentalnega paralelograma \bar{D} . To je zaprta in omejena množica v \mathbb{C} in

je tako kompaktna [5, Trditev 2.22]. Zvezna funkcija f je na kompaktu \bar{D} omejena, kot eliptična funkcija pa je tako omejena na celotnem \mathbb{C} [5, Posledica 2.28]. Funkcija f je torej omejena in cela holomorfná, zato je po Liouvillovem izreku konstantna. \square

Opomba 3.7. Enako lahko sklepamo tudi, če f nima ničel. Tedaj je $1/f$ cela eliptična funkcija, ko jo v polih f razširimo z 0.

Lema 3.8. *Naj bo $f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ eliptična funkcija. Tedaj je tudi njen odvod $f' \in \mathbb{C}(\Lambda)$ eliptična funkcija.*

Dokaz. Recimo, da je $z \in \mathbb{C}$ točka, kjer f nima pola, zato je v njeni okolici holomorfná in jo lahko odvajamo v kompleksnem smislu. Z odvajanjem osnovnega pogoja za eliptične funkcije dobimo

$$f'(z + \omega) = f'(z) \quad \text{za vsak } \omega \in \Lambda.$$

Če je v točki $z \in \mathbb{C}$ pol, pa ima tudi f' v tej točki pol, torej pogoj za eliptičnost velja povsod na \mathbb{C} in tako je $f' \in \mathbb{C}(\Lambda)$. \square

Vpeljimo nekaj notacije, ki jo bomo potrebovali v naslednjih izrekih. Če je f meromorfná funkcija na odprti domeni $D \subseteq \mathbb{C}$, pravimo, da je f reda $m \in \mathbb{Z}$ v točki $z_0 \in D$, če obstaja okolica $U \subseteq D$ točke z_0 in holomorfná funkcija $g \in \mathcal{O}(U)$, ki je neničelna povsod na U , da velja

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z) \quad \text{za vse } z \in U.$$

Tedaj označimo $\text{ord}_{z_0}(f) = m$. Če je $m > 0$ ima f v z_0 ničlo reda m , če pa je $m < 0$ ima f v z_0 pol reda $-m$.

Residuum ali *ostanek* funkcije f pri točki $z_0 \in D$, je koeficient pred potenco $(z - z_0)^{-1}$ v Laurentovi vrsti za f okrog z_0 . Označimo ga z $\text{res}_{z_0}(f)$.


Izrek 3.9. *Naj bo $f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ eliptična funkcija in D fundamentalni paralelogram glede na mrežo Λ , katerega rob ∂D ne vsebuje polov ali ničel f . Tedaj velja*

- (i) $\sum_{w \in D} \text{res}_w(f) = 0$
- (ii) $\sum_{w \in D} \text{ord}_w(f) = 0$
- (iii) $\sum_{w \in D} \text{ord}_w(f) \cdot w \in \Lambda.$

Dokaz. (i) Uporabimo izrek o ostankih [3, Izrek 71], ki pove

$$\sum_{w \in D} \text{res}_w(f) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} f(z) dz.$$

Razdelimo rob fundametalnega paralelograma $\partial D = \sigma_1 \cup \sigma_2 \cup \sigma_3 \cup \sigma_4$ na štiri daljice, ki ga omejujejo, kot prikazuje slika 2.



SLIKA 2. Fundamentalni paralelogram.

Jasno tedaj velja

$$\int_{\partial D} f(z)dz = \int_{\sigma_1} f(z)dz + \int_{\sigma_2} f(z)dz + \int_{\sigma_3} f(z)dz + \int_{\sigma_4} f(z)dz.$$

Z menjavo spremenljivk $w = z + \omega_1$ v prvem in $w = z + \omega_2$ v četrtem intervalu je zaradi periodičnosti f in orientacije obeh parov nasprotnih stranic (σ_1 in σ_3 ter σ_2 in σ_4) razvidno, da se integrala po parih nasprotnoležečih stranic izničita, kar nam da želeni rezultat 0.

(ii) Po lemi 3.8 je $f' \in \mathbb{C}(\Lambda)$, zato je tudi kvocient $f'/f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ eliptičen. Tedaj velja

$$\sum_{w \in D} \text{ord}_w(f) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 0.$$

Kjer smo v prvi enakosti uporabili princip argumenta [3, Izrek 72], druga enakost pa je identiteta (i), ki velja zaradi eliptičnosti kvocienta f'/f .

(iii) Oglejmo si funkcijo $z \mapsto z \frac{f'(z)}{f(z)}$. Jasno je ta funkcija meromorfna na \mathbb{C} . Naj bo $z_0 \in \mathbb{C}$ poljuben. Tedaj obstaja $m \in \mathbb{Z}$, okolica $U \subseteq \mathbb{C}$ točke z_0 in holomorfna funkcija $g \in \mathcal{O}(U)$, ki je neničelna na U , da velja

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z) \quad \text{za vsak } z \in U.$$

Z odvajanjem te enakosti dobimo

$$f'(z) = m(z - z_0)^{m-1} g(z) + (z - z_0)^m g'(z),$$

ki pravtako velja povsod na U . Skupaj tako dobimo, da za vsak $z \in U$ velja

$$z \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{mz}{z - z_0} + z \frac{g'(z)}{g(z)} = \frac{mz_0}{z - z_0} + \underbrace{m + z \frac{g'(z)}{g(z)}}_{\in \mathcal{O}(U)}.$$

Ker sta zadnja dva člena holomorfna na U , edino člen $\frac{mz_0}{z - z_0}$ prispeva h glavnemu delu Laurentovega razvoja funkcije $z \mapsto z \frac{f'(z)}{f(z)}$ okrog z_0 . Zato je

$$\text{res}_{z_0} \left(z \frac{f'(z)}{f(z)} \right) = mz_0 = \text{ord}_{z_0}(f) z_0.$$

Tako dobimo

$$\sum_{w \in D} \text{ord}_w(f) \cdot w = \sum_{w \in D} \text{res}_w \left(z \frac{f'(z)}{f(z)} \right) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Poglejmo si sedaj zadnji integral, ki ga podobno kot pri dokazu (i) razbijemo na vsoto integralov po štirih stranicah. Argument o odštevanju integralov po nasprotnih stranicah paralelograma pa tokrat zaradi neperiodičnosti funkcije $z \mapsto z \frac{f'(z)}{f(z)}$ v splošnem ne bo deloval. Z uvedbo nove spremenljivke $w = z + \omega_2$ v integral po stranici σ_1 vidimo

$$\begin{aligned} \int_{\sigma_1} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \int_{\sigma_1} z \frac{f'(z + \omega_2)}{f(z + \omega_2)} dz = \\ &= - \int_{\sigma_3} (w - \omega_2) \frac{f'(w)}{f(w)} dw = - \int_{\sigma_3} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \omega_2 \int_{\sigma_3} \frac{f'(z)}{f(z)} dz. \end{aligned}$$

Podobno z uvedbo nove spremenljivke $w = z + \omega_1$ storimo z integralom po stranici σ_2 in tako dobimo

$$\int_{\partial D} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \omega_1 \int_{\sigma_4} \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \omega_2 \int_{\sigma_3} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Za poljubno sklenjeno in odsekoma gladko krivuljo $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, tj. $\gamma(0) = \gamma(1)$, ki ne poteka skozi izhodišče $0 \in \mathbb{C}$, je

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z} \in \mathbb{Z}$$

ovojno število krivulje γ okoli 0 in nam pove kolikokrat se krivulja γ ovije okoli izhodišča. Podrobnosti o tem lahko bralec najde v [1, 4.2.1.].

Osredotočimo se sedaj samo na prvi integral, premislek za drugega je analogen. Opazimo, da je zaradi eliptičnosti f krivulja $f(\sigma_4)$ sklenjena, saj sta krajišči daljice σ_4 točki α in $\alpha + \omega_2$ v katerih ima f enaki vrednosti. Pot $\gamma : [0, 1] \rightarrow f(\sigma_4)$, ki predstavlja to sklenjeno krivuljo, je podana s predpisom $t \mapsto f(\alpha + t\omega_2)$. Opomnimo še, da to ni nujno parametrizacija krivulje v običajnem smislu, saj je lahko neinjektivna.

Zapišemo lahko

$$2\pi i k_1 = \int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} dt = \int_0^1 \frac{f'(\alpha + t\omega_2)}{f(\alpha + t\omega_2)} \omega_2 dt = \int_{\sigma_4} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

za nek $k_1 \in \mathbb{Z}$. Podobno je tako tudi

$$2\pi i k_2 = \int_{\sigma_3} \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

za nek $k_2 \in \mathbb{Z}$. Skupaj je torej

$$\sum_{w \in D} \text{ord}_w(f) \cdot w = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz = k_1 \omega_1 + k_2 \omega_2 \in \Lambda.$$

□

Opomba 3.10. (1) V vseh treh točkah seštevamo po neštevnem fundamentalnem paralelogramu D , toda vse tri vsote vsebujejo zgolj končno mnogo neničelnih členov. Residuum in red funkcije f , sta lahko različna od nič samo v ničlah ali polih f , teh pa je v kompaktnem \bar{D} lahko le končno, saj bi sicer prišli v protislovje s principom identičnosti. Ta pravi, da se meromorfnim funkcijam definiranim na neki odprti domeni Ω , ki se ujemata na množici s stekališčem v Ω , ujemata povsod na $\Omega \setminus \{ \}$.

- (2) Kot nakazuje izrek je izbira fundamentalnega paralelograma irelevantna, dokler ta izpolnjuje določene predpostavke o robu. Kljub temu pa se prepričajmo, da lahko vselej takšen fundamentalni paralelogram vedno izberemo.

Denimo, da temu ni tako, torej da ima vsak fundamentalni paralelogram na svojem robu vsaj en pol eliptične funkcije f . S translacijami

$$\tau_n : z \mapsto z + \frac{1}{n}(\omega_1 + \omega_2); \quad n \in \mathbb{N}$$

delujemo na rob fundamentalnega paralelograma ∂D in tako dobimo števno mnogo različnih polov za f . To zaporedje polov leži v uniji $\cup_{n \in \mathbb{N}} \tau_n(\partial D)$, ki jo lahko zapremo v dovolj velik zaprt disk. Na ta način dobimo zaporedje polov v kompaktu, ki ima po Bolzano-Weierstrassovem izreku stekališče, kar pa je v nasprotju s tem, da je množica polov meromorfne funkcije diskretna v \mathbb{C} .

Podobno lahko hkrati sklepamo še za ničle funkcije f in s pomočjo principa identičnosti pridemo v protislovje z diskretnostjo množice ničel meromorfne funkcije f .

- (3) Točka (ii) pove, da ima eliptična funkcija na fundamentalnem paralelogramu enako število ničel in polov štetih z večkratnostjo.

Definicija 3.11. *Red* eliptične funkcije je število polov šteto z večkratnostjo v poljubnem fundamentalnem paralelogramu.

Tudi, če pol z_0 leži na robu ∂D izbranega fundamentalnega paralelograma, lahko govorimo o redu tega pola v D . Takrat štejemo *red pola* z_0 v D kot $\frac{1}{2} \text{ord}_{z_0}(f)$, če pol ni eno od štirih oglišč, oziroma, v primeru ko je pol z_0 oglišče paralelograma, vzamemo za njegov red vrednost

$$\frac{\ell(\partial\Delta(z_0, r) \cap D)}{2\pi r} \text{ord}_{z_0}(f).$$

Ob tem ℓ opisuje dolžino danega krožnega loka, $r > 0$ pa je dovolj majhen, da je z_0 edino oglišče fundamentalnega paralelograma vsebovano v odprtem disku $\Delta(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$. Z drugimi besedami je ta količina normaliziran notranji kot fundamentalnega paralelograma pri oglišču z_0 pomnožen z $\text{ord}_{z_0}(f)$.

Zgled 3.12.

Posledica 3.13. *Nekonstantna eliptična funkcija ima red vsaj 2.*

Dokaz. Brez škode za splošnost denimo, da je $f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ nekonstantna eliptična funkcija z enim (enostavnim) polom α na fundamentalni domeni D , saj že vemo, da bi bila f konstantna, če bi bila brez polov, po izreku 3.6. Predpostavimo lahko tudi, da pol leži v notranjosti D . Tedaj dobimo z integracijo po robu ∂D neničelni residuum

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} f(z) dz = \text{res}_\alpha(f) \neq 0.$$

To pa je v nasprotju z izrekom 3.9 (i), ki pove, da je ta residuum – kot edini člen v vsoti – enak nič. \square

Posledica 3.14. *Nekonstantna eliptična funkcija $f : \mathbb{C} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ je surjektivna.*

Dokaz. Ker je $f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ nekonstantna, ima po izreku 3.6 pol in lahko zato rečemo, da tam doseže točko ∞ . Naj bo sedaj $w \in \mathbb{C}$ poljubna točka in pokažimo, da obstaja $z \in \mathbb{C}$, da velja $f(z) = w$.

Definirajmo $g(z) := f(z) - w$. Funkcija g je pravtako eliptična in ima pol, saj je takšna f in prištevanje konstante na ti dve lastnosti nima vpliva. Po opombi 3.10 (3) ima g ničlo v \mathbb{C} , kar pokaže zeleno. \square

3.2. Weierstrassova funkcija \wp . Osrednja tema tega poglavja, ki bo povezala eliptične krivulje s kompleksnimi torusi in za katero je bilo potrebno razvijati teorijo v prejšnjem razdelku, bo najprej definicija nato pa pregled lastnosti t. i. *Weierstrassove funkcije \wp* .

Vseskozi naj bo Λ mreža v \mathbb{C} in naj velja oznaka $\Lambda' = \Lambda \setminus \{0\}$.

Definicija 3.15. Za celo število $k > 2$ je *Eisensteinova vrsta reda k* podana kot

$$G_k(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda'} \frac{1}{\omega^k}.$$

Opomba 3.16. Opazimo, da za lihe k velja $G_k(\Lambda) = 0$, saj se člena pri ω in $-\omega \in \Lambda'$ v vsoti odštejeta.

Lema 3.17. Za vsako celo število $k > 2$ je *Eisensteinova vrsta reda k absolutno konvergentna*.

Dokaz. Za vsak $n \in \mathbb{N}$ definirajmo množice

$$C_n = \{k_1\omega_1 + k_2\omega_2 \in \Lambda \mid |k_1| + |k_2| = n\}.$$

Preprosto se je prepričati, da je moč posamezne od teh množic $\#C_n = 4n$. Vsak element $\omega \in C_n$ pa lahko po absolutni vrednosti ocenimo $|\omega| > \rho n$, kjer je $\rho > 0$ razdalija od izhodišča 0, do roba paralelograma z oglišči v točkah $\pm\omega_1, \pm\omega_2$. Tedaj velja ocena

$$\sum_{\omega \in \Lambda'} \frac{1}{|\omega|^k} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\omega \in C_n} \frac{1}{|\omega|^k} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\omega \in C_n} \frac{1}{(\rho n)^k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{\rho^k n^k} = \frac{4}{\rho^k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{k-1}}.$$

Klasičen rezultat iz realne analize pove, da zadnja vrsta konvergira natanko tedaj, ko je $k - 1 > 1$ in tako po primerjalnem kriteriju dobimo absolutno kovergenco Eisensteinove vrste $\sum_{\omega \in \Lambda'} \omega^{-k}$. \square

Lema 3.18. Za vsako celo število $k > 2$, vrsta

$$\sum_{\omega \in \Lambda'} \frac{1}{(z - \omega)^k}$$

konvergira absolutno za poljuben $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda'$ in enakomerno po kompaktih na $\mathbb{C} \setminus \Lambda'$.

Dokaz. Glavna ideja dokaza bo s pomočjo nekaj ocen uporabiti Weierstrassov M-test. Naj bo $K \subseteq \mathbb{C}$ poljuben kompaktni disjunkten z Λ' . Kot tak je omejen, zato je vsebovan v nekem disku $\Delta(0, r)$ z radijem $r > 0$. Razdelimo obravnavo period $\omega \in \Lambda'$ na tiste, ki ležijo v disku $\Delta(0, 2r)$ in na tiste, ki ne.

(i) Zaradi kompaktnosti množice K , za vse $\omega \in \Lambda' \cap \Delta(0, 2r)$ obstaja minimum

$$\min_{z \in K} |z - \omega| =: \epsilon_\omega > 0.$$

Ker pa je takšnih period, za katere je $|\omega| < 2r$, zgolj končno mnogo, denimo $n \in \mathbb{N}$, lahko za ϵ izberemo najmanjšega izmed ϵ_ω in tako velja

$$|z - \omega| \geq \epsilon \quad \text{za vse } z \in K \text{ in vse } 0 < |\omega| < 2r.$$

(ii) Za vse periode $|\omega| \geq 2r$ preko trikotniške neenakosti

$$|\omega| \leq |z - \omega| + |z| \quad \text{za vse } z \in K$$

vidimo, da velja

$$|z - \omega| \geq |\omega| - |z| \geq |\omega| - r \geq |\omega| - \frac{1}{2}|\omega| \geq \frac{1}{2}|\omega| \quad \text{za vse } z \in K.$$

Tako pridemo do ocene

$$\sum_{\omega \in \Lambda'} \frac{1}{|z - \omega|^k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda' \\ |\omega| < 2r}} \frac{1}{|z - \omega|^k} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda' \\ |\omega| \geq 2r}} \frac{1}{|z - \omega|^k} \leq \frac{n}{\epsilon^k} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda' \\ |\omega| \geq 2r}} \frac{2^k}{|\omega|^k},$$

ki velja povsod na K . Ker je zadnja vsota del (po lemi 3.17) absolutno konvergentne Eisensteinove vrste reda k , nam Weierstrassov M-test zagotovi želeni rezultat. \square

Izrek 3.19. Naj bo $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zaporedje holomorfnih funkcij na odprti domeni $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, ki enakomerno po kompaktnih v Ω konvergira k limitni funkciji f . Tedaj je tudi $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ holomorfnna na Ω in zaporedje odvodov $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira enakomerno po kompaktnih k odvodu limitne funkcije f' .

Dokaz. [1, §5, Theorem 1] \square

Oglejmo si sedaj funkcijo $f : \mathbb{C} \setminus \Lambda \rightarrow \mathbb{C}$ podano s predpisom

$$f(z) = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^k}, \quad k > 2.$$

Zaradi absolutne konvergence te vrste po lemi 3.18 lahko predstavimo, da jo seštevamo postopoma po diskah $\Delta(0, n)$ za $n \in \mathbb{N}$ in tako dobimo zaporedje delnih vsot, ki so holomorfne na $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ in konvergirajo k f . Po izreku 3.19 je f holomorfnna na $\mathbb{C} \setminus \Lambda$, v vsakem $\omega_0 \in \Lambda$ pa ima pol reda k in residuuje 0. O tem se prepričamo, saj lahko zapišemo

$$f(z) = \frac{1}{(z - \omega_0)^k} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{\omega_0\}} \frac{1}{(z - \omega)^k}$$

na neki dovolj majhni prebodehi okolici točke ω_0 . Glavnemu delu okrog ω_0 prispeva samo člen $(z - \omega_0)^{-k}$, vrsta, ki ostane, pa je zaradi leme 3.18 po podobnem razmisleku kot zgoraj holomorfnna na tej prebodehi okolici in zato na glavni del nima vpliva. Tako je f meromorfnna funkcija na \mathbb{C} .

Primer 3.20. Zgornje nam omogoča konstruirati prvi netrivialen primer eliptične funkcije, ki bo koristen tudi v nadaljevanju. Prepričajmo se, da je funkcija podana s predpisom

$$f(z) = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3}$$

ne le meromorfnna, ampak res tudi eliptična. Če je $z \in \mathbb{C}$ poljuben in $\omega_0 \in \Lambda$ poljubna perioda, vidimo, da velja

$$f(z + \omega_0) = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z + \omega_0 - \omega)^3} = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - (\omega - \omega_0))^3} = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3} = f(z),$$

kjer smo v predzadnji enakosti upoštevali, da je translacija $\omega \mapsto \omega - \omega_0$ zgolj permutacija mreže Λ , ki samo premeša vrstni red seštevanja v zadnji (absolutno konvergentni) vrsti.

Funkcija iz primera 3.20 ima v vsaki periodi $\omega \in \Lambda$ pol stopnje 3 oziroma na fundamentalnem paralelogramu ima natanko pol stopnje 3, torej bi lahko rekli, da je eliptična funkcija reda 3. Posledica 3.13 nam zagotavlja, da je spodnja meja za red nekonstantne eliptične funkcije enaka 2, zato se je naravno vprašati ali je ta meja kdaj dosežena. Poskusili bi lahko z vrsto $\sum_{\omega \in \Lambda} (z - \omega)^{-2}$, toda ta žal ne konvergira absolutno. Vseeno pa jo lahko nekoliko popravimo, kar nas privede do naslednje definicije.

Definicija 3.21. *Weierstrassova eliptična funkcija \wp glede na mrežo Λ je*

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Trditev 3.22. *Za Weierstrassovo funkcijo \wp glede na mrežo Λ veljajo naslednje točke.*

- (i) *Vrsta, ki predstavlja funkcijo \wp , konvergira absolutno in enakomerno po kompaktnih v $\mathbb{C} \setminus \Lambda'$, zato je \wp holomorfná funkcija na $\mathbb{C} \setminus \Lambda$.*
- (ii) *\wp je soda.*
- (iii) *\wp je Λ -periodična.*
- (iv) *točke iz mreže Λ so natanko poli Weierstrassove funkcije \wp . Vsi so stopnje 2, residuumi v njih pa so vedno enaki 0.*

Dokaz. (i) Podobno kot v dokazu leme 3.18 bomo obravnavo razdelili na periode $\omega \in \Lambda$, ki ležijo znotraj diska $\Delta(0, 2r)$, ki omejuje nek izbrani kompaktni $K \subseteq \mathbb{C} \setminus \Lambda$, in tiste, ki ležijo v njegovem komplementu. Na kompaktnu K že vemo, da lahko omejimo izraz

$$\frac{1}{|z|^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda' \\ |\omega| < 2r}} \left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| < M \quad \text{za vsak } z \in K,$$

kjer je $M \in \mathbb{R}$. Za periode $\omega \in \Lambda, |\omega| \geq 2r$ in $z \in K$, pa najprej ocenimo

$$|z - \omega| \geq |\omega| - |z| \geq \frac{1}{2} |\omega|$$

nato pa še

$$|2\omega - z| \leq |2\omega| - |z| \leq \frac{5}{2} |\omega|.$$

Tako velja

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{\omega^2 - (z - \omega)^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| = \left| \frac{z(2\omega - z)}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{r \cdot \frac{5}{2} |\omega|}{|\omega|^2 (\frac{1}{2} |\omega|)^2} = \frac{10r}{|\omega|^3},$$

kar pomeni, da lahko del vsote, ki teče po $\omega \in \Lambda', |\omega| \geq 2r$, navzgor omejimo s konstanto $10r$ pomnoženim (po lemi 3.17) konvergentnim delom vrste $\sum_{\omega \in \Lambda'} |\omega|^{-3}$.

Zaporedje holomorfnih delnih vsot je tako po Weierstrassovem M-testu absolutno in po kompaktnih enakomerno konvergentno na $\mathbb{C} \setminus \Lambda$. Po izreku 3.19 je limitna

funkcija zaporedja – tj. Weierstrassova funkcija \wp – holomorfná na $\mathbb{C} \setminus \Lambda$, vrsto pa lahko odvajamo členoma, kar pomeni, da je odvod funkcije \wp enak

$$\wp'(z) = \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{-2}{(z - \omega)^3}.$$

(ii) Preprost račun pokaže

$$\begin{aligned} \wp(-z) &= \frac{1}{(-z)^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \left(\frac{1}{(-z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\ &= \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \left(\frac{1}{(z + \omega)^2} - \frac{1}{(-\omega)^2} \right) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) = \wp(z), \end{aligned}$$

kjer smo za predzadnji enáaj upoštevali, da zrcaljenje $\omega \mapsto -\omega$ samo premeša vrstni red seštevanja v absolutno konvergentni vrsti.

(iii) Naj bo $\omega \in \Lambda$ poljuben. Kot smo se prepriáli v primeru 3.20, je \wp' eliptiána funkcija, zato je $\wp'(z + \omega) - \wp'(z) = 0$, kar pomeni, da se funkciji $\wp(z + \omega)$ in $\wp(z)$ razlikujeta zgolj za prišteto konstanto. Če v obe vstavimo $z = -\frac{\omega}{2}$ in upoštevamo sodost funkcije \wp , vidimo, da je ta konstanta enaka 0, kar pokaže zeleno.

(iv) Zaradi Λ -periodiánosti funkcije \wp po toái (iii), je dovolj situacijo obravnavati samo okoli toái 0 $\in \Lambda$. Podobno kot smo sklepali o polih funkcije iz primera 3.20, tudi tukaj vidimo, da na neki prebodehi okolici toái 0 glavnemu delu Laurentove vrste za \wp okoli 0 prispeva samo álen z^{-2} , ki nam da pol reda 2 z ostankom 0, preostanek vrste pa po dokazu toái (i) na tej prebodehi okolici definira holomorfnó funkcijo, ki na glavni del nima vpliva. \square

Náše zanimanje za Weierstrassovo eliptiáno funkcijo se skriva v dejstvu, da ta funkcija zadošá posebni diferencialni enábi oblike $\wp'(z)^2 = f(\wp(z))$, kjer je $f \in \mathbb{C}[x]$ kubiáni polinom, ki je v tesni povezavi z Weierstrassovo enábo eliptiáne krivulje. Da bo ta povezava jasneje razvidna, si poglejmo Laurentov razvoj \wp okoli izhodišá 0.

Lema 3.23. *Naj bo \wp Weierstrassova eliptiána funkcija glede na mrežo Λ . Njen Laurentov razvoj okoli toái 0 je*

$$(3.1) \quad \wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}(\Lambda)z^{2k},$$

kjer $G_{2k}(\Lambda)$ oznaáuje Eisensteinovo vrsto reda $2k$.

Dokaz. Najprej z odvajanjem geometrijske vrste za $(1-x)^{-1}$ pri $|x| < 1$ ugotovimo, da je

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n \quad \text{za } |x| < 1$$

in ta konvergenca je enakomerna in absolutna na kompakth v disku $\Delta(0,1)$. To uporabimo v izrazu

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{\omega^2} \left(\frac{1}{(1-\frac{z}{\omega})^2} - 1 \right) = \frac{1}{\omega^2} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^{n+2}},$$

ki velja za vse $\omega \in \Lambda'$ in $|z| < |\omega|$. Tako imamo

$$\begin{aligned}
\wp(z) &= \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right) \\
&= \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda'} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) \frac{z^n}{\omega^{n+2}} \\
&= \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\omega \in \Lambda'} \frac{1}{\omega^{n+2}} \right) (n+1) z^n \\
&= \frac{1}{z^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) G_{n+2}(\Lambda) z^n \\
&= \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1) G_{2k+2}(\Lambda) z^{2k}
\end{aligned}$$

za vse $|z| < \min_{\omega \in \Lambda'} |\omega|$. V drugem enačaju smo zamenjali vrstni red seštevanja, kar nam omogoča absolutna konvergenca obeh vrst, v zadnjem enačaju pa smo preindeksirali vsoto na sode $n \in \mathbb{N}$, saj so vse Eisensteinove vrste lihega reda enake 0. \square

Izrek 3.24. *Weierstrassova eliptična funkcija \wp glede na mrežo Λ zadošča enačbi*

$$(3.2) \quad \wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2(\Lambda)\wp(z) - g_3(\Lambda),$$

kjer je sta $g_2(\Lambda) = 60G_4(\Lambda)$ in $g_3(\Lambda) = 140G_6(\Lambda)$.

Dokaz. Definirajmo funkcijo $f : \mathbb{C} \setminus \Lambda \rightarrow \mathbb{C}$ s predpisom

$$f(z) = \wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2(\Lambda)\wp(z) + g_3(\Lambda).$$

Kot vsota samih meromorfnih Λ -periodičnih funkcij je f meromorfná Λ -periodičnana funkcija na \mathbb{C} . Zato jo na neki prebodehi okolici $U \subseteq \mathbb{C}$ točke 0 razvijemo v konvergentno Laurentovo vrsto. Najprej izračunajmo prvih nekaj členov Laurentovih vrst naslednjih funkcij.

$$\begin{aligned}
\wp'(z)^2 &= \frac{4}{z^6} - 24G_4(\Lambda)\frac{1}{z^2} - 80G_6(\Lambda) + 36G_4(\Lambda)^2 z^2 + \dots \\
-4\wp(z)^3 &= -\frac{4}{z^6} - 36G_4(\Lambda)\frac{1}{z^2} - 60G_6(\Lambda) - 84G_8(\Lambda)z^2 + \dots \\
60G_4(\Lambda)\wp(z) &= 60G_4(\Lambda)\frac{1}{z^2} + 180G_4(\Lambda)^2 z^2 + \dots
\end{aligned}$$

Vidimo, da vsaka od njih nastopa v definiciji funkcije f , zato bo njen Laurentov razvoj okoli 0 enak

$$(3.3) \quad f(z) = 0 \cdot \frac{1}{z^6} + 0 \cdot \frac{1}{z^2} + 0 + (216G_4(\Lambda)^2 - 84G_8(\Lambda))z^2 + \dots$$

Funkcija f tako nima glavnega dela pri 0 in je zato na okolici U holomorfná. Zaradi Λ -periodičnosti je holomorfná tudi na vsaki okolici poljubne periode $\omega \in \Lambda$ in je tako cela eliptična funkcija, kot takšna pa je po izreku 3.6 konstantna. Preostane le še ugotoviti kateri konstanti je enaka. Iz razvoja 3.3 takoj sledi, da je ta konstanta 0, ko vanjo vstavimo točko 0, to pa tudi zaključí dokaz izreka. \square

Izrek 3.24 nam namiguje, da lahko s poljubno mrežo Λ definiramo eliptično krivuljo

$$(3.4) \quad E_\Lambda : \quad y^2 z = 4x^3 - g_2(\Lambda)xz^2 - g_3(\Lambda)z^3.$$

Če vanjo vstavimo $z = 1$ ter $x = \wp$ in $y = \wp'$, dobimo natanko formulo iz izreka. Preostane se le še prepričati, da ta enačba res podaja eliptično krivuljo – preveriti je treba pogoj o nesingularnosti. V ta namen dokažimo naslednji dve lemi.

Lema 3.25. *Točka $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ je ničla za \wp' natanko tedaj, ko je $2z \in \Lambda$.*

Dokaz. Najprej se lotimo implikacije iz desne na levo.

Ker je \wp soda po 3.22 (ii), vemo, da je njen odvod \wp' liha funkcija. Tako lahko za $2z \in \Lambda$ in upoštevajem Λ -periodičnosti \wp' zapišemo

$$\wp'(z) = \wp'(z - 2z) = \wp'(-z) = -\wp'(z).$$

Od tod sledi, da je $\wp'(z) = 0$.

Obratno, recimo, da sta $\omega_1, \omega_2 \in \Lambda$ osnovni periodi. Tedaj so edine točke v fundamentalnem paralelogramu D_0 , za katere velja $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ in $2z \in \Lambda$, ravno *polperiode*

$$\frac{\omega_1}{2}, \quad \frac{\omega_2}{2}, \quad \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

in vse tri so po zgornjem ničle \wp' . Kot smo se prepričali v primeru 3.20, je \wp' eliptična funkcija reda 3, zato razen treh naštetih polperiod, ki predstavljajo enostavne ničle, po izreku 3.9 (ii) drugih ničel na fundamentalnem paralelogramu ni. \square

Lema 3.26. *Za poljubno mrežo $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ velja $g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2 \neq 0$.*

Dokaz. Najprej se spomnimo, da je diskriminanta kubičnega polinoma $f(x) = 4x^3 - g_2x - g_3$ enaka $16(g_2^3 - 27g_3^2)$ in, da nam ta pove kdaj ima polinom f kakšno večkratno ničlo. Pokazali bomo, da ima za poljubno mrežo Λ polinom $4x^3 - g_2(\Lambda)x - g_3(\Lambda)$ same različne ničle, saj je natanko takrat njegov diskriminanta neničelna.

Naj bosta $\omega_1, \omega_2 \in \Lambda$ osnovni periodi in označimo tri polperiode kot

$$r_1 = \frac{\omega_1}{2}, \quad r_2 = \frac{\omega_2}{2}, \quad r_3 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}.$$

Vse tri so po lemi 3.25 ničle za \wp' . Poleg tega pa so vse tri vrednosti $\wp(r_i)$ za $i \in \{1, 2, 3\}$ ničle polinoma $4x^3 - g_2(\Lambda)x - g_3(\Lambda)$, kar je razvidno takoj, ko v identiteto 3.2 iz izreka 3.24 vstavimo osnovne tri polperiode r_1, r_2, r_3 .

Vemo tudi, da diskriminanto in produkt poljubnih dveh različnih ničel povezuje enakost

$$16(g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2) = 256 \prod_{1 \leq i < j \leq 3} (\wp(r_i) - \wp(r_j))^2,$$

zato bo zadoščalo pokazati, da so vse $\wp(r_i)$ različne.

Naj bo $h_i(z) = \wp(z) - \wp(r_i)$. Funkcija h_i je eliptična funkcija reda 2 s poli v mreži Λ . Očitno je r_i njena ničla, ki pa mora biti reda 2, saj je tudi ničla odvoda $h'_i = \wp'$ po lemi 3.25. To pomeni, da na fundamentalnem paralelogramu drugih ničel nima. Od to sledi, da je $\wp(r_i) \neq \wp(r_j)$ za vsaka $i \neq j$, kar pokaže, da je diskriminanta neničelna oziroma, da je $g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2 \neq 0$. \square

Poljubni mreži $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ lahko torej priredimo eliptično krivuljo E_Λ podano z enačbo 3.4. Tako smo pokazali pomemben del sklepnega izreka te naloge. To razmišljanje bomo nadaljevali v poglavju 5.1, kjer se bomo lotili še obrata – kako iz eliptične krivulje priti do mreže in vse skupaj povzeli v uniformizacijskem izreku 5.5.

4. KOMPLEKSNA STRUKTURA IN HOLOMORFNE PRESLIKAVE

Pri kompleksni analizi smo spoznali načine kako definirati kompleksni logartiem in kompleksni koren dane funkcije, pri tem pa je bilo ključno predpostaviti, da delamo na zvezdastem območju (splošneje *enostavno povezanim*¹), na katerem funkcija nima ničel. Oglejmo si primer kvadratnega korena.

Kvadratni koren kompleksnega števila z vedno obstaja in sta običajno dva (razen, ko je $z = 0$). To sta ravno ničli polinoma $w^2 - z \in \mathbb{C}[w]$, ki se razlikujeta natanko za predznak, in vedno obstajata po osnovnem izreku algebre. Vsakemu $z \in \mathbb{C}$ lahko torej priredimo enega od teh korenov. Vprašanje, ki se porodi pa je: ali lahko to storimo zvezno? Izkaže se, da je lokalno to mogoče, globalno na celotnem \mathbb{C} , pa ni. Če bi namreč potovali vzdolž enotske krožnice v \mathbb{C} bi po končanem obhodu ugotovili, da se vrednost v kateri smo končali od tiste v kateri smo začeli razlikuje natanko za predznak. Maksimalna domena v \mathbb{C} s katero se lahko zadovoljimo z zvezno (holomorfno) definiranim kvadratnim krenom je torej \mathbb{C} brez poltraka skozi izhodišče, kot je na primer $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Popolnoma vzporedno bi lahko za kvadratni koren oklicali tudi za predznak pomnoženo prejšnjo funkcijo in tako dobili dve t. i. *veji* kvadratnega korena, ki sta popolnoma enakovredni in pogosto od nas zahtevata izbiro ene izmed njiju.

En način, kako bi se tej izbiri lahko izgodili, je, da njuni domeni zamenjamo s krivuljo $X = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid w^2 = z\}$, ki je v bistvu unija grafov obeh vej, kvadratni koren pa interpretiramo kot projekcijo iz X na w -os, tj. $(z, w) \mapsto w$. Tako se izognemo tej nekanonični izbiri veje, a smo s tem zašli v nov problem. Izgubili smo poznano predstavo holomorfnih funkcij na tej domeni, ki sedaj ni več neka odprta množica v \mathbb{C} . Na srečo pa imamo še vedno upanje povrniti to informacijo, saj lahko množico X lokalno sploščimo in identificiramo z neko odprto množico v \mathbb{C} . Če znamo takšne lokalne identifikacije najti na celotnem X in to storimo na nek usklajen način, bo nastala struktura dopuščala razviti definicijo, ki opredeljuje holomorfne funkcije na X , in dopuščala adaptirati določene izreke o odprtih domenah v \mathbb{C} na te abstraktne objekte, ki jih imenujemo *Riemannove ploskve*.

Iz tega in podobnih principov se je razvila teorija Riemannovih ploskev. Osnovne ideje in rezultate povezane z njo si bomo s pogledom usmerjenim na eliptične krivulje in toruse ogledali v tem poglavju.

4.1. Definicije in lastnosti.

Definicija 4.1. *Riemannova ploskev* je povezan 2-števen Hausdorffov topološki prostor X , opremljen z družino *lokalnih kart* $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$, ki ji pravimo *kompleksni atlas*, kadar zanj velja

- (i) $(U_i)_{i \in I}$ je odprto pokritje za X .
- (ii) Preslikava $\varphi_i : U_i \rightarrow U'_i \subseteq \mathbb{C}$ je homeomorfizem med okolico $U_i \subseteq X$ in neko odprto podmnožico $U'_i \subseteq \mathbb{C}$. Njenemu inverzu pravimo *lokalna parametrizacija*.
- (iii) Za poljubna $i, j \in I$ je t. i. *prehodna preslikava*

$$\varphi_{ij} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \longrightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$$

¹Enostavno povezana območja v ravnini si predstavljamo kot območja brez lukenj. Kolobar $\{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z| < r_2\}$ in prebodena ravnina $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nista enostavno povezana, enotski disk Δ pa je.

holomorfna na odprti množici $\varphi_j(U_i \cap U_j) \subseteq \mathbb{C}$. Temu pogoju pravimo *kompatibilnostni pogoj*.

Opomba 4.2. Za vsako lokalno karto (U, φ) iz danega kompleksnega atlasa, bo zožitev $\varphi|_V$ na poljubno manjšo odprto podmnožico $V \subseteq U$ še vedno lokalna karta kompatibilna z vsemi drugimi iz danega kompleksnega atlasa. Zato lahko v nadaljevanju po potrebi izbiramo lokalne karte definirane na poljubno majhnih odprtih množicah v X .

Primer 4.3. Kompleksna ravnina \mathbb{C} je Riemannova ploskev podana z eno samo lokalno karto $(\mathbb{C}, \text{id}_{\mathbb{C}})$.

Primer 4.4. Poljubna odprta podmnožica Y Riemannove ploskve X je tudi Riemannova ploskev. Če je $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$ kompleksni atlas za X , potem vzamemo družino $((U_i \cap Y, \varphi_i|_{U_i \cap Y}))_{i \in I}$ za kompleksni atlas $Y \subseteq X$. Res, $(U_i \cap Y)_{i \in I}$ je odprto pokritje za Y , zožitve $\varphi_i|_{U_i \cap Y}$ so še vedno homeomorfizmi, morda nekoliko manjših okolic, vse zožitve prehodnih preslikav pa so tudi same holomorfne, spet morda na kakšnih manjših odprtih okolich.

Primer 4.5. Prvi nekoliko bolj zanimiv primer Riemannove ploskve je Riemannova sfera $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Topološko gledano, je $\widehat{\mathbb{C}}$ kompaktifikacija z eno točko kompleksne ravnine \mathbb{C} , torej homeomorfna sferi S^2 . Bazo odprtih okolic poljubne točke $z \in \mathbb{C} \subseteq \widehat{\mathbb{C}}$ tvorijo odprti diski oblike $\Delta(z, r)$ za $r > 0$, bazo odprtih okolic točke $\infty \in \widehat{\mathbb{C}}$ pa sestavljajo komplementi zaprtih diskov s središčem v izhodišču $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\Delta(0, r)}$. Glede na to topologijo je preslikava

$$\varphi : \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{1}{z}$$

homeomorfizem, kjer ob tem razumemo $\frac{1}{\infty} = 0$. Res, okoli vsake točke iz \mathbb{C}^\times je φ zvezna in ima inverz podan z istim predpisom, ki je tudi zvezen, pri točki ∞ pa φ odprte bazne okolice $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\Delta(0, r)}$ bijektivno slika ravno v odprte diske $\Delta(0, \frac{1}{r})$, torej je pri ∞ zvezna in odprta, kar pomeni, da je homeomorfizem med $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$ in \mathbb{C}^\times .

Za atlas na $\widehat{\mathbb{C}}$ se nam tako ponujata dve karti $(\mathbb{C}, \text{id}_{\mathbb{C}})$ in $(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}, \varphi)$. Množici \mathbb{C} in $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$ tvorita odprto pokritje za $\widehat{\mathbb{C}}$, preslikavi $\text{id}_{\mathbb{C}}$ in φ pa sta homeomorfizma, ki zadoščata kompatibilnostnemu pogoju, saj je na njunem preseku $\mathbb{C} \cap \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\} = \mathbb{C}^\times$ prehodna preslikava $\varphi \circ \text{id}_{\mathbb{C}}^{-1} = \varphi|_{\mathbb{C}^\times} : z \mapsto \frac{1}{z}$ holomorfna. Ta par lokalnih kart tako res tvori kompleksni atlas, kar pokaže, da je $\widehat{\mathbb{C}}$ Riemannova ploskev.

Definicija 4.6. Naj bosta X in Y Riemannovi ploskvi. Pravimo, da je zvezna preslikava $f : X \rightarrow Y$ *holomorfna* ali *analitična*, kadar za vsak $x \in X$ obstaja lokalna karta (U, φ) iz kompleksnega atlasa X , da je $x \in U$, in lokalna karta (V, ψ) iz kompleksnega atlasa Y , da je $f(x) \in V$, ter ob tem velja, da je preslikava

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \rightarrow \psi(V)$$

holomorfna na neki okolici točke $\varphi(x) \in \mathbb{C}$.

Trditev 4.7. V posamezni točki $x \in X$, je definicija 4.6 (oziroma holomorfnost preslikave $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$) neodvisna od izbire lokalnih kart (U, φ) in (V, ψ) .

Dokaz. Naj bosta (U', φ') in (V', ψ') drugi lokalni karti (kompatibilni z (U, φ) in (V, ψ)), da velja $x \in U'$ in $f(x) \in V'$. Tedaj bo na $\varphi'(U \cap U')$, ali po potrebi na

manjši okolici točke $\varphi'(x)$, veljalo

$$\begin{aligned}\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1} &= \psi' \circ (\psi^{-1} \circ \psi) \circ f \circ (\varphi^{-1} \circ \varphi) \circ \varphi'^{-1} \\ &= (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \varphi'^{-1}).\end{aligned}$$

Zaradi kompatibilnostnega pogoja sta $\varphi \circ \varphi'^{-1}$ in $\psi' \circ \psi^{-1}$ biholomorfizma med dvema okolicama točk $\varphi'(x)$ in $\varphi(x)$ ter $\psi(f(x))$ in $\psi'(f(x))$, zato bo $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}$ holomorfna na okolici točke $\varphi'(x)$ natanko tedaj, ko bo $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ holomorfna na neki okolici točke $\varphi(x)$. S tem je neodvisnost dokazana. \square

Zgled 4.8. Oglejmo si, kako lahko meromorfne funkcije na domenah v \mathbb{C} , glede na to definicijo, vidimo kot holomorfne funkcije, ki slikajo v Riemannovo sfero. Naj bo f meromorfna funkcija na domeni $D \subseteq \mathbb{C}$ z diskretno množico polov $S \subseteq D$. Tedaj ima v vsakem polu $a \in S$ funkcija $\frac{1}{f}$ odpravljivo singularnost z limito $\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0$, kar pomeni, da jo lahko v točkah iz S z vrednostjo 0 holomorfno razširimo. Ta opazka bo koristna pri preverjanju holomorfnosti v nadaljevanju.

Formalno imamo trenutno opravka s funkcijo $f : D \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$, radi pa bi jo identificirali s holomorfno funkcijo $D \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$. Edini smiselni način, da sploh zagotovimo zveznost, je izbira funkcije $\bar{f} : D \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$, za katero velja $\bar{f}|_{D \setminus S} = f$ in

$$\bar{f}(a) = \infty \text{ za vse } a \in S.$$

Polejmo si, zakaj bi \bar{f} bila tudi holomorfna. V ta namen si lokalno okoli poljubne točke iz D oglejmo \bar{f} v kartah, ob tem pa ločimo dve možnosti.

- (1) Če je $z \in D \setminus S$, zaradi diskretnosti množice S , obstaja odprta okolica U točke z , ki je diskjunktna z S . Tedaj je funkcija

$$\text{id}_{\mathbb{C}} \circ \bar{f} \circ \text{id}_U^{-1} = f|_U$$

holomorfna na U , med lokalnima kartama (U, id_U) za D ter $(\mathbb{C}, \text{id}_{\mathbb{C}})$ za $\widehat{\mathbb{C}}$.

- (2) Če je $z \in S$, pa zaradi diskretnosti množice ničel holomorfne funkcije f obstaja odprta okolica U točke z , ki je z množico ničel funkcije f disjunktna. Tedaj je funkcija

$$\varphi \circ \bar{f} \circ \text{id}_U^{-1} = \frac{1}{f|_U}$$

holomorfna po začetni opazki, saj se $\frac{1}{f}$ holomorfno razširi z vrednostjo 0 v polu $z \in S$. Tukaj smo uporabili lokalni karti (U, id_U) za D in $(\widehat{\mathbb{C}} \setminus \{0\}, \varphi)$ za $\widehat{\mathbb{C}}$.

Zelo pomembna trditev, ki razčisti vprašanje o holomorfnosti inverza holomorfne bijekcije je naslednja.

Trditev 4.9. *Naj bosta X in Y Riemannovi ploskvi in naj bo $f : X \rightarrow Y$ holomorfna bijekcija med njima. Tedaj je tudi preslikava $f^{-1} : Y \rightarrow X$ holomorfna.*

Opomba 4.10. Takšni holomorfni preslikavi $f : X \rightarrow Y$, katere inverz je pravtako holomorfen, pravimo *biholomorfizem* in tedaj imamo Riemannovi ploskvi X in Y za *biholomorfni* oziroma *izomorfni* v smislu Riemannovih ploskev, kar označujemo z

$$X \cong Y.$$

Dokaz. Vzemimo iz kompleksnih atlasov za X oziroma Y lokalni karti (U, φ) oziroma (V, ψ) . Ker je f bijekcija, velja $f(U \cap f^{-1}(V)) = f(U) \cap V$ in preslikava

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \rightarrow \psi(f(U) \cap V)$$

je holomorfná bijekcija med dvema odprtima množicama v \mathbb{C} . Sedaj želimo pokazati, da je njen inverz $\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}$ holomorfen na $\psi(f(U) \cap V) \subseteq \mathbb{C}$.

Naj bo $z_0 \in \varphi(U \cap f^{-1}(V))$ poljubna. Tedaj je $(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})'(z_0) \neq 0$. V nasprotnem primeru bi sicer lahko na neki dovolj majhni okolici $W \subseteq \varphi(U \cap f^{-1}(V))$ točke z_0 zapisali

$$\psi(f(\varphi^{-1}(z))) - \psi(f(\varphi^{-1}(z_0))) = (z - z_0)^m g(z),$$

kjer je $m \geq 2$ in $g \in \mathcal{O}(W)$ brez ničle na W , kar bi bilo v nasprotju z injektivnostjo $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$. Tako dobimo po izreku o inverzni funkciji [3, Izrek 67] holomorfen inverz definiran na okolici točke $\psi(f(\varphi(z_0))) \in \psi(f(U) \cap V)$, katerega predpis se bo zaradi enoličnosti inverzov ujemal z $\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}$ na ustrezni domeni. Tako storimo za vsak $z_0 \in \varphi(U \cap f^{-1}(V))$, kar nam zagotovi holomorfnost preslikave $\varphi \circ f^{-1} \circ \psi^{-1}$ na celotnem $\psi(f(U) \cap V)$.

S tem smo pokazali holomorfnost preslikave f^{-1} v vseh lokalnih kartah Riemannovih ploskev X in Y , kar zagotovi biholomorfnost preslikave f in zaključimo dokaz. \square

Izrek 4.11 (Izrek o implicitni preslikavi). *Naj bo $\Omega \subseteq \mathbb{C}^2$ odprto območje in naj bo $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} : (z, w) \mapsto f(z, w)$ funkcija, ki je holomorfná v obeh spremenljivkah posebej. Denimo, da je $(\alpha, \beta) \in \Omega$ ničla za f in da velja $f_w(\alpha, \beta) \neq 0$, kjer f_w označuje kompleksni odvod po drugi spremenljivki. Tedaj obstajata dovolj majhni okolici $U \subseteq \mathbb{C}$ točke α in $V \subseteq \mathbb{C}$ okolica točke β ter enolično določena holomorfná preslikava $\phi : U \rightarrow V$, ki izpolnjuje pogoj: Za vse pare $(z, w) \in U \times V$ je $f(z, w) = 0$ natanko tedaj, ko je $w = \phi(z)$.*

Komentar. To je dobro poznani izrek o implicitni preslikavi, ki smo ga že srečali. Z drugimi besedami pravi, da lahko množico ničel gladke funkcije f lokalno predstavimo kot graf neke gladke funkcije ϕ nad eno izmed spremenljivk. Za nas pa bo pomembno, da ta funkcija ϕ ni le gladka, ampak tudi holomorfná, če je le f holomorfná.

Dokaz. Dokaz gladke verzije izreka bralec najde v [3, Izrek 14], preostane nam le še obravnavá holomorfnosti implicitne funkcije ϕ .

Na zvezo $f(z, \phi(z)) = 0$, ki velja povsod na $z \in U \subseteq \mathbb{C}$ delujemo s Cauchy-Riemannovim operatorjem $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ in tako dobimo

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} (f(z, \phi(z))) = \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}} = f_{\bar{z}}(z, \phi(z)) + f_w(z, \phi(z)) \frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}}(z) = 0.$$

Ker je f holomorfná v prvi spremenljivki je $f_{\bar{z}}(z, \phi(z)) = 0$ za vse $z \in U$, po drugi strani pa zaradi zveznosti odvoda f_w in $f_w(\alpha, \beta) \neq 0$ velja $f_w(z, \phi(z)) \neq 0$ na celotnem U , ki ga po potrebi lahko tudi zmanjšamo. Od tod sledi

$$\frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}} = 0 \quad \text{povsod na } U,$$

kar je – pod predpostavko gladkosti funkcije ϕ , ki drži – ekvivalentno holomorfnosti funkcije ϕ na U . \square

4.2. Kompleksna struktura na eliptični krivulji. V tem razdelku si bomo ogledali kako eliptični krivulji priredimo kompleksno strukturo, da ta postane kompaktna Riemannova ploskev. Ta postopek lahko z isto idejo še malce posplošimo in tako pokažemo kako prirediti kompleksno strukturo poljubni nesingularni projektivni algebrski krivulji. Začeli bomo z afino različico krivulje v \mathbb{C}^2 , na njej definirali kompleksen atlas, nato pa ga prenesli in nekoliko dopolnili do kompleksnega atlasa projektivnega zaprtja krivulje.

1. DEL. Naj bo afina različica eliptične krivulje podana z enačbo

$$E : y^2 = 4x^3 - ax - b, \quad a^3 - 27b^2 \neq 0$$

in označimo z $f(x, y) = y^2 - 4x^3 + ax + b$ njen minimalni polinom. Opazovana krivulja $E = V(f) \subseteq \mathbb{C}^2$ je torej množica ničel polinoma f . Zaradi pogoja $a^3 - 27b^2 \neq 0$, je E nesingularna, kar pomeni, da je v vsaki točki krivulje E vsaj eden od parcialnih odvodov polinoma f neničeln.

Osredotočimo se sedaj na eno točko $(\alpha, \beta) \in E$ in brez škode za splošnost predpostavimo, da je $f_y(\alpha, \beta) \neq 0$. Polinom f je seveda holomorfná funkcija v obeh svojih spremenljivkah, zato nam izrek o implicitni funkciji 4.11 zagotavlja obstoj holomorfne preslikave

$$\phi : W \rightarrow W'$$

kjer je $W \subseteq \mathbb{C}$ okolica α , $W' \subseteq \mathbb{C}$ okolica β in za vsak $z \in W$ velja $f(z, \phi(z)) = 0$. Še pomembneje pa nam implicitna funkcija ϕ omogoča definirati lokalno parametrizacijo krivulje E

$$W \rightarrow E, \quad z \mapsto (z, \phi(z)).$$

Ta je med drugim homeomorfizem na svojo sliko $U := (W \times \phi(W)) \cap E$, ki je zaradi holomorfnosti ϕ odprta v E . Preslikava ϕ je holomorfná in nekonstantna in je kot taka odprta preslikava, zato je škatlasta okolica $W \times \phi(W)$ odprta v \mathbb{C}^2 in nazadnje $U \subseteq E$ odprta v E . Inverz te lokalne parametrizacije je projekcija $\text{pr}_1 : U \subseteq E \rightarrow W$, ki jo bomo odslej označevali s φ in bo skupaj z okolico U nosila vlogo ene lokalne karte.

Komentar. Zelo podobno bi storili v primeru, ko je $f_x(\alpha, \beta) \neq 0$. Tedaj bi lokalna parametrizacija bila oblike $z \mapsto (\phi(z), z)$, okolica U pa bi bila graf holomorfne funkcije ϕ nad spremenljivko y namesto x . Tako bi za predpis homeomorfizma φ uporabili projekcijo pr_2 namesto pr_1 . Opomnimo še, da v to situacijo pridemo v natanko treh točkah $(e_1, 0)$, $(e_2, 0)$ in $(e_3, 0)$, kjer so e_1 , e_2 in e_3 tri različne ničle polinoma $4x^3 - ax - b$, z neničelno diskriminanto.

Vsak tak par (U, φ) bomo sprejeli kot lokalno karto. Sedaj pa se bomo prepričali, da družina \mathcal{E} vseh takšnih parov tvori kompleksen atlas za E . Za lažje nadaljevanje to družino indeksirajmo z neko² množico I in tako lahko zapišemo $\mathcal{E} = ((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$. Opazimo, da $(U_i)_{i \in I}$ tvori odprto pokritje za E , saj njihova unija vsebuje vse točke iz E , preslikave φ_i pa so homeomorfizmi. Preostane preveriti še kompatibilnostni pogoj – da so vse prehodne preslikave

$$\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$$

²Indeksna množica I zares ni pomembna, lahko pa si predstavljamo, da jo sestavljajo točke E , saj smo navsezadnje do vsakega od parov (U, φ) prišli ravno z izbiro neke točke iz E .

holomorfne. Vzemimo poljubni dve karti (U_i, φ_i) in (U_j, φ_j) , označimo s $\phi_i : W_i \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfno funkcijo katere graf nad eno izmed spremenljivk je okolica U_i . Analogno definiramo tudi $\phi_j : W_j \rightarrow \mathbb{C}$ ob tem pa ločimo dva primera.

- (1) Okolici U_i, U_j sta grafa funkcij nad istima spremenljivkama. Obravnavajmo samo primer, ko je ta spremenljivka x , drugi gre povsem analogno. Tedaj izračunamo

$$(\varphi_i \circ \varphi_j^{-1})(z) = \text{pr}_1(z, \phi_j(z)) = z \quad \text{za vse } z \in \varphi_j(U_i \cap U_j),$$

kar pomeni, da je prehodna preslikava $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} = \text{id}_{\varphi_j(U_i \cap U_j)}$ enaka identiteti na množici $\varphi_j(U_i \cap U_j)$, ki je očitno holomorfna.

- (2) Okolici U_i, U_j nista grafa funkcij nad istima spremenljivkama in recimo, da je U_i graf funkcije ϕ_i nad spremenljivko x , množica U_j pa naj bo graf funkcije ϕ_j nad spremenljivko y . Tedaj izračunamo

$$(\varphi_i \circ \varphi_j^{-1})(z) = \text{pr}_1(\phi_j(z), z) = \phi_j(z) \quad \text{za vse } z \in \varphi_j(U_i \cap U_j).$$

Funkcija ϕ_j je holomorfna na kvečjemu večji množici $W_j \supseteq \varphi_j(U_i \cap U_j)$, zato je prehodna preslikava $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}$ holomorfna na celotnem $\varphi_j(U_i \cap U_j)$. Do povsem enakega zaključka pridemo, če je U_i graf funkcije nad spremenljivko y , U_j pa nad spremenljivko x .

Tako vidimo, da je družina lokalnih kart $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$ res kompleksni atlas za E .

2. DEL. *Projektivno zaprtje* afine verzije eliptične krivulje E je projektivna krivulja $\bar{E} \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ podana s homogenizacijo enačbe za E

$$\bar{E} : y^2 z = 4x^3 - axz^2 - bz^3$$

oziroma s homogenim polinomom $f^*(x, y, z) = y^2 z - 4x^3 + axz^2 + bz^3$, ki je homogenizacija polinoma f . S pomočjo kompleksnega atlasa za E bomo sedaj konstruirali atlas za \bar{E} .

Komentar. Ta del bo zahteval znanje iz uvoda v geometrijsko topologijo o kvocienčnih topoloških prostorih, zato se bomo za podrobnosti sklicali na [5, poglavje 3.2.]. Bralec ga lahko po potrebi tudi preskoči, saj ga obravnavamo zgolj za kompletnost celotne izpeljave.

Naj bo

$$\iota : \mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{C}^3 \setminus \{0\} \quad (x, y) \mapsto (x, y, 1)$$

vložitev, $q : \mathbb{C}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ pa kvocienčna projekcija iz opombe 2.9, kjer smo projektivne prostore opremili s topologijo. Najprej opazimo, da se projektivno zaprtje $\bar{E} \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ od afine krivulje E v bistvu razlikuje samo v eni točki. Natančneje vidimo, da je

$$\bar{E} = q(\iota(E)) \cup \{[0 : 1 : 0]\}.$$

Točko $[0 : 1 : 0]$ bomo imenovali *točka v neskončnosti* eliptične krivulje in zanjo bo potrebno posebej definirati lokalno karto. Pred tem pa se posvetimo lokalnim kartam za *afini del krivulje* $q(\iota(E)) = \{[x : y : 1] \in \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \mid y^2 = 4x^3 - ax - b\}$.

Označimo $V_i = q(\iota(U_i))$. Kot prej naj bo $W_i \subseteq \mathbb{C}$ slika homeomorfizma φ_i . Pomožno preslikavo $\varphi'_i : \iota(U_i) \rightarrow W_i$ definiramo s predpisom

$$\varphi'_i(x, y, z) = \varphi_i(x, y)$$

in tako bo $\varphi'_i \circ \iota = \varphi_i$.

Preslikava $\pi : \iota(U_i) \rightarrow V_i \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ je injekcija, saj se nobeni dve različni točki iz $\iota(U_i)$ ne razlikujeta za skalarni večkratnik iz \mathbb{C}^\times in zaradi tega tvori samo trivialne identifikacije. Kot homeomorfizem je tudi φ'_i injekcija, kar pomeni, da imata ti dve preslikavi enaka vlakna – same enoelementne množice. Od tod sklepamo, da je inducirana preslikava $\bar{\varphi}_i$ dobro definirana zvezna injekcija. Iz surjektivnosti φ'_i sledi surjektivnost $\bar{\varphi}_i$, ker pa je φ'_i homeomorfizem (torej v posebnem kvocientana presliava), je inducirana preslikava $\bar{\varphi}_i : V_i \rightarrow W_i$ homeomorfizem, kot ponazarja komutativen diagram. Ta premislek utemeljuje [5, Posledica 3.23].

$$(4.1) \quad \begin{array}{ccc} \iota(U_i) & \xrightarrow{\varphi'_i} & W_i \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\varphi}_i & \\ V_i & & \end{array}$$

Iz komutativnega diagrama lahko inverz inducirane homeomorfizma izrazimo kot $\bar{\varphi}_i^{-1} = \pi \circ \varphi'^{-1}_i$. To pa nam omogoči prepričati se o kompatibilnosti lokalnih kart $(V_i, \bar{\varphi}_i)$. Za poljubna $i, j \in I$ velja

$$\bar{\varphi}_i \circ \bar{\varphi}_j^{-1} = \bar{\varphi}_i \circ \pi \circ \varphi'^{-1}_j = \varphi'_i \circ \varphi'^{-1}_j = \varphi'_i \circ \iota \circ \varphi_j^{-1} = \varphi_i \circ \varphi_j^{-1},$$

kar nas pripelje do prehodne preslikave med lokalnima kartama afine krivulje E , za katero smo se že v prvem delu prepričali, da je holomorfná. Kompatibilnostni pogoj torej velja tudi za karti $(V_i, \bar{\varphi}_i)$, $(V_j, \bar{\varphi}_j)$.

Skupek vseh na ta način konstruiranih parov $(V_i, \bar{\varphi}_i)$ bo prispeval kompleksnemu atlasu za \bar{E} , za celoto pa nam manjka že prej omenjena lokalna karta okrog točke v neskončnosti $[0 : 1 : 0]$. Poglejmo si polinom $F(x, 1, z) = z - 4x^3 + axz^2 + bz^3$ okrog točke $(x, z) = (0, 0)$. Njegov odvod po z

$$F_z(x, 1, z) = 1 + ax^2 + 3bz^2$$

je v omenjeni točki različen od nič, kar pomeni, da po izreku o implicitni funkciji obstajata okolici $W_\infty, W' \subseteq \mathbb{C}$ točke 0 in holomorfná funkcija $\phi_\infty : W_\infty \rightarrow W'$, da je $F(x, 1, \phi_\infty(x)) = 0$ za vse $x \in W_\infty$. Opomnimo še, da iz $\phi_\infty(x) = 0$ sledi $x = 0$, saj je to edina rešitev enačbe $F(x, 1, 0) = -4x^3 = 0$. Označimo $U_\infty = \{(x, 1, \phi_\infty(x)) \in \mathbb{C}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \mid x \in W_\infty\}$. Tedaj je pomožna preslikava

$$\varphi'_\infty : U_\infty \rightarrow W_\infty \quad (x, y, z) \mapsto x$$

homeomorfizem, ki ima inverz podan s predpisom $x \mapsto (x, 1, \phi_\infty(x))$. Označimo $V_\infty = \pi(U_\infty) \subseteq \bar{E} \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Sedaj se pod istimi pogoji kot zgoraj inducira homeomorfizem $\bar{\varphi}_\infty : V_\infty \rightarrow W_\infty$, da komutira diagram.

$$(4.2) \quad \begin{array}{ccc} U_\infty & \xrightarrow{\varphi'_\infty} & W_\infty \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{\varphi}_\infty & \\ V_\infty & & \end{array}$$

Preverimo, da je lokalna karta $(V_\infty, \bar{\varphi}_\infty)$ kompatibilna z ostalimi lokalnimi kartami, torej, da sta

$$\begin{aligned} \bar{\varphi}_i \circ \bar{\varphi}_\infty^{-1} &: \bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i) \rightarrow \bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i) \\ \bar{\varphi}_\infty \circ \bar{\varphi}_i^{-1} &: \bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i) \rightarrow \bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i) \end{aligned}$$

holomorfni za poljuben $i \in I$. Najprej še dodatno predpostavimo, da je $U_i \subseteq E \subseteq \mathbb{C}^2$ graf holomorfne funkcije nad spremenljivko x . Obravnava primera, ko je okolica U_i graf holomorfne funkcije nad spremenljivko y , bo podobna in bo sledila za tem.

Za holomorfnost omenjenih prehodnih preslikav potrebujemo razumeti njuni domeni oz. še prej množico $V_\infty \cap V_i$. Zanimajo nas samo tisti $i \in I$, za katere je $V_\infty \cap V_i$ neprazna, zato bomo brez škode za splošnost to privzeli, saj so v nasprotnem primeru kompatibilnostni pogoji že na prazno izpolnjeni.

Po eni strani, množica $V_\infty \cap V_i$ vsebuje vse točke oblike $[z : 1 : \phi_\infty(z)]$, za nek $z \in W_\infty$, po drugi strani pa ima ta točka zaradi vsebovanosti v V_i tudi obliko $[w : \phi_i(w) : 1]$ za nek $w \in W_i$. Ena projektivno točko smo tako zapisali s pomočjo dveh različnih predstavnikov, ki se razlikujeta za multiplikativno konstanto iz \mathbb{C}^\times . Tako iz primerjave tretjih komponent (do multiplikativne konstante iz \mathbb{C}^\times natančno) ugotovimo, da je $\phi_\infty(z) \neq 0$ in je tako posredno tudi $z \neq 0$. S primerjavo drugih komponent vidimo, da mora veljati $\phi_i(w) \neq 0$, primerjava prvih komponent pa iz pogoja $z \neq 0$ zagotovi še $w \neq 0$. Ker lahko homogene koordinate s temi neničelnimi vrednostmi delimo, je od tod je razvidno $[z : 1 : \phi_\infty(z)] = \left[\frac{z}{\phi_\infty(z)} : \frac{1}{\phi_\infty(z)} : 1 \right]$ ter $[w : \phi_i(w) : 1] = \left[\frac{w}{\phi_i(w)} : 1 : \frac{1}{\phi_i(w)} \right]$.

Če je $z \in \bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i)$ poljuben, potem izračunamo

$$\bar{\varphi}_i(\bar{\varphi}_\infty^{-1}(z)) = \bar{\varphi}_i([z : 1 : \phi_\infty(z)]) = \bar{\varphi}_i\left(\left[\frac{z}{\phi_\infty(z)} : \frac{1}{\phi_\infty(z)} : 1\right]\right) = \frac{z}{\phi_i(z)}.$$

Za $w \in \bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i)$ pa imamo

$$\bar{\varphi}_\infty(\bar{\varphi}_i^{-1}(w)) = \bar{\varphi}_\infty([w : \phi_i(w) : 1]) = \bar{\varphi}_\infty\left(\left[\frac{w}{\phi_i(w)} : 1 : \frac{1}{\phi_i(w)}\right]\right) = \frac{w}{\phi_i(w)}.$$

V obeh primerih sta prehodni preslikavi holomorfni na $\bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i)$ oz. $\bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i)$.

Obravajmo še primer, ko je $U_i \subseteq E$ graf holomorfne funkcije ϕ_i nad spremenljivko y . Tedaj (neprazna) množica $V_\infty \cap V_i$ vsebuje točke oblike $[z : 1 : \phi_\infty(z)] = [\phi_i(w) : w : 1]$ za neka $z \in W_\infty$ in $w \in W_i$. Podobno kot prej lahko sklepamo, da je $\phi_\infty(z) \neq 0$, od tod dobimo $z \neq 0$. Iz primerjave prve komponente lahko vidimo $\phi_i(w) \neq 0$ in iz primerjave druge komponente dobimo $w \neq 0$. Tako za poljuben $z \in \bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i)$ dobimo

$$\bar{\varphi}_i(\bar{\varphi}_\infty^{-1}(z)) = \bar{\varphi}_i([z : 1 : \phi_\infty(z)]) = \bar{\varphi}_i\left(\left[\frac{z}{\phi_\infty(z)} : \frac{1}{\phi_\infty(z)} : 1\right]\right) = \frac{1}{\phi_\infty(z)},$$

za poljuben $w \in \bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i)$ pa vidimo

$$\bar{\varphi}_\infty(\bar{\varphi}_i^{-1}(w)) = \bar{\varphi}_\infty([\phi_i(w) : w : 1]) = \bar{\varphi}_\infty\left(\left[\frac{\phi_i(w)}{w} : 1 : \frac{1}{w}\right]\right) = \frac{\phi_i(w)}{w}.$$

Tudi ti dve preslikavi sta torej holomorfni kjer sta definirani, tj. na $\bar{\varphi}_\infty(V_\infty \cap V_i)$ oz. $\bar{\varphi}_i(V_\infty \cap V_i)$, kar nazadnje pomeni, da lokana karta $(V_\infty, \bar{\varphi}_\infty)$ izpolnjuje kompatibilnostni pogoj s poljubno lokalno karto iz družine \mathcal{E} .

Če družini $((V_i, \bar{\varphi}_i))_{i \in I}$ dodamo še karto $(V_\infty, \bar{\varphi}_\infty)$ pri točki $[0 : 1 : 0]$, bo tako celotna družina $((V_i, \bar{\varphi}_i))_{i \in I \cup \{\infty\}}$ tvorila kompleksen atlas za \bar{E} . Res, družina $(V_i)_{i \in I \cup \{\infty\}}$ tvori odprto pokritje za \bar{E} , vse preslikave $\bar{\varphi}_i$ so homeomorfizmi in vse lokalne karte so med sabo kompatibilne.

Opomba 4.12. Na začetku razdelka 4.2 smo omenili, da je eliptična krivulja kompaktna. To bomo sicer videli preko biholomorfizma (ki je v posebnem tudi homeomorfizem) s kompleksnim torusom, lahko pa to pokažemo tudi na sledeč način.

Če $F \in \mathbb{C}[x, y, z]$ označuje minimalni polinom krivulje E , je množica $\{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \setminus \{0\} \mid F(x, y, z) = 0\}$ zaprta v $\mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$, njen presek s kompleksno enotsko sfero $S(\mathbb{C}^3)$ pa je kompakten. Slika tega preseka s kvocientno projekcijo $S(\mathbb{C}^3) \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, je ravno $E \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, kot zvezna slika kompakta pa je tudi sama kompaktna, torej je E kompaktna.

Tukaj lahko vlogo eliptične krivulje $E \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ prevzame tudi poljubna projektivna algebraična krivulja in enak premislek nam pokaže, da je tudi ta kompaktna podmnožica v $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$.

S tem je zaključena konstrukcija kompleksnega atlasa na eliptični krivulji. Za konec tega razdelka si pogledjmo še uporabo kompleksne strukture na primeru holomorfnih funkcij med eliptičnima krivuljama.

4.2.1. Holomorfna funkcija med eliptičnima krivuljama. V 2. poglavju smo definirali pojem projektivne transformacije in nato v lemi 2.23 opazili, da imajo vse projektivnosti med projektivno ekvivalentnima eliptičnima krivuljama točno določeno obliko. V tem zgledu bomo pokazali, da je vsaka takšna projektivnost tudi holomorfna preslikava.

Trditev 4.13. *Naj bosta $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ projektivno ekvivalentni eliptični krivulji podani z enačbama*

$$E_1 : y^2z = 4x^3 - a_1xz^2 - b_1z^3 \quad \text{in} \quad E_2 : y^2z = 4x^3 - a_2xz^2 - b_2z^3$$

in naj bo $u \in \mathbb{C}^\times$ tak, da je

$$g : E_1 \rightarrow E_2, \quad [x : y : z] \mapsto [u^2x : u^3y : z]$$

projektivna ekvivalenca med njima. Tedaj je g holomorfna preslikava.

Dokaz. Po definiciji preverimo holomorfnost preslikave. Okoli poljubne točke $p \in E_1$ ter njene slike $g(p) \in E_2$ bomo poiskali par kart φ in ψ iz atlasov za E_1 in E_2 in se prepričali o holomorfnosti preslikave $\psi \circ g \circ \varphi^{-1}$.

Označimo

$$f_i(x, y) = y^2 - 4x^3 + a_ix + b_i$$

za $i \in \{1, 2\}$ in z f_i^* homogenizacijo f_i glede na spremenljivko z , kar je ravno minimalni polinom krivulje E_i . Ker sta E_i eliptični, sta po definiciji nesingularni in imata neničelni diskriminanti, kar pomeni, da ima kubični polinom $4x^3 - a_1x - b_1$ tri različne (kompleksne) ničle e_1, e_2, e_3 . Projektivnost g poveže, koeficiente a_i, b_i , in sicer po 2.6 velja $a_2 = u^4a_1, b_2 = u^6b_1$, torej so u^2e_1, u^2e_2, u^2e_3 tri različne ničle polinoma $4x^3 - a_2x - b_2$. To vidimo tudi direktno z uporabo projektivnosti g , ki je bijektivna in slika $[e_i : 0 : 1] \mapsto [u^2e_i : 0 : 1]$. Hkrati pa so točke oblike $(e_i, 0)$ oz. $(u^2e_i, 0)$ edine v katerih je $\frac{\partial f_1}{\partial y} = 0$ oz. $\frac{\partial f_2}{\partial y} = 0$ in, ki rešijo enačbo $f_1 = 0$ oz. $f_2 = 0$. Na afinem delu krivulje bo tako, razen v teh treh točkah, množno uporabiti lokalne karte, ki izhajajo iz dejstva, da je krivuljo mogoče predstaviti kot graf holomorfne nad spremenljivko x .

Ločimo nekaj možnosti glede na izbrano točko $p \in E_1$.

- (i) $p = [e_i : 0 : 1]$: Tedaj vidimo, da je $g(p) = [u^2e_i : 0 : 1]$, torej izberimo lokalni karti φ okrog $p \in E_1$ in ψ okrog $g(p) \in E_2$, ki sta na dovolj majhnih okolicalah p oziroma $g(p)$ podani s predpisoma

$$\varphi([x : y : 1]) = y \quad \text{in} \quad \psi([x : y : 1]) = y$$

njuna inverza pa kot

$$\varphi^{-1}(w) = [\phi_1(w) : w : 1] \quad \text{in} \quad \psi^{-1}(w) = [\phi_2(w) : w : 1].$$

Ob tem sta ϕ_1, ϕ_2 holomorfni funkciji, ki v konstrukciji kompleksnega atlasa izhajata iz primera, ko lahko afina dela krivulj E_1 in E_2 okoli p oziroma $g(p)$ izrazimo kot grafa funkcij ϕ_1 in ϕ_2 nad spremenljivko y . Tedaj izračunamo

$$\psi(g(\varphi^{-1}(w))) = \psi(g([\phi_1(w) : w : 1])) = \psi([u^2\phi_1(w) : u^3w : 1]) = u^3w,$$

ki je jasno holomorfna na dovolj majhni odprti okolici točke $\varphi(p)$.

- (ii) $p = [0 : 1 : 0]$: Tudi za točko v neskončnosti imamo na obeh krivuljah lokalni karti φ okrog p in ψ okrog $g(p) = [0 : 1 : 0]$ podani s predpisoma

$$\varphi([x : 1 : z]) = x \quad \text{in} \quad \psi([x : 1 : z]) = x,$$

njuna inverza pa z

$$\varphi^{-1}(w) = [\phi_1(w) : 1 : w] \quad \text{in} \quad \psi^{-1}(w) = [\phi_2(w) : 1 : w],$$

za ustrezni holomorfni funkciji ϕ_1 in ϕ_2 na dovolj majhnih odprtih okolih $\varphi(p)$ oziroma $\psi(g(p))$. Tedaj na tej majhni okolici $\varphi(p)$ velja

$$\begin{aligned} \psi(g(\varphi^{-1}(w))) &= \psi(g([\phi_1(w) : 1 : w])) \\ &= \psi([u^2\phi_1(w) : u^3 : w]) = \psi\left(\left[\frac{\phi_1(w)}{u} : 1 : \frac{w}{u^3}\right]\right) = \frac{\phi_1(w)}{u}. \end{aligned}$$

Slednji račun pokaže, da je $\psi \circ g \circ \varphi^{-1}$ na tej odprti okolici holomorfna.

- (iii) Nazadnje naj bo točka $p \in E_1$ poljubna, ki ni iz zgornjih dveh primerov. Tedaj imamo okoli p in $g(p)$ lokani karti φ in ψ , s predpisoma

$$\varphi([x : y : 1]) = x \quad \text{in} \quad \psi([x : y : 1]) = x.$$

Njuna inverza imata predpisa

$$\varphi^{-1}(w) = [w : \phi_1(w) : 1] \quad \text{in} \quad \psi^{-1}(w) = [w : \phi_2(w) : 1],$$

kjer sta ϕ_1 in ϕ_2 ustrezni holomorfni funkciji, katerih graf je lokalno afnini del krivulj E_1 oz. E_2 okoli točk p oz. $g(p)$. Tedaj izračunamo

$$\psi(g(\varphi^{-1}(w))) = \psi(g([w : \phi_1(w) : 1])) = \psi([u^2w : u^3\phi_1(w) : 1]) = u^2w,$$

kar je jasno predpis holomorfne funkcije na odprti okolici točke $\varphi(p)$. □

Poleg tega opazimo, da smo hkrati z istim premislekom pokazali tudi holomorfnost inverza dane projektivnosti, saj njen predpis po menjavi u v $1/u$ še vedno ohranja obliko. Od tod sledi, da sta projektivno ekvivalentni eliptični krivulji tudi izomorfni kot Riemannovi ploskvi. Z drugimi besedami to pomeni, da smo algebrائي izomorfizem (projektivnost med krivuljama) prevedli v analitičnega – biholomorfizem Riemannovih ploskev.

Neformalno opomnimo še, da je vsaka holomorfna funkcija $f : E_1 \rightarrow E_2$, v nekem smislu tudi “algebrائي” – njen prepis je podan s koordinatnimi funkcijami, ki so racionalne funkcije v spremenljivkah x, y, z . Glavni razlog za tem se skriva v trditvi, da lahko vsako eliptično funkcijo glede na neko mrežo Λ zapišemo kot neko racionalno funkcijo v spremenljivkah \wp in \wp' . Z drugimi besedami to pomeni, da je polje eliptičnih funkcij izomorfno razširitvi \mathbb{C} z \wp in \wp' , torej $\mathbb{C}(\wp, \wp')$. Ta izrek najdemo v [4, 1, §2, Izrek 4], bistvene ideje za tem fenomenom pa so opisane v [8, §2 in §3].

4.3. Kompleksna struktura na torusu. Cilj tega razdelka bo najprej razumeti topologijo kvocienta \mathbb{C}/Λ , nato pa ga opremiti še s kompleksnim atlasom, da bomo lahko govorili o holomorfnih preslikavah med njim in eliptično krivuljo.

Naj bo $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ kvocientna projekcija iz začetka poglavja 3 o eliptičnih funkcijah. Zaenkrat jo razumemo samo kot preslikavo množic, ki poljubni točki $z \in \mathbb{C}$ priredi njen ekvivalenčni razred $z + \Lambda$ vseh točk, ki se od z razlikujejo za prišteto periodo iz Λ . Spomnimo se, da lahko tedaj \mathbb{C}/Λ opremimo s kvocientno topologijo, tako da za odprte množice vzamemo natanko tiste $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$, za katere je $\pi^{-1}(U)$ odprta v \mathbb{C} in na ta način projekcija $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ postane zvezna preslikava. Poleg tega je π tudi odprta, kar je v splošnem res za vse kvocientne projekcije v prostor orbit delovanja neke topološke grupe [5, Trditev...], prepričamo pa se lahko tudi z direktnim računom. Za poljubno odprto množico $U \subseteq \mathbb{C}$ je slika $\pi(U)$ odprta, saj je njeno *nasičenje*

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = U + \Lambda = \bigcup_{\omega \in \Lambda} (U + \omega)$$

unija translatov odprte množice U oblike $U + \omega = \{z + \omega \mid z \in U\}$, ti pa so vsi odprti.

Definicija topologije na kvocientu je dobra in precej temeljna, toda sama po sebi še morda nekoliko prikriva kateremu poznanemu prostoru je homeomorfen kvocient \mathbb{C}/Λ . Oglejmo si preslikavo

$$f : \mathbb{C} \rightarrow S^1 \times S^1, \quad t_1\omega_1 + t_2\omega_2 \mapsto (e^{2\pi it_1}, e^{2\pi it_2}),$$

kjer sta ω_1 in ω_2 osnovni periodi mreže Λ in $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$. Preslikava je dobro definirana, saj ω_1 in ω_2 tvorita realno bazo za \mathbb{C} , in je tudi zvezna, saj koeficienta t_1 in t_2 dobimo s projiciranjem točke $t_1\omega_1 + t_2\omega_2$ na premici skozi izhodišče v smereh ω_1 oziroma ω_2 . Slednje dosežemo z realno linearno preslikavo³ $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$, podano s slikama baznih vektorjev $\omega_1 \mapsto (1, 0)$ in $\omega_2 \mapsto (0, 1)$. Ključno pa je, da se vrednost preslikave f v dani točki $z \in \mathbb{C}$ ne spremeni, če ji prištejemo katerokoli periodo iz $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbb{Z}\omega_2$. To pomeni, da ostaja konstantna na poljubnem ekvivalenčnem razredu $z + \Lambda$. Še več, njena vlakna so množice oblike $\{t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \omega \mid \omega \in \Lambda\}$, kar so natanko ekvivalenčni razredi \mathbb{C}/Λ . Zato po [5, Trditev...] f inducira zvezno bijekcijo

$$h : \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow S^1 \times S^1, \quad t_1\omega_1 + t_2\omega_2 + \Lambda \mapsto (e^{2\pi it_1}, e^{2\pi it_2})$$

za katero velja $h \circ \pi = f$. Preslikava h je ob tem še odprta in zato homeomorfizem. Namreč za odprto množico $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$, lahko njeno sliko s h zapišemo kot $h(U) = h(\pi(\pi^{-1}(U))) = f(\pi^{-1}(U))$. Ta pa je odprta, zaradi odprtosti množice $\pi^{-1}(U)$ in odprtosti preslikave f , ki je kompozicija dveh odprtih preslikav, realnega linearnega izomorfizma in odprte eksponentne preslikave $t \mapsto e^{2\pi it}$. Tako vidimo, da (topološki) kvocient \mathbb{C}/Λ predstavlja ravno torus $S^1 \times S^1$.

Lotimo se sedaj še kompleksne strukture na \mathbb{C}/Λ . Tukaj bo bistvena kvocientna projekcija $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$, s katero bomo definirali lokalne karte. Izkoristili bomo naslednjo njeno lastnost.

Lema 4.14. *Za vsako točko $z + \Lambda \in \mathbb{C}/\Lambda$ obstaja takšna odprta okolica $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$, te točke, imenujemo jo fundamentalna okolica, da je $\pi^{-1}(U)$ homeomorfna produktu $U \times \Lambda$ oziroma ekvivalentno*

$$\pi^{-1}(U) = \coprod_{\omega \in \Lambda} \tilde{U}_\omega, \quad \text{za neke homeomorfne kopije } \tilde{U}_\omega \subseteq \mathbb{C} \text{ okolice } U.$$

³To je linearni izomorfizem, zato je poleg zveznosti tudi odprta.

Dokaz. Izberimo točko $z + \Lambda \in \mathbb{C}/\Lambda$ in naj bo $z \in \mathbb{C}$ neki predstavnik tega ekvivalenčnega razreda. Ker je projekcija $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ odprta, bomo za odprto okolico $z + \Lambda$ vzeli kar sliko diska radija $r > 0$, $U = \pi(\Delta(z, r))$. Tedaj vidimo, da velja

$$\pi^{-1}(\pi(\Delta(z, r))) = \bigcup_{\omega \in \Lambda} \Delta(z + \omega, r).$$

Ta unija ni nujno disjunktna, lahko pa to dosežemo s primerno izbiro radija $r > 0$. Če namreč zahtevamo $0 < r < \frac{1}{2} \min_{\omega \in \Lambda'} |\omega|$, je presek poljubnih dveh diskov radija r s središčema v množici $z + \Lambda \subset \mathbb{C}$ prazen.

Prepričajmo se še, da je vsaka od kopij $\tilde{U}_\omega = \Delta(z + \omega, r)$ tudi homeomorfna $\pi(U)$. Zožitev $\pi|_{\tilde{U}_\omega}$ je zvezna in odprta, je pa tudi bijektivna, saj zaradi disjunktnosti vseh kopij, projekcija π ne naredi nobenih netrivialnih identifikacij na \tilde{U}_ω . Iskani homeomorfizem je tako $\pi|_{\tilde{U}_\omega} : \tilde{U}_\omega \rightarrow U$. \square

Opomba 4.15. V splošnem se preslikave s to lastnostjo imenujejo *krovne projekcije*.

Trditev 4.16. Družina $((U_i, \varphi_i))_{i \in I}$, kjer je $U_i \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$ fundamentalna okolica neke točke baznega prostora \mathbb{C}/Λ in je $\varphi_i = (\pi|_{V_i})^{-1}$ za neko kopijo fundamentalne okolice $V_i \subseteq \mathbb{C}$, tvori kompleksni atlas prostora \mathbb{C}/Λ .

Dokaz. Za poljubno točko $z + \Lambda \in \mathbb{C}/\Lambda$ naj bo $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$ njena fundamentalna okolica in $V \subseteq \mathbb{C}$ poljubna njej homeomorfna kopija. Tedaj vemo, da je $\pi|_V : V \rightarrow U$ homeomorfizem, ki kompleksno strukturo okolice $V \subseteq \mathbb{C}$ prenese na torus. Tako bo njen inverz $(\pi|_V)^{-1}$ dober kandidat za lokalno karto. Pokažimo, da je res tako, tj. da družina vseh takšnih parov $(U, (\pi|_V)^{-1})$ tvori kompleksen atlas za \mathbb{C}/Λ .

Po konstrukciji vse fundamentalne okolice pokrijejo bazni prostor \mathbb{C}/Λ in kot smo že omenili, so vse lokalne karte homeomorfizmi. Da bo omenjena družina kompleksen atlas, preostane preveriti še kompatibilnostni pogoj. Vzemimo poljubni dve lokalni karti sestavljeni iz okolic $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$ in pripadajočih homeomorfizmov $(\pi|_{V_1})^{-1} : V_1 \rightarrow U_1$ ter $(\pi|_{V_2})^{-1} : V_2 \rightarrow U_2$, ki ju označimo s φ_1 in φ_2 . Prepričajmo se, da je preslikava

$$\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} : \varphi_2(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \varphi_1(U_1 \cap U_2)$$

holomorfna na odprti množici $\varphi_2(U_1 \cap U_2) \subseteq \mathbb{C}$. Najlažje bo, če si ogledamo njen predpis. Za poljuben $z \in \varphi_2(U_1 \cap U_2)$ je $\varphi_1(\varphi_2^{-1}(z)) = z + \omega_z$, za neki $\omega_z \in \Lambda$, ki je odvisen od z . Zvezna preslikava $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1} - \text{id}_{\mathbb{C}}$ bo tako slikala iz okolice $\varphi_2(U_1 \cap U_2)$ točke z v mrežo Λ . Slednja je opremljena z diskretno topologijo, zato bo omenjena preslikava konstantna na vsaki povezani komponenti odprte množice $\varphi_2(U_1 \cap U_2)$. To pomeni, da ima na vsaki komponenti prehodna preslikava predpis oblike

$$\varphi_1(\varphi_2^{-1}(z)) = z + \omega,$$

za neki $\omega \in \Lambda$ (ta je zares odvisen samo od komponente za poveznost). Od tod je razvidno, da je preslikava $\varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$ holomorfna. \square

Definicija 4.17. Naj bo $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ mreža. Kvocientnemu prostoru \mathbb{C}/Λ skupaj s pripadajočim kompleksnim atlasom pravimo *kompleksni torus*.

Lema 4.18. Kvocientna projekcija $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ je holomorfna.

Dokaz. Preverili bomo holomorfnost preslikave π okoli vsake točke v \mathbb{C} , bistveno je opaziti, da je π lokalni homeomorfizem. Naj bo $z_0 \in \mathbb{C}$ poljubna in $V \subseteq \mathbb{C}$ njena dovolj majhna odprta okolica, ki se s π homeomorfno preslika na odprto množico $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$, tako, da je $(\pi|_V)^{-1} : U \rightarrow V$ lokalna karta za \mathbb{C}/Λ .

Za holomorfnost π , si to preslikavo oglejmo v kartah. Kompleksna struktura na \mathbb{C} je podana že z eno samo karto, tj. $(\mathbb{C}, \text{id}_{\mathbb{C}})$, zato bomo preverili holomorfnost preslikave

$$((\pi|_V)^{-1} \circ \pi) : \pi^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{C}.$$

Ker nas zares zanima samo obnašanje te preslikave okoli točke z_0 , lahko obravnavamo zgolj njeno zožitev na odprto okolico $V \subseteq \pi^{-1}(U) = \bigcup_{\omega \in \Lambda} (V + \omega)$. Od tod pa takoj sledi, da je $((\pi|_V)^{-1} \circ \pi)|_V = \text{id}_V$ holomorfna funkcija na $V \subseteq \mathbb{C}$, kar dokaže želeno. \square

Opomba 4.19. Preko leme 4.14 vidimo, da je π lokalni homeomorfizem. To pomeni, da ima vsaka točka v \mathbb{C}/Λ odprto okolico $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$ in odprto kopijo $\tilde{U} \subseteq \mathbb{C}$, za kateri je $\pi|_{\tilde{U}} : \tilde{U} \rightarrow U$ homeomorfizem. Ker pa je π holomorfna, je takšna jansno tudi zožitev $\pi|_{\tilde{U}}$, ki je bijekcija in zato po trditvi 4.9 celo biholomorfizem. Tedaj rečemo, da je π *lokalni biholomorfizem*.

Zadnja opomba in zgled 4.8 nam omogočata eliptične funkcije pogledati še z vidika Riemannovih ploskev. Eliptična funkcija $f \in \mathbb{C}(\Lambda)$ je meromorfna funkcija na \mathbb{C} , ki jo po zgledu lahko realiziramo kot holomorfno funkcijo $\mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$. Poleg tega je po definiciji njena vrednost dobro definirana na translatih oblike $z + \Lambda$, torej inducira zvezno preslikavo na kvocientu $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, ki pa ni le zvezna, ampak tudi holomorfna. Ekvivalentno lahko torej rečemo, da so eliptične funkcije glede na mrežo Λ natanko holomorfne funkcije $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$. Imamo bijektivno korespondenco množic

$$\{\Lambda\text{-periodične funkcije}\} \longleftrightarrow \{\text{holomorfne preslikave } \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \hat{\mathbb{C}}\}.$$

4.3.1. Holomorfne preslikave med kompleksnimi torusi. Podobno kot smo obravnavali holomorfne preslikave med eliptičnima krivuljama, si bomo v tem podrazdelku pogledali holomorfne preslikave med kompleksnima torusoma. Začeli bomo s konstrukcijo ene takšne preslikave, ki izhaja iz linearne holomorfne funkcije, nato pa z manjšo pomočjo teorije krovnih prostorov pokazali, da v resnici vsaka holomorfna preslikava med kompleksnima torusoma izhaja iz takšne cele holomorfne funkcije.

Zgled 4.20. Naj bosta Λ_1 in Λ_2 mreži v kompleksni ravnini in $a, b \in \mathbb{C}$ kompleksni števili, da velja

$$a\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2.$$

Naj bo $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ funkcija podana s predpisom $f(z) = az + b$ in označimo kvocientni projekciji $\pi_1 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_1$ ter $\pi_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$.

Zaradi pogoja $a\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2$, za poljubni točki $z, w \in \mathbb{C}$, za kateri je $\pi_1(z) = \pi_1(w)$ oz. $z + \Lambda_1 = w + \Lambda_1$, sledi tudi $\pi_2(f(z)) = \pi_2(f(w))$ oz. $az + b + \Lambda_2 = az + b + \Lambda_2$. Od tod se po izreku [5,] inducira zvezna preslikava $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$, da velja $\bar{f} \circ \pi_1 = \pi_2 \circ f$ oziroma, da komutira naslednji diagram.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{f} & \mathbb{C} \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ \mathbb{C}/\Lambda_1 & \xrightarrow{\bar{f}} & \mathbb{C}/\Lambda_2 \end{array}$$

Poleg tega pa je \bar{f} tudi holomorfna. Ker je π_1 lokalni homeomorfizem ima vsaka točka na torusu \mathbb{C}/Λ_1 odprto okolico U homeomorfno neki odprti množici $V \subseteq \mathbb{C}$,

tako, da je $\pi_1|_V : V \rightarrow U$ homeomorfizem. Preslikava π_1 je po lemi 4.18 holomorfná, torej je takšna tudi njena zožitev $\pi_1|_V$, hkrati pa je ta zožitev tudi homeomorfizem, zato je po trditvi 4.9 njen inverz $(\pi_1|_V)^{-1}$ holomorfen. Tedaj vidimo, da lahko iz enačbe $\bar{f} \circ \pi_1 = \pi_2 \circ f$ lokalno izrazimo \bar{f} , od koder sledi, da je

$$\bar{f}|_U = \pi_2 \circ f \circ (\pi_1|_V)^{-1}$$

holomorfná preslikava na okolici U . Pokazali smo, da je \bar{f} holomorfná na neki odprti okolici vsake točke iz \mathbb{C}/Λ_1 , zato je holomorfná tudi kot preslikava $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$. Po tej konstrukciji lahko zapišemo predpis inducirane preslikave \bar{f} :

$$z + \Lambda_1 \mapsto az + b + \Lambda_2.$$

V posebnem, ko vzamemo število $a \in \mathbb{C}^\times$ takšno, da velja celo enakost $a\Lambda_1 = \Lambda_2$, bo inducirana preslikava $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$, podana s predpisom $\bar{f}(z + \Lambda_1) = az + b + \Lambda_2$, biholomorfizem. Njen inverz bo preslikava s predpisom $z + \Lambda_2 \mapsto \frac{z}{a} - \frac{b}{a} + \Lambda_1$, ki je tudi holomorfná, saj jo inducira inverz funkcije f , ki je tudi zahtevane oblike s predpisom $f^{-1}(z) = \frac{z}{a} - \frac{b}{a}$.

Izkaže se, da velja tudi neke vrste obrat te konstrukcije. Namreč vsaka zvezna funkcija $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ izhaja iz takšne zvezne funkcije $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, da f po zgornjem premisleku inducira ravno preslikavo \bar{f} med kvocientoma. To pove naslednja trditev.

Trditev 4.21. *Naj bo $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ zvezna preslikava.*

(i) *Tedaj obstaja zvezna funkcija $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, da velja*

$$\bar{f} \circ \pi_1 = \pi_2 \circ f.$$

Ob tem je f enolično določena s \bar{f} , do prištevanja konstante iz Λ_2 natančno.

(ii) *Če je \bar{f} tudi holomorfná, je f holomorfná in oblike $f(z) = az + b$ za neka $a, b \in \mathbb{C}$ in ob tem posledično velja $a\Lambda_1 \subseteq \Lambda_2$ ter $\bar{f}(z + \Lambda_1) = az + b + \Lambda_2$.*

Dokaz. (i) Dokaz obstoja preslikave $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se dotakne teorije krovnih prostorov, ki izkoristi enostavno povezanosti \mathbb{C} ter lepo strukturo kvocientne projekcije π_2 , in je ne bomo razvijali, zato se skličimo na [8, Lema 3.1].

Pokažimo še njeno enoličnost. Če bi imeli dva dviga f in g , ki zadoščata enačbi $\pi_2 \circ f = \bar{f} \circ \pi_1 = \pi_2 \circ g$, bi za njuno razliko veljalo $f - g : \mathbb{C} \rightarrow \Lambda_2$. Zvezna funkcija, ki slika v diskretno množico kot je mreža Λ_2 , pa je lahko samo konstantna, od koder dobimo $f = g + \omega$, za neko periodo $\omega \in \Lambda_2$.

(ii) Podobno, kot smo v zgledu 4.20 izkoristili lokalno biholomorfno projekcije π_1 , tokrat uporabimo lokalno biholomorfno π_2 , da lokalno izrazimo f , kot kompozicijo holomorfnih funkcij. Sledi, da je f cela holomorfná funkcija.

Oglejmo si še obliko funkcije $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Naj bo $\omega \in \Lambda_1$ poljubna perioda in tvorimo celo holomorfnó funkcijo s predpisom $g_\omega(z) = f(z + \omega) - f(z)$. Tedaj velja

$$\pi_2(f(z + \omega)) = \bar{f}(\pi_1(z + \omega)) = \bar{f}(\pi_1(z)) = \pi_2(f(z)),$$

kar pomeni, da g_ω slika v diskretno mrežo Λ_2 in je tako lahko le konstantna. Njen odvod je torej ničelni, torej za vse $z \in \mathbb{C}$ velja $f'(z + \omega) = f'(z)$. Ker je bila perioda $\omega \in \Lambda_1$ poljubna, sledi, da je f' eliptična glede na Λ_1 . Kot holomorfná eliptična funkcija, pa je ponovno lahko le konstanta po trditvi 3.6. Tedaj je $f' \equiv a$, za neki $a \in \mathbb{C}$ in posledično za vse $z \in \mathbb{C}$ velja $f(z) = az + b$, za neki $b \in \mathbb{C}$, kar smo hoteli pokazati. \square

//tole opombo raši vključim frišno v zadnje poglavje

Opomba 4.22. V posebnem primeru, ko je $\bar{f} : \mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ biholomorfna, obstaja tak $\alpha \in \mathbb{C}^\times$, da je $\alpha\Lambda_1 = \Lambda_2$. Drugače povedano obstaja središčni razteg ali *homotetija* kompleksne ravnine, ki eno mrežo preslika v drugo. Tedaj rečemo, da sta mreži *podobni* ali *homotetični* in označimo

$$\Lambda_1 \simeq \Lambda_2.$$

5. UNIFORMIZACIJA

Zadnje poglavje o uniformizaciji povezuje vsa prejšnja. Začeli bomo s konstrukcijo preslikave, ki nam jo je namigoval izrek 3.24. Ta preslikava se bo preko kompleksnih struktur, ki smo ju za kompleksni torus in eliptično krivuljo konstruirali v prejšnjem poglavju, izkazala za bijekcijo in celo biholomorfizem.

Nadalje se bomo posvetili mrežam v kompleksni ravnini in si ogledali kako smemo dano mrežo transformirati, da še vedno ostanemo v istem izomorfnoznem razredu kompleksnih torusov, ki ju dani mreži porodita. Ena od teh podob mreže bo prav posebne oblike, kar bomo izkoristili za nekoliko drugačno interpretacijo Eisensteinovih vrst iz 3. poglavja, in sicer kot holomorfnost funkcijo zgornje polravnine. Od tod bomo to analogijo nadaljevali še z j -invarianto, kjer se bomo dotaknili *modularnih funkcij*, kar nam bo nazadnje omogočilo vse skupaj povezati v uniformizacijskem izreku.

5.1. Izomorfizem $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C})$.

Trditev 5.1. *Naj bo $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ mreža, \wp Weierstrassova eliptična funkcija glede na to mrežo Λ in naj bo $E(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ eliptična krivulja podana z enačbo*

$$E : \quad y^2 z = 4x^3 - g_2(\Lambda)xz^2 - g_3(\Lambda)z^3.$$

Tedaj je preslikava $\phi : \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C})$ podana s predpisom

$$z + \Lambda \mapsto \begin{cases} [\wp(z) : \wp'(z) : 1]; & z \notin \Lambda \\ [0 : 1 : 0]; & z \in \Lambda \end{cases}$$

dobro definiran biholomorfizem Riemannovih ploskev.

Dokaz. Razdelimo dokaz trditve na naslednje štiri dele: dobra definiranost, zveznost, bijektivnost in holomorfnost preslikave ϕ .

Dobra definiranost. Po izreku 3.24 za poljuben $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$ velja $[\wp(z) : \wp'(z) : 1] \in E(\mathbb{C})$ in posebej je tudi $[0 : 1 : 0] \in E(\mathbb{C})$, torej bo slika preslikave ϕ res vsebovana v eliptični krivulji $E(\mathbb{C})$.

Predpis za ϕ je podan na kvocientu \mathbb{C}/Λ , torej se moramo prepričati še o neodvisnosti le tega od izbire predstavnikov ekvivalenčnih razredov. Če sta $z, w \in \mathbb{C}$ predstavnika istega ekvivalenčnega razreda, velja $z - w \in \Lambda$ oz. $w = z + \omega$, za neki $\omega \in \Lambda$. V primeru, ko je $z \notin \Lambda$, je tudi $w \notin \Lambda$, in tedaj zaradi Λ -periodičnosti funkcije \wp velja

$$[\wp(w) : \wp'(w) : 1] = [\wp(z + \omega) : \wp'(z + \omega) : 1] = [\wp(z) : \wp'(z) : 1].$$

Kadar pa sta $z, w \in \Lambda$, je že sam predpis ϕ neodvisen od izbire predstavnika, torej je celoten predpis ϕ res dobro definiran na točkah kvocienta \mathbb{C}/Λ .

Zveznost. Za nadaljevanje bo koristno poznati limiti

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\wp(z)}{\wp'(z)} = 0 \quad \text{in} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\wp'(z)} = 0,$$

zato ju izračunajmo. Spomnimo se obnašanja \wp oz. \wp' okoli svojih polov. Po trditvi 3.22 ima \wp v točki 0 pol druge stopnje, zato obstajata takšni holomorfni funkciji

$g, h \in \mathcal{O}(U)$, definiranih na neki dovolj majhni odprti okolici $U \subseteq \mathbb{C}$ točke 0, ki sta na U neničelni, da velja $\wp(z) = \frac{g(z)}{z^2}$ in $\wp'(z) = \frac{h(z)}{z^3}$ za vse $z \in U$. Tedaj izračunamo

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\wp(z)}{\wp'(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{g(z)z^3}{h(z)z^2} = \frac{g(0)}{h(0)} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{z^2} = 0$$

ter

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{\wp'(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{h(z)} = \frac{1}{h(0)} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} z^3 = 0.$$

Zaradi Λ -periodičnosti, dobimo tudi $\lim_{z \rightarrow \omega} \frac{\wp(z)}{\wp'(z)} = 0$ in $\lim_{z \rightarrow \omega} \frac{1}{\wp'(z)} = 0$ za vsak $\omega \in \Lambda$. Vidimo torej, da imata funkciji $\frac{\wp}{\wp'}$ in $\frac{1}{\wp'}$ zgolj odpravljivi singularnosti v točkah iz Λ , kar pomeni, da ju lahko z vrednostjo 0 v teh točkah holomorfno razširimo. Z manjšo zlorabo oznak bomo ti dve razšitivi spet označili kar s $\frac{\wp}{\wp'}$ oziroma $\frac{1}{\wp'}$ in razumeli $\frac{\wp(\omega)}{\wp'(\omega)} = 0$ ter $\frac{1}{\wp'(\omega)} = 0$ za $\omega \in \Lambda$.

Po lemi 3.25 vemo, da ima \wp' po tri enostavne ničle na fundamentalnem paralelogramu v polperiodah mreže Λ , tj. v množici $\frac{1}{2}\Lambda = \{\frac{\omega}{2} \in \mathbb{C} \mid \omega \in \Lambda\}$. Natančneje je množica ničel funkcije \wp' natanko $\frac{1}{2}\Lambda \setminus \Lambda$. Polperiode iz mreže Λ smo izvzeli, saj ima v vsaki izmed njih \wp' pol tretje stopnje. Funkciji $\frac{\wp}{\wp'}$ in $\frac{1}{\wp'}$ lahko torej vidimo, kot dobro definirani holomorfni Λ -periodični funkciji na odprti domeni $\mathbb{C} \setminus (\frac{1}{2}\Lambda \setminus \Lambda)$.

Naj $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ označuje kvocientno projekcijo. Opazimo, da je ϕ natanko preslikava, ki se faktorizira skozi preslikavo

$$\Phi : \mathbb{C} \rightarrow E(\mathbb{C}), \quad z \mapsto \begin{cases} [\wp(z) : \wp'(z) : 1]; & z \notin \Lambda \\ [0 : 1 : 0]; & z \in \Lambda \end{cases},$$

zato bo zaradi trditve [5,] dovolj preveriti zveznost Φ , ker je π kvocientna. Podali bomo dva predpisa za Φ , definirana na odprtih podmnožicah v \mathbb{C} , katerih unija bo pokrila \mathbb{C} , in oba predpisa se bosta na njunem preseku ujemala.

Vzemimo odprti množici $U_0 = \mathbb{C} \setminus \Lambda$ in $U_1 = \mathbb{C} \setminus (\frac{1}{2}\Lambda \setminus \Lambda)$ in definirajmo preslikavi

$$\begin{aligned} \Phi_0 : U_0 &\rightarrow E(\mathbb{C}), \quad z \mapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1], \\ \Phi_1 : U_1 &\rightarrow E(\mathbb{C}), \quad z \mapsto \left[\frac{\wp(z)}{\wp'(z)} : 1 : \frac{1}{\wp'(z)} \right]. \end{aligned}$$

Zaradi omenjenih lastnosti $\frac{\wp}{\wp'}$ in $\frac{1}{\wp'}$ sta Φ_0 in Φ_1 zvezni kot kompoziciji preslikav $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3 \setminus \{0\}$ in zvezne kvocientne projekcije $\mathbb{C}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$. Na preseku njunih domen $U_0 \cap U_1 = \mathbb{C} \setminus \frac{1}{2}\Lambda$ velja

$$\Phi_0(z) = [\wp(z) : \wp'(z) : 1] = \left[\frac{\wp(z)}{\wp'(z)} : 1 : \frac{1}{\wp'(z)} \right] = \Phi_1(z),$$

saj je $\wp'(z) \in \mathbb{C}^\times$ za $z \in \mathbb{C} \setminus \frac{1}{2}\Lambda$. Ker preslikavi Φ_0 in Φ_1 skupaj določata ravno Φ , je slednja zvezna, od koder sledi, da je tudi ϕ zvezna.

Bijektivnost. Začnimo s surjektivnostjo. Očitno je $\phi(0 + \Lambda) = [0 : 1 : 0]$, zato izberimo poljubno točko oblike $[x_0 : y_0 : 1] \in E(\mathbb{C}) \setminus \{[0 : 1 : 0]\}$. Ker je po trditvi 3.14 eliptična funkcija \wp surjektivna, obstaja $z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda$, da je $\wp(z) = x_0$. Iz identitete (3.2) sledi $\wp'(z)^2 = y_0^2$, torej sta $\wp'(z)$ in y_0 enaka do predznaka natančno. Ker pa je \wp soda in \wp' liha, lahko po potrebi zamenjamo $-z$ in z , da dobimo $\wp(z) = x_0$ in $\wp'(z) = y_0$ oziroma $\phi(z + \Lambda) = [x_0 : y_0 : 1]$.

Pokažimo še injektivnost ϕ . Omejili se bomo samo na injektivnost zožitve $\phi|_{\pi(\mathbb{C} \setminus \Lambda)}$, saj je $0 + \Lambda$ edina točka, ki se preslika v neskončnost, slike vseh ostalih točk imajo

namreč tretjo projekтивно koordinato neničelno. Naj bosta $z_1 + \Lambda, z_2 + \Lambda \in \pi(\mathbb{C} \setminus \Lambda)$ poljubni in denimo, da velja $\phi(z_1 + \Lambda) = \phi(z_2 + \Lambda)$. Zaradi redukcije na območje $\pi(\mathbb{C} \setminus \Lambda)$, imamo opravka samo z afinim delom krivulje E in se zato zgronji pogoj prevede v ekvivalentnega

$$(5.1) \quad (\wp(z_1), \wp'(z_1)) = (\wp(z_2), \wp'(z_2)).$$

Ločimo dve možnosti:

- Če je $2z_1 \in \Lambda$, potem je predstavnik točke $z_1 + \Lambda$ do prištete periode iz Λ natanko ena od polperiod

$$\frac{\omega_1}{2}, \quad \frac{\omega_2}{2}, \quad \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}.$$

Iz dokaza leme 3.26 vemo, da \wp v vsaki od teh treh polperiod zavzame drugačno vrednost, torej iz $\wp(z_1) = \wp(z_2)$ sledi $z_1 + \Lambda = z_2 + \Lambda$.

- Če je $2z_1 \notin \Lambda$, potem z_1 ni ena od polperiod in je $\wp'(z_1) \neq 0$. Ker je \wp soda in reda 2, iz $\wp(z_1) = \wp(z_2)$ sledi

$$z_1 \equiv \pm z_2 \pmod{\Lambda}.$$

Zaradi lihosti \wp' in, ker velja $\wp'(z_1) \neq 0$, se lahko zgodi le $z_1 + \Lambda = z_2 + \Lambda$, kajti v nasprotnem primeru bi imeli $\wp'(z_2) = \wp'(-z_1) = -\wp'(z_1) \neq \wp'(z_1)$, kar je v nasprotju s pogojem 5.1.

Skupaj je tako ϕ res bijektivna.

Holomorfnost. Nazadnje si pogledjmo, zakaj je ϕ holomorfna. Ker je π lokalni biholomorfizem, bo zadoščalo pokazati le holomorfnost kompozicije

$$\mathbb{C} \xrightarrow{\pi} \mathbb{C}/\Lambda \xrightarrow{\phi} E(\mathbb{C}).$$

Okoli poljubne točke na \mathbb{C}/Λ imamo namreč odprto okolico $U \subseteq \mathbb{C}/\Lambda$ in odprto množico $V \subseteq \mathbb{C}$, da je $(\pi|_V)^{-1} : U \rightarrow V$ biholomorfizem (in hkrati tudi lokalna karta za \mathbb{C}/Λ). Tedaj bo kompozicija holomorfnih preslikav $\phi \circ \pi$ in $(\pi|_V)^{-1}$ spet holomorfna in enaka

$$(\phi \circ \pi) \circ (\pi|_V)^{-1} = \phi \circ \text{id}_U = \phi|_U.$$

Pokažimo torej, da je $\phi \circ \pi$ holomorfna na okolici poljubne točke $z_0 \in \mathbb{C}$. Ločimo tri možnosti.

- Če je $z_0 \in \Lambda$, bo $\phi(\pi(z_0)) = [0 : 1 : 0]$. Naj bo ψ lokalna karta na $E(\mathbb{C})$ pri točki $[0 : 1 : 0]$. Tedaj vemo, da je ta podana s predpisom $\psi([x : 1 : z]) = x$, torej na dovolj majhni okolici točke z_0 velja

$$\psi(\phi(\pi(z))) = \psi([\wp(z) : \wp'(z) : 1]) = \psi\left(\left[\frac{\wp(z)}{\wp'(z)} : 1 : \frac{1}{\wp'(z)}\right]\right) = \frac{\wp(z)}{\wp'(z)}.$$

To je predpis holomorfnе funkcije, zaradi odpravljljive singularnosti $\frac{\wp}{\wp'}$ pri $z_0 \in \Lambda$.

- Če je $z_0 \in \frac{1}{2}\Lambda \setminus \Lambda$, je $\phi(\pi(z_0)) = [\wp(z_0) : 0 : 1]$. Na odprti okolici te točke imamo lokalno karto ψ , s predpisom $\psi([x : y : 1]) = y$. Na dovolj majhni odprti okolici točke z_0 bo torej veljalo

$$\psi(\phi(\pi(z))) = \psi([\wp(z) : \wp'(z) : 1]) = \wp'(z),$$

ki je očitno predpis holomorfnе funkcije na tej odprti okolici.

- (iii) Če je $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \frac{1}{2}\Lambda$, pa imamo na okolici točke $\phi(\pi(z_0))$ lokalno karto ϕ , ki je oblike $\psi([x : y : 1]) = x$ in na dovolj majhni odprti okolici z_0 velja

$$\psi(\phi(\pi(z))) = \psi([\wp(z) : \wp'(z) : 1]) = \wp(z),$$

ki je jasno tudi holomorfna.

Skupaj vidimo, da je ϕ holomorfna bijekcija, od koder po trditvi 4.9 sledi, da je $\phi : \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E(\mathbb{C})$ biholomorfizem. \square

5.2. j -invarianta. V zaključku 2. poglavja smo spoznali, t. i. j -invarianto eliptične krivulje, ki se je izkazala za popolno invarianto na prostoru eliptičnih krivulj do projektivnosti natančno. Drugače rečeno sta eliptični krivulji, z enako j -invarianto, nad poljem kompleksnih števil \mathbb{C} vedno projektivno ekvivalentni in celo vsaki vrednost $j \in \mathbb{C}$ pripada neki razred projektivno ekvivalentnih eliptičnih krivulj.

V osnovi je j -invarianta bila število, ki smo ga izračunali iz koeficientov a, b eliptične krivulje

$$E : y^2z = 4x^3 - axz^2 - bz^3.$$

V tem poglavju pa bomo spoznali, kako j -invarianto vidimo kot holomorfno funkcijo zgornje polravnine

$$\mathfrak{H} = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\},$$

in celo kot *modularno funkcijo* z mnogo simetrije. To nam bo nazadnje omogočilo končati s sklepnim uniformizacijskim izrekom.

Mreže.

Lema 5.2. *Eisensteinova vrsta reda $k > 2$ za mrežo $\Lambda_\tau = \langle 1, \tau \rangle$*

$$G_k(\Lambda) = G_k(\langle 1, \tau \rangle) = \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{1}{(m + n\tau)^k}$$

podaja holomorfno funkcijo na zgornji polravnini $\tau \in \mathfrak{H}$, ki jo ponovno označimo z $G_k : \mathfrak{H} \rightarrow \mathbb{C}$, $G_k(\tau) = G_k(\Lambda_\tau)$.

Dokaz. Zaradi Weierstrassovega M-testa in izreka 3.19 zadošča pokazati, da je G_k omejena po kompaktilih v \mathfrak{H} . Če je $K \subseteq \mathfrak{H}$ poljuben kompaktni, obstajata taka $a, \varepsilon > 0$, da je K vsebovan v pravokotniku $S_{a,\varepsilon} = \{z \in \mathfrak{H} \mid |\operatorname{Re}(z)| \leq a, \varepsilon \leq \operatorname{Im}(z) \leq a\}$. Izkaže se, da obstaja tak $\delta \in (0, 1)$, za katerega je

$$(5.2) \quad |m + n\tau| \geq \delta |m + ni|,$$

za vse $(m, n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ in vse $\tau \in S_{a,\varepsilon}$. To oceno uporabimo na kompaktni K za majorizacijo $G_k(\tau)$ na sledeč način

$$\sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{1}{|m + n\tau|^k} \leq \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{1}{\delta^k |m + ni|^k} = \frac{1}{\delta^k} \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}} \frac{1}{|m + ni|^k}.$$

Zadnja vrsta predstavlja ravno $G_k(\langle 1, i \rangle)$, ki je po lemi 3.17 absolutno konvergentna, torej je G_k res holomorfna funkcija na zgornji polravnini.

Vrnimo se sedaj še k oceni 5.2. Če je $n = 0$, ocena drži za katerikoli δ , zato bo ekvivalentno pokazati obstoj takega $\delta \in (0, 1)$, da bo za vse $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$, kjer $n \neq 0$, in $\tau \in S_{a,\varepsilon}$ veljalo

$$\left| \frac{\tau + \frac{m}{n}}{i + \frac{m}{n}} \right| \geq \delta.$$

Definirajmo zvezno funkcijo $f : S_{a,\varepsilon} \times \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ s predpisom $f(\tau, x) = \left| \frac{\tau-x}{i-x} \right|$. Za vsak fiksen τ , velja $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(\tau, x) = 1$, torej obstaja $R_\tau > 0$, da je $\left| \frac{\tau-x}{i-x} \right| \geq \frac{1}{2}$ za vse $|x| \geq R_\tau$. Hkrati pa zaradi zveznosti, funkcija f na kompaktu $\{\tau\} \times [-R_\tau, R_\tau]$ doseže minimum $c_\tau > 0$. Tedaj zadošča vzeti $\delta_\tau = \min\{c_\tau, \frac{1}{2}\}$, za katerega je $f(\tau, x) \geq \delta_\tau$.

To oceno pa lahko izpeljemo tudi enakomerno glede na τ . Za poljuben $\tau \in S_{a,\varepsilon}$ in $x > a$ velja

$$\left| \frac{\tau-x}{i-x} \right| \geq \left| \frac{a+i\varepsilon-x}{i-x} \right|,$$

kot vidimo na sliki, torej bo za vse $\tau \in S_{a,\varepsilon}$ in vse $x > \max\{R_{a+i\varepsilon}, a\} = r_+$ veljalo $\left| \frac{\tau-x}{i-x} \right| \geq \frac{1}{2}$. Simetrično lahko sklepamo, da bo $\left| \frac{\tau-x}{i-x} \right| \geq \frac{1}{2}$ za vse $\tau \in S_{a,\varepsilon}$ in vse $x < \min\{-R_{-a+i\varepsilon}, -a\} = r_-$. Zaradi zveznosti, f doseže minimalno vrednost $c > 0$ na kompaktu $S_{a,\varepsilon} \times [r_-, r_+]$, torej nazadnje, za $\delta = \min\{c, \frac{1}{2}\} > 0$ dobimo

$$\left| \frac{\tau-x}{i-x} \right| \geq \delta, \quad \text{za vse } \tau \in S_{a,\varepsilon} \text{ in vse } x \in \mathbb{R},$$

kar zaključimo dokaz. □

Trditev 5.3. Dve mreži sta si podobni natanko tedaj, ko sta njuni j -invarianti enaki.

Izrek 5.4. j -invarianta inducira bijekcijo $j : \mathfrak{H} / \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}$.

Izrek 5.5. Za vsako kompleksno eliptično krivuljo $E(\mathbb{C})$ podano z enačbo

$$E : y^2z = 4x^3 - axz^2 - bz^3; \quad a^3 - 27b^2 \neq 0,$$

obstaja mreža $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$, da je $\mathbb{C}/\Lambda \cong E(\mathbb{C})$ izomorfizem Riemannovih ploskev.

Dokaz. Naj bo $j_E = 1728 \frac{a^3}{a^3 - 27b^2}$ j -invarianta eliptične krivulje E . Tedaj po izreku 5.4 obstaja tak $\tau \in \mathfrak{H}$, da je $j(\tau) = j_E$. Za mrežo $\Lambda = \langle 1, \tau \rangle$ tedaj velja \square

Posledica 5.6. *Eliptični krivulji sta projektivno ekvivalentni natanko tedaj, ko sta izomorfni kot Riemannovi ploskvi.*

Dokaz. Naj bosta E_1 in E_2 eliptični kriulji s pripadajočima kompleksnima struktura. Če sta projektivno ekvivalentni, nam trditev 4.13 pove, da je projektivnost med njima holomorfna preslikava s holomorfnim inverzom, kar pomeni, da je biholomorfizem med E_1 in E_2 .

Obratno, denimo, da sta E_1 in E_2 izomorfni kot Riemannovi ploskvi. Tedaj po uniformizacijskem izreku 5.5 dobimo mreži Λ_1 in Λ_2 , da sta $\mathbb{C}/\Lambda_1 \cong E_1$ in $\mathbb{C}/\Lambda_2 \cong E_2$ izomorfizma Riemannovih ploskev, in posledično izomorfizem $\mathbb{C}/\Lambda_1 \cong \mathbb{C}/\Lambda_2$. Po trditvi 4.21 v posebnem dobimo, da je $\alpha\Lambda_1 = \Lambda_2$ za neki $\alpha \in \mathbb{C}^\times$, od tod pa \square

\mathcal{L}

SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

elliptic function eliptična funkcija

fundamental domain fundamentalna domena

elliptic curve eliptična krivulja

complex torus kompleksni torus

Weierstrass \wp -function Weierstrassova \wp -funkcija

LITERATURA

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex analysis*, third edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1979.
- [2] C. G. Gibson, *Elementary geometry of algebraic curves: An undergraduate introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [3] J. Globevnik in M. Brojan, *Analiza II*, verzija 10. 8. 2010, [ogled 28. 7. 2021], dostopno na <https://www.fmf.uni-lj.si/~globevnik/skriptaII.pdf>.
- [4] S. Lang, *Elliptic functions*, Graduate Texts in Mathematics **112**, Springer-Verlag, New York, 1973.
- [5] J. Mrčun, *Topologija*, Izbrana poglavja iz matematike in računalništva **44**, DMFA-založništvo, Ljubljana, 2008.
- [6] J. H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics **106**, Springer-Verlag, New York, 1986.
- [7] J. P. Serre, *A course in arithmetic*, Graduate Texts in Mathematics **7**, Springer-Verlag, New York, 1973.
- [8] P. Stevenhagen, *Complex elliptic curves*, verzija 1. 10. 2013, [ogled 9. 2. 2021], dostopno na <http://www.julianlyczak.nl/teaching/EC2015-files/ec.pdf>.