

数学 II / 2

内海 和樹

2025 年 9 月 29 日

「2 積分とは」まで

積分基本問題集

- 壱 (1 変数) <https://github.com/kazutsumi/Integral1/blob/main/integral1.pdf>



- 弐 (2 変数) <https://github.com/kazutsumi/Integral2/blob/main/integral2.pdf>



目次

1	不定積分計算の基礎	6
1.1	基礎中の基礎	6
1.2	積分計算のテクニック	8
1.3	積分計算で悩んだら	10
1.4	練習問題	11
1.5	(おまけ) 不定積分と微分方程式	13
2	積分とは	16
2.1	Riemann 和	16
2.2	積分の定義	18
2.3	微分積分学の基本定理	19
2.4	定積分における部分積分と置換積分	20
2.5	微分積分学の基本定理の証明	21
2.6	(おまけ) Riemann 和の極限としての積分	23

目次ページが続く

まだ目次ページ

たぶんここまで目次ページ

1 不定積分計算の基礎

1.1 基礎中の基礎

なにはともあれ、以下の微分公式を思い出しておこう。いずれも春学期に学んだはず。

$f(x)$	x^n	e^x	$\log x $	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\sin^{-1}x$	$\cos^{-1}x$	$\tan^{-1}x$
$f'(x)$	nx^{n-1}	e^x	$\frac{1}{x}$	$\cos x$	$-\sin x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{1+x^2}$

この表を逆に読むことで、以下の基礎中の基礎の公式を導ける。面倒なので、以降積分定数は省略する。

$$\bullet x^n = \frac{n+1}{n+1} x^n = \frac{1}{n+1} (x^{n+1})' = \left(\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' \text{ より } \boxed{\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \quad (n \neq -1)}$$

$$\bullet e^x = (e^x)' \text{ より } \boxed{\int e^x dx = e^x}$$

$$\bullet \frac{1}{x} = (\log x)' \text{ より } \boxed{\int \frac{dx}{x} = \log x}$$

$$\bullet \cos x = (\sin x)' \text{ より } \boxed{\int \cos x dx = \sin x}$$

$$\bullet \sin x = -(-\sin x) = -(\cos x)' = (-\cos x)' \text{ より } \boxed{\int \sin x dx = -\cos x}$$

$$\bullet \frac{1}{\cos^2 x} = (\tan x)' \text{ より } \boxed{\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x}$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (\sin^{-1} x)' \text{ より } \boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x}$$

$$\bullet \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = -\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = -(\cos^{-1} x)' = (-\cos^{-1} x)' \text{ より } \boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\cos^{-1} x}$$

$$\bullet \frac{1}{1+x^2} = (\tan^{-1} x)' \text{ より } \boxed{\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x}$$

初めの公式 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$ において n は自然数だけでなく,

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = -x^{-1}, \quad \int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

のように, $n = -2$ や $n = 1/2$ などでも適用できるので, 結構適用範囲が広い.

合成関数の微分公式から, 例えば $(\sin(3x))' = 3 \cos(3x)$ なので, $\cos(3x) = \frac{1}{3} (\sin(3x))' = \left(\frac{1}{3} \sin(3x)\right)'$ である. これを逆に読んで

$$\int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x)$$

を導ける. 他にも, 例えば $(e^{-2x})' = -2e^{-2x}$ なので, $e^{-2x} = -\frac{1}{2} (e^{-2x})' = \left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)'$ より

$$\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

である. このように, どんな方法であれ関数 f に対して $F' = f$ となる F を見つけてしまえば

$$\int f(x) dx = F(x)$$

である. もう少しだけ複雑な例をあげておく. 例えば $\left(\tan^{-1} \frac{x}{2}\right)' = \frac{1/2}{1+(x/2)^2} = \frac{2}{4+x^2}$ より

$$\frac{1}{4+x^2} = \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} \frac{x}{2}\right)' = \left(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2}\right)'$$

となるので, これを逆に読めば

$$\int \frac{dx}{4+x^2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2}$$

を導ける. これと同様に, $\left(\sin^{-1} \frac{x}{3}\right)' = \frac{1/3}{\sqrt{1-(x/3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$ から

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{3}$$

などを導くこともできる. 逆三角関数に臆することなく, しっかり使いこなせるようになろう.

また, 微分可能な関数 f に対して, 合成関数の微分公式から $(\log |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$ なので,

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)|}$$

である. この形は割とよく現れるのでしっかり使いこなそう. 例えば, 次のような使い方ができる.

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int -\frac{(\cos x)'}{\cos x} dx = -\log |\cos x| \\ \int \frac{x}{1+x^2} dx &= \int \frac{1}{2} \frac{2x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{2} \frac{(1+x^2)'}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \log |1+x^2| \end{aligned}$$

1.2 積分計算のテクニック

基礎中の基礎の公式だけではもちろん足りないの、その他の公式（テクニック）を紹介する。

まず、以下の積分の線形性は基本的すぎて公式として認識されていないかもしれない。

積分の線形性

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \quad (\alpha, \beta \text{ は定数})$$

これは微分の線形性 $(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x)$ から容易に導かれる。例えば次のように使う。

$$\int (3x^2 + 2e^x + \cos x) dx = 3 \int x^2 dx + 2 \int e^x dx + \int \cos x dx = x^3 + 2e^x + \sin x$$

次に、置換積分とその使い方を紹介する。この公式は合成関数の微分公式を逆に読めば導ける。

置換積分

$u = g(x)$ が C^1 級関数なら次が成り立つ。

$$\int f(g(x)) \frac{du}{dx} dx = \int f(u) du$$

- $\int (2x+1)^2 dx$

$u = 2x+1$ とおくと、 $\frac{du}{dx} = 2$ より $1 = \frac{1}{2} \frac{du}{dx}$ であるから、

$$\int (2x+1)^2 \cdot 1 dx = \int u^2 \frac{1}{2} \frac{du}{dx} dx = \frac{1}{2} \int u^2 du = \frac{1}{6} u^3 = \frac{1}{6} (2x+1)^3.$$

- $\int \frac{\cos x}{1+\sin x} dx$

$u = 1 + \sin x$ とおくと、 $\frac{du}{dx} = \cos x$ より、

$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x} dx = \int \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx = \int \frac{du}{u} = \log |u| = \log |1 + \sin x|.$$

- $\int x e^{x^2} dx$

$u = e^{x^2}$ とおくと、 $\frac{du}{dx} = 2x e^{x^2}$ より $x e^{x^2} = \frac{1}{2} \frac{du}{dx}$ であるから、

$$\int x e^{x^2} dx = \int \frac{1}{2} \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} u = \frac{1}{2} e^{x^2}.$$

- $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$

$u = \cos x$ とおくと、 $\frac{du}{dx} = -\sin x$ より $\sin x = -\frac{du}{dx}$ であるから、

$$\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{1}{u} \left(-\frac{du}{dx} \right) dx = - \int \frac{du}{u} = -\log |u| = -\log |\cos x|.$$

続いて、部分積分とその使い方を紹介する。この公式は積の微分公式を逆に読むことで導ける。

部分積分

$f(x), g(x)$ がともに C^1 級関数なら次が成り立つ。

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

- $\int xe^x dx = \int x(e^x)' dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x$
- $\int x \log x dx = \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' \log x dx = \frac{x^2}{2} \log x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \log x - \frac{x^2}{4}$
- $\int \log x dx = \int (x)' \log x dx = x \log x - \int \frac{x}{x} dx = x \log x - x$
- $\int \tan^{-1} x dx = \int (x)' \tan^{-1} x dx = x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2)$

なお、 $1+x^2 > 0$ なので $\log|1+x^2| = \log(1+x^2)$ である。

- $\int \sin^{-1} x dx = \int (x)' \sin^{-1} x dx = x \sin^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$

後半は $u = 1 - x^2$ といて置換積分を適用すればよい。 $\frac{du}{dx} = -2x$ なので $x = -\frac{1}{2} \frac{du}{dx}$ である。

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{2} \cdot 2u^{\frac{1}{2}} = -\sqrt{1-x^2}$$

あるいは、 $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (1-x^2)' = \left(-\sqrt{1-x^2}\right)'$ とみなせればはよい。

- $\int e^x \sin x dx$

$$\begin{aligned} \int e^x \sin x dx &= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \left(e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) dx \right) \\ &= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx \end{aligned}$$

より移項して、 $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$ を得る。

1.3 積分計算で悩んだら

積分の計算テクニックはそんなに多くない。迷ったらとりあえず以下を試してみよう。

- 基礎中の基礎の公式を見逃していないか

例えば、以下は基礎中の基礎の公式に含まれているが、見逃す人が少なくない。

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x$$

まずは基礎中の基礎の公式を思い出そう。

- 部分積分はできないか

求めたい積分が

$$\int f(x)g(x) dx$$

という形ならまずは部分積分を試そう。 $F'(x) = f(x)$ となる $F(x)$ か $G'(x) = g(x)$ となる $G(x)$ がすぐに分かれば

$$\int f(x)g(x) dx = F(x)g(x) - \int F(x)g'(x) dx$$

あるいは

$$\int f(x)g(x) dx = f(x)G(x) - \int f'(x)G(x) dx$$

と変形できる。 $F(x)$ も $G(x)$ もすぐに見つかった場合は、両方やってみて右辺に残った積分が求められそうな方を採用すればよい。どちらも見つからない場合や、見つかったとしても右辺に残った積分が難しい場合には別の方法を考える。

- 置換積分はできないか

結局のところ、うまい置換積分を見つけられるかどうかにかかっていることが多い。失敗を恐れず、とにかくいろいろと試行錯誤してみよう。

- その他

分数関数や無理関数などは別途特殊なテクニックがあったり、自分で思いつくのが困難な置換積分も多々あるが、結局は上記のどれかに帰着される場合が多い。また例えば、部分積分をして右辺に残った積分の計算に置換積分を用いるなど複数のテクニックを用いることも多い。

1.4 練習問題

次の不定積分を求めよう．(答えは次のページ)

$$(1) \int (3x^2 + 5x - 3) dx \qquad (2) \int (8x + 2)^3 dx \qquad (3) \int \frac{dx}{2x + 1}$$

$$(4) \int \frac{dx}{(2x + 3)^3} \qquad (5) \int \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^3} \right) dx \qquad (6) \int \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[5]{x^3}} dx$$

$$(7) \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx \qquad (8) \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \qquad (9) \int \cos^2 x dx$$

$$(10) \int \sin^2 x dx \qquad (11) \int \frac{dx}{\cos^2 x} \qquad (12) \int \tan^2 x dx$$

$$(13) \int \frac{dx}{x^2 + 4} \qquad (14) \int \frac{dx}{\sqrt{2 - x^2}} \qquad (15) \int 2^x dx$$

$$(16) \int \left(\frac{1}{3} \right)^x dx \qquad (17) \int \log_2 x dx \qquad (18) \int x \log x dx$$

$$(19) \int \frac{dx}{\tan x} \qquad (20) \int \cos^{-1} x dx \qquad (21) \int \frac{x}{x^2 + 2} dx$$

$$(22) \int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx \qquad (23) \int \sin^{-1} \frac{x}{2} dx \qquad (24) \int \tan^{-1}(2x - 1) dx$$

$$(25) \int x^2 \cos x dx \qquad (26) \int e^x \cos x dx \qquad (27) \int x e^{-x^2} dx$$

$$(28) \int \log(x^2) dx \qquad (29) \int \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 5}} dx \qquad (30) \int x^2 \sqrt{1 + 2x^3} dx$$

解答

積分定数は省略する.

$$(1) \ x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 3x$$

$$(2) \ \frac{1}{32}(8x+2)^4$$

$$(3) \ \frac{1}{2}\log|2x+1|$$

$$(4) \ -\frac{1}{4}(2x+3)^{-2}$$

$$(5) \ 2\log|x| + x^{-2}$$

$$(6) \ \frac{15}{16}x^{\frac{16}{15}}$$

$$(7) \ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$$

$$(8) \ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x$$

$$(9) \ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$$

$$(10) \ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x$$

$$(11) \ \tan x$$

$$(12) \ \tan x - x$$

$$(13) \ \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}$$

$$(14) \ \sin^{-1}\frac{x}{\sqrt{2}}$$

$$(15) \ \frac{2^x}{\log 2}$$

$$(16) \ -\frac{3^{-x}}{\log 3}$$

$$(17) \ \frac{x\log x - x}{\log 2}$$

$$(18) \ \frac{1}{2}x^2\log x - \frac{1}{4}x^2$$

$$(19) \ \log|\sin x|$$

$$(20) \ x\cos^{-1}x - \sqrt{1-x^2}$$

$$(21) \ \frac{1}{2}\log(x^2+2)$$

$$(22) \ \sqrt{1+x^2}$$

$$(23) \ x\sin^{-1}\frac{x}{2} + \sqrt{4-x^2}$$

$$(24) \ \frac{1}{2}(2x-1)\tan^{-1}(2x-1) - \frac{1}{4}\log(2x^2-2x+1)$$

$$(25) \ x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$$

$$(26) \ \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x)$$

$$(27) \ -\frac{1}{2}e^{-x^2}$$

$$(28) \ 2(x\log x - x)$$

$$(29) \ \frac{1}{3}(x^2-10)\sqrt{x^2+5}$$

$$(30) \ \frac{1}{9}(1+2x^3)^{\frac{3}{2}}$$

1.5 (おまけ) 不定積分と微分方程式

定積分を計算する過程で生じる不定積分計算において積分定数を省略しても大きな問題は起こらないが、微分方程式を解く過程での不定積分計算においては積分定数は明示しておいた方がよい。

与えられた関数 f の不定積分を求めることは、最も基本的な微分方程式

$$F'(x) = f(x)$$

の一般解 F を求めることに相当する。例えば、微分方程式

$$F'(x) = x^2$$

の一般解は任意の定数 C を用いて

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$$

と表せる。これはまさに以下の不定積分の計算そのものであり、この定数 C が積分定数と呼ばれる。

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

これにさらに初期条件として、例えば $F(1) = 1$ などが加わると、

$$1 = F(1) = \frac{1}{3} + C = 1$$

から定数 C が決定し、解が以下のようにただ 1 つに定まる。

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{3}$$

別の例を見てみよう。重力加速度 g のもとで鉛直方向に自由落下をする質量 m の物体の時刻 t における位置 $x(t)$ は、以下の微分方程式を満たすことが知られている。

$$mx''(t) = -mg$$

いわゆる、Newton の運動方程式である。この両辺を m で割って t で積分して

$$x'(t) = -gt + C_1$$

が得られる。 C_1 は積分定数である。さらに、両辺をもう一度 t で積分して

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$$

が得られる。 C_2 は積分定数である。これに初期位置や初速を指定する初期条件

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0$$

などが加わることで定数 C_1, C_2 が決定し、以下のように $x(t)$ が唯一つに定まる。

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0$$

さらに別の例を紹介する．与えられた 1 変数関数 f, g に対して，変数 x に関する未知の関数 y を含む

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

という形の微分方程式は変数分離形と呼ばれる． $g(y) \neq 0$ のとき，両辺を $g(y)$ で割って

$$\frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} = f(x)$$

と変形できる．この式の両辺を x で積分して

$$\int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx$$

を得る．ここで，置換積分により

$$\int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} dx = \int \frac{dy}{g(y)}$$

であるから，最終的に以下を得る．

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

これにより， $f, 1/g$ の不定積分が求められればそこから y と x の明示的な関係がわかる．

注意． この一連の操作は，もとの微分方程式を形式的に

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

と変形してから両辺に \int を付け加えることで以下を導くこともできる．

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

微分方程式の書籍等では（置換積分による説明を省いて）このように形式的に説明されることも多い．

変数分離形の最も簡単な例として， $f(x) = x, g(y) = y$ の場合を見てみよう．つまり，

$$\frac{dy}{dx} = xy$$

を解こう．まず，定数関数 $y = 0$ は明らかに上の微分方程式を満たすので， $y = 0$ は解の 1 つである．それ以外の解を求めよう．つまり $y \neq 0$ を仮定しているので，上の微分方程式を

$$\frac{dy}{y} = xdx$$

と変形できる．この両辺を積分して

$$\log |y| = \int \frac{dy}{y} = \int xdx = \frac{x^2}{2} + c$$

が得られる．ここで， c は積分定数である．これより

$$|y| = e^{\frac{x^2}{2} + c} = e^c \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$

なので

$$y = \pm e^c \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$$

である． $C = \pm e^c$ において

$$y = Ce^{\frac{x^2}{2}}$$

を得る．ここで， c が任意の実数を動くとき， C は 0 以外の任意の実数を取り得る．また，上式で $C = 0$ のときは定数関数 $y = 0$ を表している．よって，もとの微分方程式の解は，定数関数 $y = 0$ も含めて以下のよう表せる．

$$y = Ce^{\frac{x^2}{2}} \quad (C \in \mathbb{R})$$

これにさらに初期条件として，例えば $y(0) = 1$ などが加わると，

$$1 = y(0) = C$$

から定数 C が決定し，解が以下のようにただ 1 つに定まる．

$$y = e^{\frac{x^2}{2}}$$

2 積分とは

関数 f の閉区間 $[a, b]$ 上の積分 $\int_a^b f(x) dx$ は、 $F' = f$ となる関数 F を見つけて

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

という計算によって求めることになる。こうして得られる値が何なのかを定義する。

2.1 Riemann 和

f を有界閉区間 $[a, b]$ で定義された関数とする。区間 $[a, b]$ を n 個に分割する。つまり、 $[a, b]$ から端点を含めて $(n+1)$ 個の点を選ぶ。

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

この $(n+1)$ 個の実数の組 $\Delta = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ を区間 $[a, b]$ の**分割**と呼ぶ。各小区間から代表点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) を選ぶ。このとき、

$$R(\Delta, \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}, f) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

を分割 Δ と代表点集合 $\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ に関する関数 f の **Riemann 和**という。

ここで定義した Riemann 和は図 1 のように、横の長さが $x_i - x_{i-1}$ で、縦の長さが $f(\xi_i)$ の細長い長方形たちの面積を足し合わせたものであり、 $y = f(x)$ のグラフと x 軸と直線 $x = a$ と $x = b$ で囲まれた図形の面積を近似している。ただし、 $f(\xi_i) < 0$ なら $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) < 0$ なので、 x 軸より下にある部分の Riemann 和は負の値である。つまり、Riemann 和は**符号付き面積**を近似している。




図 1 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ は各長方形の（符号付き）面積の和に相当する。


簡単な Riemann 和を実際に計算してみよう。

例 2.1. $f(x) = x^2$ とする. $\Delta = (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$ を閉区間 $[0, 4]$ の 4 等分割とし, 各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ の中点を ξ_i とする. つまり,

$$\Delta = (x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1, 2, 3, 4), \quad \xi_1 = \frac{1}{2}, \xi_2 = \frac{3}{2}, \xi_3 = \frac{5}{2}, \xi_4 = \frac{7}{2}$$

とする. これらに関する f の Riemann 和 $R(\Delta, \{\xi_i\}, f)$ を実際に計算してみよう.

$$\begin{aligned} R(\Delta, \{\xi_i\}, f) &= f(\xi_1)(x_1 - x_0) + f(\xi_2)(x_2 - x_1) + f(\xi_3)(x_3 - x_2) + f(\xi_4)(x_4 - x_3) \\ &= f\left(\frac{1}{2}\right)(1 - 0) + f\left(\frac{3}{2}\right)(2 - 1) + f\left(\frac{5}{2}\right)(3 - 2) + f\left(\frac{7}{2}\right)(4 - 3) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{9}{4} + \frac{25}{4} + \frac{49}{4} = 21 \end{aligned}$$



これは積分 $\int_0^4 x^2 dx$ を近似している. 実際, 後で確認するが $\int_0^4 x^2 dx = \frac{64}{3} = 21.333\ldots$ である.

2.2 積分の定義

f を有界閉区間 $[a, b]$ で有界な関数とする. $[a, b]$ の分割 $\Delta = (x_0, \dots, x_n)$ に対し,

$$|\Delta| := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$$

とする. ここで, \max は最大値を意味する. すなわち, $x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_n - x_{n-1}$ の中で最も大きな値が $|\Delta|$ である. $|\Delta| \rightarrow 0$ のとき, 分割の仕方と代表点集合 $\{\xi_i\}$ の選び方によらず Riemann 和 $R(\Delta, \{\xi_i\}, f)$ が一定の値に収束するならば, f は $[a, b]$ で **(Riemann) 積分可能**, または **(Riemann) 可積分**であるといひ, その極限値を

$$\int_a^b f(x) dx$$

で表し, 区間 $[a, b]$ における f の**積分**という. つまり,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

である. ここまでは $a < b$ の場合しか想定していないが, $a \geq b$ の場合も含めて以下を約束しておく.

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (2.1)$$

与えられた関数が積分可能であるかどうかを調べるのは容易ではないが, 有界閉区間上の連続関数は積分可能であることが知られている.

定理 2.2. 有界閉区間 $[a, b]$ 上連続な関数は $[a, b]$ で積分可能である.

つまり, 積分したい区間で f が連続なら積分できるかどうかは心配する必要がなく, 「どうやって計算するか」のみ考をえればよい.

積分の定義から, 以下の定理が成り立つ.

定理 2.3. f の積分可能な範囲内にある任意の a, b, c に対して以下が成り立つ.

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx \quad (2.2)$$

定理 2.4. f, g が区間 $[a, b]$ で積分可能かつ $f(x) \leq g(x)$ なら $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ である.

一般に, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ なので定理 2.4 から以下が成り立つ.

$$- \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

これにより, 以下の定理が得られる.

定理 2.5. f が $[a, b]$ で積分可能なら $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ である.

2.3 微分積分学の基本定理

積分値を定義に基づいて求めるのは大体困難であり、実際には微分積分学の基本定理を使って計算する。

定理 2.6 (微分積分学の基本定理). 有界閉区間 $[a, b]$ 上の連続関数 f に対して次が成り立つ。

(1) 関数 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ は閉区間 $[a, b]$ で定義され、开区間 (a, b) で以下が成り立つ。

$$G'(x) = f(x)$$

つまり、 G は f の原始関数である。

(2) f の任意の原始関数 F に対して (つまり、 $F' = f$ となる任意の F に対して) 以下が成り立つ。

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

注意. この定理の (1) は、微分と積分という操作が互いに逆であることを示している。これがあるから「微分学」と「積分学」がまとめて「微分積分学」と呼ばれている。また、(2) は微分の逆操作によって実際に積分の値が計算できることを示している。この定理は微分積分学においてもっとも重要であり、だからこそ「基本定理」と呼ばれている。

$F(b) - F(a)$ を $\left[F(x)\right]_a^b$ と書くことが便利である。これによって積分の計算は

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a) = \dots$$

という形で書かれることが多い。

例えば、 $\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^3$, $(e^x)' = e^x$ なので微分積分学の基本定理 (2) から

$$\int_0^4 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4 = \frac{4^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{64}{3}, \quad \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

などと積分の計算が容易に行える。とにかく、 $F' = f$ となる F さえ見つければ積分は容易に計算できる。

また、 $F' = f$ となる F はどれを選んでもよい。例えば、 $(\log x)' = (\log(2x))' = \frac{1}{x}$ なので

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = \left[\log x\right]_1^2 = \log 2 - \log 1 = \log 2 \quad (F(x) = \log x)$$

と計算しても

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = \left[\log(2x)\right]_1^2 = \log 4 - \log 2 = \log \frac{4}{2} = \log 2 \quad (F(x) = \log(2x))$$

と計算してもよい。ちなみに、 $\log(2x) = \log x + \log 2$ なので、 $\log x$ と $\log(2x)$ との差は定数 $\log 2$ である。

2.4 定積分における部分積分と置換積分

微分積分学の基本定理により、定積分 $\int_a^b f(x) dx$ の計算の大部分は実質不定積分 $\int f(x) dx$ の計算である。そこに部分積分や置換積分を適用する場合には積分範囲も含めて計算すればよい。

定積分で部分積分を適用する場合は、以下のように計算すればよい。

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

例 2.7. (1) $\int_0^1 xe^x dx = \left[xe^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - 0 - \left[e^x \right]_0^1 = e - (e - 1) = 1$

(2) $\int_1^2 x \log x dx = \left[\frac{x^2}{2} \log x \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x}{2} dx = 2 \log 2 - 0 - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^2 = 2 \log 2 - \left(1 - \frac{1}{4} \right) = 2 \log 2 - \frac{3}{4}$

注意. 先に不定積分を計算しきってもよい。例えば、上の (1) で $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x$ と不定積分を求めてしまってから以下のように計算してもよい。

$$\int_0^1 xe^x dx = \left[xe^x - e^x \right]_0^1 = (e - e) - (0 - 1) = 1$$

これでももちろんよいが、 \int が外れたところから代入計算をした方が早く結論に辿りつきやすい。

定積分において、 $u = g(x)$ として置換積分を適用する場合には、積分範囲も u の動く範囲に変換する。

$$\int_a^b f(g(x)) \frac{du}{dx} dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(u) du \quad \left[\begin{array}{c|c} x & a \rightarrow b \\ u & \alpha \rightarrow \beta \end{array} \right]$$

例 2.8. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$

$u = 1 + \sin x$ とおくと $\frac{du}{dx} = \cos x$ であり、積分範囲は $\frac{x}{u} \left| \begin{array}{c|c} 0 & \rightarrow \pi/2 \\ 1 & \rightarrow 2 \end{array} \right.$ と変換される。

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{u} \frac{du}{dx} dx = \int_1^2 \frac{du}{u} = \left[\log u \right]_1^2 = \log 2$$

注意. 上の例で、先に不定積分を $\int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \int \frac{du}{u} = \log |u| = \log |1 + \sin x|$ と計算しきってから

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx = \left[\log |1 + \sin x| \right]_0^{\pi/2} = \log 2 - \log 1 = \log 2$$

と計算してももちろんよいが、積分範囲も変換しながら計算すれば、不定積分を計算しきる必要がなくなる。

具体的な積分計算は以下のリンク先の「積分基本問題集 壱」(1) ~ (26) で練習してください。

<https://github.com/kazutsumi/Integral1/blob/main/integral1.pdf>

(表紙に QR コードがあります)

2.5 微分積分学の基本定理の証明

微分積分学の基本定理（定理 2.6）は微分積分学において最も重要な定理なのでその証明を書いておく．興味があれば読み飛ばしてもよい．なお，基本的に教科書と同じ証明である．

微分積分学の基本定理. 有界閉区間 $[a, b]$ 上の連続関数 f に対して次が成り立つ．

(1) 関数 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ は閉区間 $[a, b]$ で定義され，开区間 (a, b) で以下が成り立つ．

$$G'(x) = f(x)$$

(2) f の任意の原始関数 F に対して以下が成り立つ．

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

まず，(1) を認めてしまえば以下の補題 2.9 から (2) は容易に示せる．

補題 2.9. F, G を有界閉区間 $[a, b]$ 上の連続関数 f の原始関数とする．このとき， $F(x) = G(x) + C$ となる定数 C が存在する．

証明. $H(x) = F(x) - G(x)$ とする． $H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$ なので， H は $[a, b]$ 上の定数関数である．実際，平均値の定理から任意の $x_1, x_2 \in [a, b]$ ($x_1 < x_2$) に対して

$$\frac{H(x_2) - H(x_1)}{x_2 - x_1} = H'(c), \quad x_1 < c < x_2$$

となる実数 c が存在するが， $H'(c) = 0$ なので $H(x_1) = H(x_2)$ より H は定数関数である．よって， $H(x) = F(x) - G(x) = C$ となる定数 C が存在する．これより， $F(x) = G(x) + C$ である． \square

微分積分学の基本定理 (2) の証明. (1) から $G(x)$ は f の原始関数なので，補題 2.9 から $F(x) = G(x) + C$ を満たす定数 C が存在する．また， $\int_a^a f(t) dt = 0$ と約束しているので

$$F(b) - F(a) = (G(b) + C) - (G(a) + C) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

である．なお，変数に使う文字によって積分値は変わらないので $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$ である． \square

次に、定理 2.3 と以下の補題 2.10 から微分積分学の基本定理 (1) を証明する。

補題 2.10 (積分の平均値の定理). 有界閉区間 $[a, b]$ 上の連続関数 f に対し、以下を満たす実数 c が存在する。

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), \quad a < c < b$$

証明. f が定数関数なら明らかなので、 f は定数関数でないとする。 f は閉区間 $[a, b]$ で連続なので最小値 m と最大値 M が存在する。それらを実現する値をそれぞれ $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ とする。つまり、 $f(x_{\min}) = m, f(x_{\max}) = M$ である。 f は定数関数でないので $x_{\min} \neq x_{\max}$ である。定理 2.4 より

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

が成り立つ。これより

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

である。よって、中間値の定理から

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(c), \quad x_{\min} < c < x_{\max} \text{ または } x_{\max} < c < x_{\min}$$

を満たす実数 c が存在する。従って、

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

である。ここで、 $x_{\min}, x_{\max} \in [a, b]$ なので $a < c < b$ である。 □

微分積分学の定理 (1) の証明. $x \in (a, b)$ とする。定理 2.3 と約束 (2.1) から

$$\begin{aligned} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) \stackrel{(2.1)}{=} \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt \right) \\ &\stackrel{\text{定理 2.3}}{=} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

である。さらに、補題 2.10 から

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)h$$

を満たす実数 c が x と $x+h$ の間に存在するので

$$\frac{G(x+h) - G(x)}{h} = f(c)$$

である。 $h \rightarrow 0$ のとき $c \rightarrow x$ であり、 f は連続なので

$$G'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{c \rightarrow x} f(c) = f(x)$$

である。つまり、 G は開区間 (a, b) で微分可能で $G'(x) = f(x)$ である。 □

2.6 (おまけ) Riemann 和の極限としての積分

有界閉区間上の連続関数の積分の値を Riemann 和の極限としていくつか計算する.

例 2.11. $\int_0^4 x^2 dx$

$\Delta_n = (x_0, \dots, x_n)$ を閉区間 $[0, 4]$ の n 等分割, 各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ の中点を代表点 ξ_i とする. つまり,

$$x_i = \frac{4i}{n} \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad \xi_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2} = \frac{2(2i-1)}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

とする. これらに関する $f(x) = x^2$ の Riemann 和を S_n とする. これは図 2 の灰色部分の面積に等しい. $n \rightarrow \infty$ のとき, $|\Delta_n| \rightarrow 0$ だから定理 2.2 より S_n は収束し, その極限値が求める積分値である.




図 2

Riemann 和 S_n を具体的に計算する. Δ_n は区間 $[0, 4]$ の n 等分割なので, 各 i で $x_i - x_{i-1} = \frac{4}{n}$ である.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2(2i-1)}{n} \right)^2 \cdot \frac{4}{n} = \frac{16}{n^3} \sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = \frac{16}{n^3} \sum_{i=1}^n (4i^2 - 4i + 1) \\ &= \frac{16}{n^3} \left(4 \sum_{i=1}^n i^2 - 4 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1 \right) = \frac{16}{n^3} \left(4 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n \right) \\ &= 16 \left(\frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) - \frac{2}{n} \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n^2} \right) \rightarrow \frac{64}{3} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

これより, $\int_0^4 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{64}{3}$ である.

例 2.12. $\int_0^1 e^x dx$

$\Delta_n = (x_0, \dots, x_n)$ を閉区間 $[0, 1]$ の n 等分割, 各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ の右端 x_i を代表点 ξ_i とする. つまり,

$$x_i = \xi_i = \frac{i}{n}$$

とする. これらに関する $f(x) = e^x$ の Riemann 和を S_n とする. これは図 3 の灰色部分の面積に等しい. $n \rightarrow \infty$ のとき, $|\Delta_n| \rightarrow 0$ だから定理 2.2 より S_n は収束し, その極限值が求める積分値である.




図 3

Riemann 和 S_n を具体的に計算する. Δ_n は区間 $[0, 1]$ の n 等分割なので, 各 i で $x_i - x_{i-1} = \frac{1}{n}$ である.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n e^{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} + \left(e^{\frac{1}{n}} \right)^2 + \left(e^{\frac{1}{n}} \right)^3 + \dots + \left(e^{\frac{1}{n}} \right)^n \right) \quad \left(\text{公比 } e^{\frac{1}{n}} \text{ の等比級数} \right) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{e^{\frac{1}{n}} \left(1 - \left(e^{\frac{1}{n}} \right)^n \right)}{1 - e^{\frac{1}{n}}} = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n} \cdot \frac{e - 1}{e^{\frac{1}{n}} - 1} \end{aligned}$$

ここで, $t = e^{\frac{1}{n}} - 1$ とおく. これにより $\frac{1}{n} = \log(1+t)$ なので,

$$S_n = \frac{\log(1+t)}{t} \cdot (e-1)(t+1) = (e-1)(t+1) \log(1+t)^{\frac{1}{t}}$$

と変形できる. $n \rightarrow \infty$ のとき $t \rightarrow +0$ なので, $\lim_{t \rightarrow +0} \log(1+t)^{\frac{1}{t}} = 1$ と合わせて以下を得る.

$$\int_0^1 e^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = (e-1) \lim_{t \rightarrow +0} (t+1) \log(1+t)^{\frac{1}{t}} = e-1$$

定数関数 $f(x) = C$ は連続関数だが，定理 2.2 に頼ることなく直接積分を計算できる．

例 2.13. $\int_a^b C \, dx$

$\Delta = (x_0, \dots, x_n)$ を閉区間 $[a, b]$ の任意の分割とし，各小区間の $[x_{i-1}, x_i]$ の代表点 ξ_i を任意に選ぶ．これらに関する $f(x) = C$ の Riemann 和は

$$\begin{aligned} R(\Delta, \{\xi_i\}, f) &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n C(x_i - x_{i-1}) \\ &= C\left((x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \cdots + (x_n - x_{n-1})\right) = C(x_n - x_0) = C(b - a) \end{aligned}$$

である．よって，分割の仕方と代表点の選び方によらず Riemann 和は一定なので，特に $|\Delta| \rightarrow 0$ における極限值もその一定の値に等しい．よって， $\int_a^b C \, dx = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} R(\Delta, \{\xi_i\}, f) = C(b - a)$ である．