

CHAPTER 02

模擬考卷・答題卷

Mock Exam • Blank Sheet

2026 年版・第一版

AI-ASSISTED

病理科模擬考卷(最新兩次考題 50 題)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生・題目取自官方公告;詳解與註解為 AI 整理・
請對照標準教科書使用

範圍:114 年第 2 次(25 題)+ 115 年第 1 次(25 題) **時間:**60 分鐘(每題 72 秒) **配分:**每題 2 分,總分 100 分
及格:60 分 **目標:**≥ 70 分

答題說明:請於每題前圈選 A/B/C/D。完成後對照「詳解版」核對。

Part 1 — 114 年第 2 次(25 題)

Q1(題號 76)

下列何者於顯微鏡檢死亡之細胞時,通常會呈現「強烈嗜酸性的紅色細胞質,模糊或微紅色之細胞核」等特徵?

- (A) liquefactive necrosis
- (B) caseous necrosis
- (C) fibrinoid necrosis
- (D) coagulative necrosis

Q2(題號 77)

下列何者出現時,表示細胞已經進入不可逆的損傷(irreversible damage)?

- (A) leakage of mitochondrial proteins
- (B) endoplasmic reticulum dilation
- (C) rapid glycogen depletion
- (D) endoplasmic reticulum ribosomes detachment

Q3(題號 78)

有關馬凡氏症候群(Marfan syndrome)的描述,下列何者正確?

- (A) 膠原蛋白(collagen)異常所引起的疾病
- (B) 體染色體隱性遺傳疾病
- (C) 身材矮小
- (D) 主動脈根部擴大

Q4(題號 79)

天皰瘡(pemphigus vulgaris)的致病機轉與下列何者最有關係?

- (A) 第一型過敏反應
- (B) 第二型過敏反應
- (C) 第三型過敏反應
- (D) 第四型過敏反應

Q5 (題號 80)

慢性一氧化碳中毒主要造成中樞神經何處缺氧？

- (A) 大腦半球(cerebral hemisphere)
- (B) 小腦(cerebellum)
- (C) 基底核(basal ganglia)
- (D) 胼胝體(corpus callosum)

Q6 (題號 81)

用以判斷腫瘤為惡性的特徵，下列何者最不可靠？

- (A) 生長快速
- (B) 分化不良
- (C) 不典型有絲分裂
- (D) 遠端轉移

Q7 (題號 82)

先天性心臟病中，長期處於下列何種狀況最容易造成肺高壓？

- (A) 明顯的心室中隔缺損(ventricular septal defect)
- (B) 典型的 Fallot氏四合症(classic tetralogy of Fallot)
- (C) 成人型導管後主動脈狹窄(adult form postductal coarctation of aorta)
- (D) 單獨的肺動脈瓣狹窄(isolated pulmonary stenosis)

Q8 (題號 83)

下列會造成凝血功能異常的狀況，何者主要不是由於血小板功能的缺失？

- (A) von Willebrand 氏病
- (B) 尿毒症(uremia)
- (C) 血友病(hemophilia)
- (D) 使用阿斯匹靈(aspirin)藥物

Q9 (題號 84)

下列何種惡性淋巴瘤，在組織切片中腫瘤細胞通常只占所有細胞的小部分？

- (A) 瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(DLBCL)
- (B) 退行性大細胞淋巴瘤(ALCL)
- (C) 何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)

- (D) Burkitt 氏淋巴瘤

Q10(題號 85)

下列何種貧血，骨髓中的造血細胞量(cellularity)最可能比正常少？

- (A) 缺鐵性貧血
- (B) 巨母紅血球性貧血
- (C) 地中海型貧血
- (D) 再生不良性貧血

Q11(題號 86)

下列有關鼻咽癌的敘述，何者錯誤？

- (A) 與高風險 HPV 有關
- (B) 臺灣與中國東南方的盛行率高於美國及歐洲
- (C) 形態學上主要分為角化、非角化或類基底鱗狀細胞癌
- (D) 頸部腫塊、聽力障礙或閉塞感、痰中或鼻涕中帶血、鼻塞、頭痛是常見症狀

Q12(題號 87)

下列有關小細胞肺癌(small cell carcinoma)的敘述，何者錯誤？

- (A) 與抽菸有強烈相關性
- (B) 在臺灣，小細胞肺癌有三成帶有 EGFR 突變
- (C) 大多數小細胞肺癌帶有 TP53 與 RB 基因突變
- (D) 小細胞肺癌也會有副贅瘤症候群

Q13(題號 88)

下列有關塵肺病(pneumoconiosis)的敘述，何者錯誤？

- (A) 成因可為無機物或有機物，多與職業或工作環境有關
- (B) 矽肺病是目前最常見的塵肺病，肺結節多出現在上肺葉
- (C) 矽肺病患者停止接觸矽塵暴露後肺功能通常會逐漸恢復
- (D) 矽肺病的肺結節常出現嚴重纖維化且有 whorled collagen fibers

Q14(題號 89)

下列有關口腔癌的敘述，何者錯誤？

- (A) 白斑與紅斑是可觀察到的早期病變
- (B) 紅斑大多數是嚴重異生或原位癌
- (C) 口腔癌最常突變的基因有 TP53、CDKN2A、PIK3CA，目前已有多種有效的標靶藥物
- (D) 口腔癌的危險因子包含抽菸、喝酒、檳榔

Q15(題號 90)

關於 HNF1 α 失活的肝細胞腺瘤，下列敘述何者最不適當？

- (A) 與成熟型青少年糖尿病 3 型(MODY-3)相關
- (B) 好發於女性
- (C) 轉化為肝細胞癌的風險極小
- (D) IHC 下腫瘤細胞的 LFABP 會高度表達

Q16(題號 91)

關於急性膽囊炎，下列敘述何者最不適當？

- (A) 大多數的病例是由於結石阻塞膽囊頸或膽囊管而引發
- (B) 因前列腺素釋放的減少而導致黏膜和膽囊壁發炎
- (C) 急性非結石性膽囊炎可由缺血而引起
- (D) 急性非結石性膽囊炎的危險因子包括敗血症

Q17(題號 92)

腎嗜酸細胞瘤(renal oncocytoma)在電子顯微鏡下觀察，腫瘤細胞含大量何種結構，而造成染色成嗜酸性？

- (A) 粒線體
- (B) 高基氏體
- (C) 溶酶體
- (D) 粗糙內質網

Q18(題號 93)

黃瘤肉芽腫性腎盂腎炎與下列何種細菌感染最為密切？

- (A) *Streptococcus pneumoniae*
- (B) *Mycobacterium tuberculosis*
- (C) *Proteus mirabilis*
- (D) *Salmonella enterica*

Q19(題號 94)

下列何者為腎細胞癌最顯著之危險因子？

- (A) 抽菸
- (B) 高血壓
- (C) 石棉之暴露
- (D) 肥胖之男性

Q20(題號 95)

與放射線治療最相關的乳房惡性腫瘤為：

- (A) 血管肉瘤
- (B) 惡性葉狀瘤

- (C) 肌纖維母細胞瘤
- (D) 平滑肌肉瘤

Q21(題號 96)

下列何種乳房病變，發生侵襲性乳癌的風險最高？

- (A) 非典型小葉增生
- (B) 硬化性腺病
- (C) 複雜性硬化病變
- (D) 複雜性纖維腺瘤

Q22(題號 97)

62 歲女性，子宮頸抹片檢查後，接受子宮頸病理切片。下列何者為最適合的診斷？(圖示題：高度異生變化)

- (A) 高度鱗狀上皮內病灶 (HSIL)
- (B) 鱗狀上皮癌
- (C) 原位腺癌
- (D) 低度鱗狀上皮內病灶 (LSIL)

Q23(題號 98)

有關骨骼疾病的病理機轉，下列那一組合與蝕骨細胞 (osteoclasts) 活性異常較有關係？①osteopetrosis ②senile osteoporosis ③post-menopausal osteoporosis ④osteomalacia ⑤Paget disease

- (A) ①②④
- (B) ①③⑤
- (C) ②③⑤
- (D) ③④⑤

Q24(題號 99)

下列皮膚病變皆可能與感染有關，何者在皮膚病灶處最有可能培養出致病微生物？

- (A) erythema multiforme
- (B) erythema induratum
- (C) erythema nodosum
- (D) erythema migrans

Q25(題號 100)

關於感染性關節炎，下列敘述何者最不適當？

- (A) 兩歲以下幼兒最常見的化膿性關節炎病原體是沙門氏桿菌
- (B) 成年人的化膿性關節炎最常見之病原體是金黃色葡萄球菌
- (C) 結核病關節炎最常感染承重的關節，如髖關節與膝關節
- (D) 淋病關節炎好發於補體 C5-C9 功能缺損的病人

Part 2 — 115 年第 1 次(25 題)

Q26(題號 76)

下列何種磷脂質於細胞凋亡後，會由細胞膜的內層翻轉出來到細胞膜的外層，被巨噬細胞識別以進行吞噬作用？

- (A) phosphatidylcholine
- (B) phosphatidylserine
- (C) sphingomyelin
- (D) glycolipid

Q27(題號 77)

下列那一路徑之活化，被認為是生理性肥大中最重要的機制？

- (A) PI3K/AKT 路徑
- (B) Bax/Bcl-2 路徑
- (C) EGFR/RAS/RAF 路徑
- (D) Wnt/ β -catenin 路徑

Q28(題號 78)

有關病毒感染與疾病的關係，下列何者錯誤？

- (A) human papillomavirus 與毛樣白斑病(hairy leukoplakia)
- (B) human herpesvirus 8 與原發性體液淋巴瘤(PEL)
- (C) Epstein-Barr virus 與淋巴結外鼻腔型 NK/T 細胞淋巴瘤
- (D) JC polyomavirus 與進行性多灶性白質腦病(PML)

Q29(題號 79)

腎臟移植後腎臟切片發現腎臟間質、腎小管上皮細胞間與血管內皮有淋巴細胞浸潤，有小血管壁出現壞死現象，未出現間質纖維化與腎小管萎縮，螢光染色未發現有抗體或 C4d 補體沉積。最可能的診斷？

- (A) 慢性排斥
- (B) 超急性排斥
- (C) 急性細胞排斥
- (D) 急性抗體媒介排斥

Q30(題號 80)

癩皮病(pellagra)最主要是缺乏何種營養因子？

- (A) vitamin B1(thiamine)
- (B) vitamin B2(riboflavin)
- (C) niacin
- (D) vitamin B6(pyridoxine)

Q31(題號 81)

60 歲男性突然發生心肌梗塞，於心肌梗塞發生後三小時死亡，解剖時肉眼檢查心臟最可能會看到什麼？

- (A) 看不出變化
- (B) 梗塞區域的心肌較為暗紅色，質地較軟
- (C) 梗塞區域呈現黃色，質地較軟
- (D) 邊界清楚的凹陷區域，質地較硬

Q32(題號 82)

下列造成水腫的原因中，何者的主要致病機轉與血中的滲透壓下降最無相關？

- (A) 肝硬化
- (B) 腎病症候群
- (C) 營養不良
- (D) 鬱血性心衰竭

Q33(題號 83)

關於巨細胞動脈炎(giant cell arteritis)的臨床病理特徵，下列何者正確？

- (A) 主要影響頭部的血管
- (B) 冠狀動脈出現動脈瘤是此疾病常見的併發症
- (C) 嗜伊紅性白血球出現在發炎的血管是此疾病的重要病理表現
- (D) 此疾病多出現在 35 歲以前的年輕人，可能會造成視力減退

Q34(題號 84)

在缺鐵性貧血的病人，下列何者最可能高於正常值？

- (A) 血比容(hematocrit)
- (B) 紅血球的平均血紅素濃度(MCHC)
- (C) 血漿的總鐵結合力(TIBC)
- (D) 血清中的鐵蛋白(ferritin)

Q35(題號 85)

G6PD 缺乏症是何種遺傳？

- (A) 體染色體顯性
- (B) 體染色體隱性
- (C) 性聯顯性
- (D) 性聯隱性

Q36(題號 86)

關於乳糜瀉(ceeliac disease)，下列敘述何者最不適當？

- (A) 又稱麩質敏感腸病

- (B) 與 HLA-DQ2 或 HLA-DQ8 等位基因有關
- (C) 組織病理學特徵包含上皮內淋巴球增多
- (D) 最常發生的惡性腫瘤是腸病相關 B 細胞淋巴瘤

Q37(題號 87)

高惡性度漿液性卵巢癌(HGSC)最常突變的基因為：

- (A) TP53
- (B) KRAS
- (C) BRAF
- (D) ESR1

Q38(題號 88)

多重系統退化症(MSA)患者中，下列何種細胞最易見到 α -突觸核蛋白(α -synuclein)包涵體？

- (A) 星狀細胞(astrocyte)
- (B) 寡樹突細胞(oligodendrocyte)
- (C) 微膠細胞(microglia)
- (D) 血管內皮細胞

Q39(題號 89)

下列何者對於類風濕性關節炎發生機轉的重要性最為明確，且已有專一性拮抗劑用於治療？

- (A) rheumatoid factor
- (B) IL-2
- (C) IFN- α
- (D) TNF

Q40(題號 90)

下列有關肺高壓(pulmonary hypertension)的敘述，何者錯誤？

- (A) 左心衰竭可造成肺高壓
- (B) 間質性肺病可造成肺高壓
- (C) 從主肺動脈到小動脈都會受影響而出現 medial hypertrophy 及 intimal fibrosis
- (D) 小動脈的 plexiform lesion 為肺高壓早期出現的病理特徵

Q41(題號 91)

下列有關細菌性肺炎的敘述，何者錯誤？

- (A) 可造成支氣管肺炎或大葉性肺炎
- (B) 大葉性肺炎病理上變化依序可分為充血期、灰色肝變期、紅色肝變期、消解期
- (C) *S. pneumoniae*、*H. influenzae*、*Moraxella*、*S. aureus* 為常見社區型肺炎致病菌
- (D) *Pseudomonas aeruginosa* 常見於院內感染肺炎

Q42(題號 92)

支氣管擴張症與下列何項症狀相關性較低？

- (A) 膿痰
- (B) 重度持續咳嗽
- (C) 咳血
- (D) 過度換氣

Q43(題號 93)

關於自體免疫性肝炎，下列敘述何者最不適當？

- (A) 與 HLA 等位基因 DR3、DR4 及 DRB1 密切相關
- (B) 第 1 型典型特徵是 ANA 和 SMA 抗體
- (C) 第 2 型典型特徵是 anti-LKM-1 抗體
- (D) 血清 IgM 升高為自體免疫性肝炎之典型表現

Q44(題號 94)

關於潰瘍性結腸炎，下列敘述何者最不適當？

- (A) 發炎通常僅限於黏膜
- (B) 大多會涉及結腸與迴腸兩者的嚴重慢性發炎
- (C) 常有假性息肉
- (D) 可能會造成毒性巨結腸

Q45(題號 95)

下列何者為不依賴 ACTH (ACTH-independent) Cushing 氏症候群最常見的原因？

- (A) small cell carcinoma of the lung
- (B) adrenocortical adenoma
- (C) adrenocortical carcinoma
- (D) primary cortical hyperplasia

Q46(題號 96)

關於局部節段型腎絲球硬化症 (FSGS)，下列敘述何者正確？

- (A) 該疾病為造成小孩腎病症候群最常見的原因
- (B) 原發性 FSGS 腎絲球病變最先發生於近髓質腎絲球
- (C) 電子顯微鏡下的變化主要為大量免疫沉澱物堆積在膈細胞區域造成硬化
- (D) 一般而言，以類固醇治療 FSGS 的效果極佳

Q47(題號 97)

橋本氏甲狀腺炎病患較常出現下列那些自體免疫抗體？

- (A) antithyroglobulin antibody 和 antithyroid peroxidase antibody

- (B) antithyroglobulin antibody 和 anti-TSH receptor antibody
- (C) antinuclear antibody 和 antithyroid peroxidase antibody
- (D) antimitochondrial antibody 和 anti-TSH receptor antibody

Q48(題號 98)

與乳房乳突瘤(papilloma)的乳突比較,乳突狀原位癌(papillary DCIS)其乳突的病理特徵中,最有鑑別力者為:

- (A) 無肌上皮細胞
- (B) 缺乏纖維血管組織
- (C) 有出血現象
- (D) 有組織壞死

Q49(題號 99)

侵犯性乳癌,其腫瘤細胞之 ER、PR、HER2 表現,下列何種組合最為常見?

- (A) ER 陽性,PR 陽性,HER2 陰性
- (B) ER 陰性,PR 陰性,HER2 陽性
- (C) ER 陽性,PR 陽性,HER2 陽性
- (D) ER 陰性,PR 陰性,HER2 陰性

Q50(題號 100)

杜雷特氏出血(Duret hemorrhage)與下列何種腦部脫疝最有關係?

- (A) 大腦鎌下脫出(subfalcine herniation)
- (B) 扣帶脫出(cingulate herniation)
- (C) 經小腦天幕脫出(transtentorial herniation)
- (D) 小腦扁桃體脫出(tonsillar herniation)

答案速查(請先作答完再檢查)

自製答題卡(請印出後手填):

Q1 [] Q2 [] Q3 [] Q4 [] Q5 []
 Q6 [] Q7 [] Q8 [] Q9 [] Q10 []
 Q11 [] Q12 [] Q13 [] Q14 [] Q15 []
 Q16 [] Q17 [] Q18 [] Q19 [] Q20 []
 Q21 [] Q22 [] Q23 [] Q24 [] Q25 []
 Q26 [] Q27 [] Q28 [] Q29 [] Q30 []
 Q31 [] Q32 [] Q33 [] Q34 [] Q35 []
 Q36 [] Q37 [] Q38 [] Q39 [] Q40 []

Q41 ☐ Q42 ☐ Q43 ☐ Q44 ☐ Q45 ☐

Q46 ☐ Q47 ☐ Q48 ☐ Q49 ☐ Q50 ☐

請對照「詳解版」核對答案，並把錯題分類記錄到「錯題本」。