KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

KLINIKA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU

PREOPERATIVNA PRIPREMA

- Vodič za pacijente –

Autori:

dr. Belma Kadić

dr. Amila Feto

Sarajevo, 2024.

Uvod

- U sklopu pripreme za operativni zahvat, finalno, zeleno svjetlo za operaciju donosi anesteziolog.

- Anesteziolog je doktor medicine, specijalista koji je završio specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

- Njegova osnovna uloga posvećena je pacijentu, tj. Vama, da bezbolno i bezbjedno podnesete operaciju, da Vas pripremi za istu te da brine o Vama u postoperativnom periodu.

Upoznavanje

- Prvi susret pacijenta sa anesteziologom je tokom preoperativnog pregleda u anesteziološkoj ambulanti nakon što ste uradili sve potrebne preglede i laboratorijske nalaze.

- Važno je da iskreno odgovorite na pitanja o prijašnjim i sadašnjim bolestima, uzimanju lijekova, alergijama, navikama (pušenje, uzimanje alkohola, stimulativnih i opojnih sredstava).

- Anesteziolog ne postavlja ova pitanja kako bi Vas optužio nego da bi odabrao najbolji način anestezije za Vas i kako bi se što bolje pripremio za eventualne komplikacije koje su u vezi s Vašim zdravstvenim stanjem.

Pregled

- Vaš će anesteziolog pregledati svu medicinsku dokumentaciju, sve Vaše nalaze te dijagnostičke testove koje ste napravili. Trebali bi spomenuti i sve vrste proteza koje imate u tijelu (zubna, očna i sl.).

- Važno je reći jeste li Vi ili netko drugi u porodici imali neuobičajenu reakciju pri anesteziji. Spomenite sve dosadašnje anestezije, posebno ako je bilo nekih problema (visoka temperatura, dugo ili otežano buđenje).

- Za osobe ženskog spola jako je bitno da napomenu ukoliko sumnjaju na drugo stanje-trudnoću.

Važno!

- Ukoliko ne možete zapamtiti imena lijekova koje uzimate, ponesite pakovanje lijeka ili napišite naziv kao podsjetnik.

- Ponesite medicinsku dokumentaciju o ranijim operacijama i bolestima. Anesteziolog će Vam objasniti mogućnost izbora anestezije, prednosti i rizike pojedinog načina anestezije te odlučiti da li su potrebne dodatne laboratorijske pretrage, specijalističke konsultacije i promjene u terapiji koju uzimate.

- Cilj preoperativne pripreme je da operaciji pristupite u što je moguće boljem zdravstvenom stanju kako bi se smanjio rizik pojave komplikacija.

Potrebni nalazi za anesteziološki pregled

- Uputnica od nadležnog Doma zdravlja;
- Laboratorijski nalazi ne stariji od mjesec dana: kompletna krvna slika, mineralogram (natrij, kalij, kalcij, hloridi), biohemija (urea, kreatinin, šećer, jetreni parametri AST, ALT, CRP, koagulogram (APTT, INR);
- Nalaz interniste ne stariji od mjesec dana za odrasle osobe uz očitanje EKG-a;
- Nalaz kardiologa ukoliko **koristite pacemaker, ICD, CRT uređaj**;
- Nalaz pulmologa ne stariji od mjesec dana uz obavezno očitanje RTG-a;
- Nalaz pedijatra ne stariji od mjesec dana za djecu do 18 godina;
- Nalaz endokrinologa i hormoni štitne žlijezde ne stariji od tri mjeseca ukoliko imate dijagnosticirano oboljenje štitnjače;
- Medicinska dokumentacija vezana uz operacijski zahvat za koji se priprema pacijent;
- Prijašnja medicinska dokumentacija.

Priprema za operativni zahvat

Održavanje higijene kose i tjemena

- Sprovođenje dekolonizacije kože potrebno je započeti **pet dana prije operativnog zahvata** i provoditi ga dnevno tokom svih pet dana. Dekolonizacija tijela, kose i tjemena provodi se *Octenisan losionom* za pranje.
- Kada su u pitanju kosa i tjeme, preoperativna dekolonizacija podrazumijeva pranje kose barem dva puta tokom pet dana provođenja dekolonizacije.
- Za brisanje je preporučljivo uvijek koristiti čisti peškir, a poslije pranja obući čistu odjeću i promjeniti set posteljine u kojoj spavate.

Priprema za operativni zahvat

Održavanje higijene nosne šupljine

- Nosna šupljina se dekolonizira primjenom *Octenisan md g*elom za nos, dva puta dnevno, tokom pet dana. Pomoću vatenog štapića gel se nanosi u početni dio nosne šupljine te se potom ravnomjerno rasporedi masiranjem nosnica palcem i kažiprstom.



Održavanje higijene tijela

- **Tijelo** se pere jednom dnevno, na način da se nerazrijeđeni *Octenisan losionom* za pranje nanese na čistu spužvu za kupanje kojom se opere cijela površina kože. Potrebno je posebnu pažnju obratiti na pazušnu jamu, genitalno područje i kožu među nožnim prstima. Prije ispiranja potrebno je pričekati jednu minutu kako bi *Octenisan losion* za pranje ostvario svoj dekolonizacijski učinak.



Priprema za operativni zahvat

Pravilna ishrana

- Tokom pripreme za operativni zahvat bitno je posvetiti se zdravoj ishrani kao i fizičkoj aktivnosti kako bi u što boljoj kondiciji dočekali operaciju te i omogućili sebi brži postoperativni oporavak.
- Nakon operativnog zahvata tijelu su potrebne dodatne količine proteina, minerala i drugih nutrijenata. Poželjan je unos kvalitetnih namirnica (meso, riba, jaja, povrće, voće) u cilju osiguravanja dodanih kalorija i nutrijenata potrebnih za brži oporavak Vašeg organizma.
- Kod nekih pacijenata je potrebna i nutritivna potpora u vidu enteralne ishrane. Ovo se posebno odnosi na pacijente koji su pothranjeni jer je dokazano da malnutricija može dovesti do usporenog zarastanja rana, smanjenje mišićne snage, slabije respiratorne muskulature te u konačnici slabljenja imunološkog sistema bolesnika.

Priprema za operativni zahvat

Fizička aktivnost

- Ukoliko niste do sada, vrijeme je da uključite fizičku aktivnost u svoju svakodnevnicu. Počnite sa kardio vježbama, laganim istezanjem te sa vježbama manjeg opterećenja.

- Za kardiovaskularni sistem je poželjno da dnevno šetate 30 minuta te da krenete sa fizičkom aktivnosti bar 6 sedmica prije planiranog operativnog zahvata, a sve u cilju da sa što boljom kondicijom pristupite operativnom zahvatu i samim tim bržem oporavku.

Priprema za operativni zahvat

Pušenje

- U cilju što bolje ventilacije pluća tokom operacije bilo bi poželjno da apstinirate od pušenja 4 sedmice prije planiranog operativnog zahvata.

- Dan prije operacije ćete biti hospitalizirani.

- Iza ponoći, uoči operacije ne uzimajte hranu i tekućinu, a najmanje 6 sati pred operaciju jer prilikom uvoda u anesteziju želudac mora biti prazan. Ukoliko želudac nije prazan, možete povraćati što može biti po životno ugrožavajuće.

- Prije odlaska u operacionu salu, dobit ćete tzv. premedikaciju u vidu tablete, injekcije ili sirupa koja će Vas umiriti, osloboditi straha. Po primanju premedikacije nemojte ustajati iz kreveta.

- Anesteziolog će Vas uputiti koje lijekove trebate/smijete uzeti na dan operacije.

Sretno!