

令和2年 電磁気学 II

大山主朗

令和2年 電磁気学 II 第1回小テスト

1 以下の (a) 及び (d) に示す物理定数は電磁気学を修めた者であれば常識的に覚えていなければならない数値である．それぞれの値を示せ．

(a) 真空の誘電率 $\epsilon_0 : 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

(b) 真空の透磁率 $\mu_0 : 1.257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$

(c) 電子の電荷 $e : -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

(d) 電子の静止質量 $m : 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2 $AB = BC = a$, $\angle B = 90^\circ$ の直角二等辺三角形 ABC がある．いま各頂点に点磁荷 m が存在するとき，以下の各問いに答えよ．

(a) 頂点 B に存在する点磁荷にはたらく力 F_B を求めよ．

$$\mathbf{F}_{BA} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m^2}{((-a)^2)^{3/2}} (-a\mathbf{j})$$

$$= -\frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} \mathbf{j} [\text{N}]$$

$$\mathbf{F}_{BC} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m^2}{(a^2)^{3/2}} (-a\mathbf{i})$$

$$= -\frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} \mathbf{i} [\text{N}]$$

$$\mathbf{F}_B = \mathbf{F}_{BA} + \mathbf{F}_{BC}$$

$$= -\frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} (\mathbf{i} + \mathbf{j}) [\text{A/m}]$$

$$|\mathbf{F}_B| = \frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} \sqrt{2} [\text{N}] \quad \text{頂点 B から辺 AB の反対側向き}$$

(b) 頂点 A に存在する点磁荷にはたらく力 F_A を求めよ.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F}_{AB} &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m^2}{(a^2)^{3/2}} (a\mathbf{j}) \\
 &= \frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} \mathbf{j} \text{ [A/m]} \\
 \mathbf{F}_{AC} &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m^2}{((-a)^2 + a^2)^{3/2}} (-a\mathbf{i} + a\mathbf{j}) \\
 &= \frac{m^2}{8\sqrt{2}\pi\mu_0 a^2} (-\mathbf{i} + \mathbf{j}) \text{ [A/m]} \\
 \mathbf{F}_A &= \mathbf{F}_{AB} + \mathbf{F}_{AC} \\
 &= \frac{m^2}{4\pi\mu_0 a^2} \left\{ -\frac{1}{2\sqrt{2}}\mathbf{i} + \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\mathbf{j} \right\} \\
 &= \frac{m^2}{16\pi\mu_0 a^2} \left\{ -\sqrt{2}\mathbf{i} + (4 + \sqrt{2})\mathbf{j} \right\} \text{ [N]} \\
 |\mathbf{F}_A| &= \frac{m^2}{16\pi\mu_0 a^2} \sqrt{2 + 16 + 8\sqrt{2} + 2} \\
 &= \frac{m^2}{16\pi\mu_0 a^2} \sqrt{20 + 8\sqrt{2}} \\
 &= \frac{m^2}{8\pi\mu_0 a^2} \sqrt{5 + 2\sqrt{2}} \text{ [N]} \quad \text{左斜め上向き}
 \end{aligned}$$

(c) 直角三角形 ABC の内接円の半径 r を求めよ.

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{2S}{|AB| + |BC| + |AC|} \\
 &= \frac{2 \cdot \frac{1}{2}a^2}{a + a + a\sqrt{2}} \\
 &= \frac{a^2}{2a + a\sqrt{2}} \\
 &= \frac{a}{4 - 2}(2 - \sqrt{2}) \\
 &= \frac{2 - \sqrt{2}}{2}a
 \end{aligned}$$

(d) 頂点 A に存在する点磁荷が直角三角形 ABC の内心につくる磁界 H_A を求めよ.

$$\begin{aligned}
\mathbf{H}_A &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}a - a\right)^2\right)^{3/2}} \left\{ \frac{2-\sqrt{2}}{2}a\mathbf{i} + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}a - a\right)\mathbf{j} \right\} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \left\{ \frac{2-\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)\mathbf{j} \right\} [\text{A/m}] \\
|\mathbf{H}_A| &= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \sqrt{\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \sqrt{2\left(\frac{4-4\sqrt{2}+2}{4}\right) - (2-\sqrt{2}) + 1} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \sqrt{2\left(\frac{2-2\sqrt{2}+1}{2}\right) - (2-\sqrt{2}) + 1} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \sqrt{2-2\sqrt{2}+1 - (2-\sqrt{2}) + 1} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{\left(\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2\right)^{3/2}} \sqrt{2-\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{4\pi\mu_0 a^2} \frac{m}{2-\sqrt{2}} [\text{A/m}]
\end{aligned}$$

3 xy 直交座標系において、同量異符号の点磁荷 $\pm m$ が距離 l に固定された磁気双極子が存在する．このとき以下の問いに答えよ．

(a) 点 A に存在する磁荷 $-m$ が点 P(x_0, y_0) に作る磁界 H_1 を求めよ．また、 H_1 を x 方向成分 H_{x1} と y 方向成分 H_{y1} に分解せよ．

$$\begin{aligned}
\mathbf{H}_1 &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{-m}{\left(\left(x_0 + \frac{l}{2}\right)^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left\{ \left(x_0 + \frac{l}{2}\right)\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} \right\} [\text{A/m}] \\
|\mathbf{H}_1| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left(x_0 + \frac{l}{2}\right)^2 + y_0^2} [\text{A/m}] \\
|\mathbf{H}_{x1}| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left(\left(x_0 + \frac{l}{2}\right)^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left(x_0 + \frac{l}{2}\right) [\text{A/m}] \quad x \text{ 軸上方向} \\
|\mathbf{H}_{y1}| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left(\left(x_0 + \frac{l}{2}\right)^2 + y_0^2\right)^{3/2}} y_0 [\text{A/m}] \quad y \text{ 軸下方向}
\end{aligned}$$

(b) 点 B に存在する磁荷 $+m$ が点 P(x_0, y_0) に作る磁界 H_2 を求めよ．また、 H_2 を x 方向成分 H_{x2} と y 方向成分

H_{y2} に分解せよ.

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_2 &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left((x_0 - \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left\{ \left(x_0 - \frac{l}{2}\right) \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j} \right\} [\text{A/m}] \\ |\mathbf{H}_2| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left(x_0 - \frac{l}{2}\right)^2 + y_0^2} [\text{A/m}] \\ |\mathbf{H}_{x2}| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left((x_0 - \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left(x_0 - \frac{l}{2}\right) [\text{A/m}] \quad \text{x 軸正方向} \\ |\mathbf{H}_{y2}| &= \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m}{\left((x_0 - \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} y_0 [\text{A/m}] \quad \text{y 軸正方向}\end{aligned}$$

(c) 点 P での磁界 H の x 方向成分 H_x と y 方向成分 H_y をそれぞれ求めよ.

$$\begin{aligned}|\mathbf{H}_x| &= |\mathbf{H}_{x1}| + |\mathbf{H}_{x2}| \\ &= \frac{m}{4\pi\mu_0} \left\{ \frac{1}{\left((x_0 - \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left(x_0 - \frac{l}{2}\right) - \frac{1}{\left((x_0 + \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \left(x_0 + \frac{l}{2}\right) \right\} [\text{A/m}] \\ |\mathbf{H}_y| &= |\mathbf{H}_{y1}| + |\mathbf{H}_{y2}| \\ &= \frac{m}{4\pi\mu_0} y_0 \left\{ \frac{1}{\left((x_0 - \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} - \frac{1}{\left((x_0 + \frac{l}{2})^2 + y_0^2\right)^{3/2}} \right\} [\text{A/m}]\end{aligned}$$

(d) 磁気双極子モーメント \mathbf{M} の大きさと方向を求めよ.

$$\begin{aligned}\mathbf{M} &= m\mathbf{l} \\ &= mli [\text{Wb} \cdot \text{m}] \\ |\mathbf{M}| &= ml [\text{Wb} \cdot \text{m}] \quad \text{x 軸正方向}\end{aligned}$$

(e) 点 P が原点 O より十分遠方にあると仮定すると, $\sqrt{(x_0 - l/2)^2 + y_0^2} \simeq \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ 及び $\sqrt{(x_0 + l/2)^2 + y_0^2} \simeq \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$ と近似できる. このことを用いて (c) にて得た磁界 H_x 及び H_y を簡略化せよ.

$$\begin{aligned}|\mathbf{H}_x| &\simeq \frac{ml}{4\pi\mu_0 (x_0^2 + y_0^2)^{3/2}} [\text{A/m}] \quad \text{x 軸左方向} \\ |\mathbf{H}_y| &\simeq 0 [\text{A/m}]\end{aligned}$$

(f) y 方向に一樣な磁界 \mathbf{H}_0 が存在するとき, 磁気双極子にはたらくトルク T を求めよ.

$$\begin{aligned}\mathbf{T} &= \mathbf{M}H_0 \sin \theta \\ &= mliH_0 \sin \frac{\pi}{2} \\ &= mlH_0 \mathbf{i} \\ |\mathbf{T}| &= mlH_0 [\text{Wb} \cdot \text{m}]\end{aligned}$$

- 4 磁化されていない強磁性体に磁界 H を外部から印加し，強磁性体内部での磁束密度 B を観測すると，図3に示すような結果が得られた．このとき，図中の行程 1: 点 $O \rightarrow$ 点 P_1 ，行程 2: 点 $P_1 \rightarrow$ 点 P_2 ，行程 3: 点 $P_2 \rightarrow$ 点 P_3 ，行程 4: 点 $P_3 \rightarrow$ 点 P_4 ，行程 5: 点 $P_4 \rightarrow$ 点 P_5 ，行程 6: 点 $P_5 \rightarrow$ 点 P_6 ，行程 7: 点 $P_6 \rightarrow$ 点 P_1 の 7 つの行程に着目して，測定結果を説明せよ．
- 5 強磁性体，弱磁性体，常磁性体，反磁性体の 4 つの磁性体の性質を，「比透磁率 μ_s 」と「磁化率 χ 」という 2 つの語句を両方用いて説明せよ．

強磁性体は磁化率 χ が 0 よりかなり大きく，透磁率 μ_s が 1 よりかなり大きい磁化されやすい磁性体を指す．そのため，印加した磁界と同じ方向に磁化され，その大きさも大きい．

弱磁性体は磁化率 χ が 0 より大きく，透磁率 μ_s より小さい磁性体である．

常磁性体は磁化率 χ が 0 より大きく，透磁率 μ_s は 1 未満の磁性体を指す．そのため，印加した磁界と同じ方向に磁化され，その大きさは大きくない．

反磁性体は磁化率 χ が 0 より小さく，透磁率 μ_s が 1 より小さい磁性体を指す．そのため，印加した磁界と逆方向に磁化され，その大きさは小さい．

令和2年 電磁気学II 第2回小テスト