? IDÉES REÇUES

Vrai ou faux ?

Testez ce que vous savez sur l'otite.

« L'otite est contagieuse. »

FAUX L'otite ne s'attrape pas. En revanche, le **rhume** qui la provoque, lui, est contagieux.

« Une otite se soigne toujours avec des antibiotiques. »

FAUX Beaucoup guérissent seules. On soulage la douleur, et c'est le médecin qui décide s'il faut un antibiotique.

« Le coton-tige protège les oreilles. »

FAUX Il pousse le cérumen au fond du conduit et peut blesser la peau ou le tympan. On nettoie seulement l'entrée de l'oreille.

« Une otite peut rendre sourd. »

RAREMENT La baisse d'audition est presque toujours passagère. Mais des otites qui reviennent souvent doivent être suivies par un médecin.

« On peut prendre l'avion avec une otite. »

À ÉVITER Les changements de pression peuvent rendre la douleur très forte. Demandez l'avis du médecin avant un vol.

« Si l'oreille coule, c'est très grave. »

PAS FORCÉMENT Le tympan s'est percé pour laisser sortir le pus, et la douleur diminue souvent. Il cicatrise en général seul, mais il faut consulter.

04 PRÉVENIR

Limiter le risque d'otite

- **Laver le nez** des tout-petits au sérum physiologique et apprendre aux enfants à se moucher.
- Se **laver les mains** souvent, surtout pendant la saison des rhumes.
- **Ne pas fumer** près des enfants : le tabagisme passif favorise les otites.
- Faire les **vaccins** : celui contre le pneumocoque, obligatoire chez le nourrisson, protège contre une partie des otites.
- L'**allaitement** aide à protéger les bébés.
- Après la baignade, bien **sécher l'entrée des oreilles**, sans coton-tige.

CONSULTEZ RAPIDEMENT SI…

- la fièvre dure plus de 48 h ou reste forte malgré le traitement ;
- la douleur est très forte ou l'oreille coule ;
- la zone derrière l'oreille est rouge ou gonflée ;
- l'enfant est très abattu, a des vertiges ou la nuque raide ;
- un bébé de moins de 3 mois a de la fièvre.

En cas d'urgence, appelez le **15** (Samu) ou le **112**.

Sources : Assurance Maladie (ameli.fr), Haute Autorité de santé (HAS).

Ce dépliant informe : il ne remplace pas l'avis d'un médecin.

Réalisé par : .....

SANTÉ ORL · DÉPLIANT D'INFORMATION



L'otite


Quand l'oreille s'enflamme : comprendre, soulager et prévenir.

Définition · Symptômes · Traitement · Prévention

01 COMPRENDRE

Qu'est-ce qu'une otite ?

C'est une **inflammation de l'oreille**, le plus souvent causée par un virus ou une bactérie. L'oreille se divise en trois parties :



En jaune : le pus qui s'accumule derrière le tympan lors d'une otite moyenne aiguë.

Les 3 otites les plus courantes

Otite externe

Le **conduit auditif** est enflammé, souvent après la baignade : c'est « l'otite du baigneur ». Tirer sur l'oreille réveille la douleur.

Otite moyenne aiguë

La plus fréquente chez l'enfant. Du **pus** s'accumule derrière le tympan, souvent après un rhume.

Otite séromuqueuse


Du **liquide** reste derrière le tympan, sans douleur ni fièvre, mais l'enfant entend moins bien.

02 RECONNAÎTRE


Pourquoi surtout les enfants ?

Avant 2 ans, **3 enfants sur 4** ont déjà fait au moins une otite moyenne aiguë.

L'oreille communique avec l'arrière du nez par un petit canal : la **trompe d'Eustache**. Chez l'enfant, elle est **plus courte et plus horizontale**. Pendant un rhume, les microbes remontent donc facilement jusqu'à l'oreille.



Adulte : longue et inclinée



Enfant : courte et horizontale

La vie en collectivité (crèche, école) et le tabagisme passif augmentent aussi le risque.

Les signes

- **Douleur d'oreille**, parfois très vive, souvent la nuit
- **Fièvre**
- Oreille **bouchée** : on entend moins bien
- Parfois un **écoulement** de l'oreille

Chez le bébé, qui ne peut pas le dire : pleurs, agitation, mauvais sommeil. Il se frotte ou se tire l'oreille, refuse de manger, a parfois des vomissements ou de la diarrhée.

03 SE SOIGNER

Diagnostic et traitement

Le médecin regarde le tympan avec un **otoscope**, une petite lampe munie d'un embout. L'examen est rapide et ne fait pas mal. Un tympan rouge et bombé signe une otite moyenne aiguë.

1. **Calmer la douleur et la fièvre** avec du paracétamol, à la dose adaptée au poids de l'enfant.
2. **Laver le nez** au sérum physiologique et bien se moucher.
3. **Antibiotiques : pas systématiques.** Le médecin en prescrit surtout avant 2 ans ou si les signes sont forts, le plus souvent de l'amoxicilline. Après 2 ans, si les signes sont légers, il peut proposer d'attendre 48 à 72 h.
4. **Otite externe :** des gouttes à mettre dans l'oreille, sur ordonnance.

8 sur 10
otites moyennes guérissent sans antibiotique

2 à 3 jours
en général pour que la douleur passe

ATTENTION

Pas de gouttes dans l'oreille sans avis médical : si le tympan est percé, certaines sont dangereuses. Un antibiotique prescrit se prend **jusqu'au bout**, même si ça va mieux.

Les complications

Elles sont rares quand l'otite est bien suivie : perforation du tympan, otites à répétition, baisse d'audition qui dure, ou infection de l'os derrière l'oreille (mastoïdite).