

KITTEN

Booklet



คู่มือดูแล ลูกแมว
แบบครบจริง
สำหรับเจ้าของแมว มือใหม่

NEXT
COMBO





1. ยินดีต้อนรับสมาชิกตัวใหม่ สู่บ้านใหม่
2. เริ่มรู้จัก ช่วงเวลาสำคัญของลูกแมว
3. การเตรียมพร้อมต้อนรับลูกแมว สมาชิกใหม่
4. การอีดวัคซีน – ให้ลูกแมวของคุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด
5. การป้องกันปรสิต สำคัญ สำหรับลูกแมว
6. เปิดประสบการณ์กับบ้านหลังใหม่
7. โภชนาการ – เริ่มต้นชีวิตด้วยการมีสุขภาพดี
8. เคล็ดลับการฝึกลูกแมว ของคุณ
9. สุขภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดี
10. สรุปสิ่งสำคัญ สำหรับลูกแมว



1

ยินดีต้อนรับสมาชิกตัวใหม่ สู่บ้านใหม่

- ขอแสดงความยินดีกับการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว !!
- เมื่อลูกแมวนำถึงที่บ้านของคุณ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความสนุกสนาน การกอดรัดฟัดเหวี่ยง ความน่ารักเต็มพิกัด และเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้สมาชิกทุกๆคน



การอยู่ร่วมกันช่วงสองถึงสามสัปดาห์แรก จะหล่อหลอมรูปแบบพฤติกรรมในอนาคตให้แก่ลูกแมว และเป็นการวางรากฐานแห่งมิตรภาพอันเหนียวแน่นระหว่างกัน

คุณเมื่อเล่นนี้ ครอบคลุมเนื้อหาหลายประการที่คุณต้องทราบเพื่อการเป็นเจ้าของสัตว์ที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งนับเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญ และมีข้อมูลเพิ่มเติบมากเมายจากเว็บไซด์ของพาร์ทเนอร์เรา เช่น การดูแลน้องแมวในทุกช่วงชีวิต (Cat Care for Life) และการเลี้ยงดูน้องแมวฉบับสากล (International Cat Care) เรา มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ขององค์กรสากลระดับโลกเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่า สมาชิกตัวใหม่ในครอบครัวของคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข





เริ่มรู้จัก ช่วงเวลาสำคัญของลูกแมว



สิ่งแรกที่ควรทราบ

สุขภาพและความเป็นอยู่ก็ต้องเจ้าตัวเล็กขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของสัตว์ ดังนั้นคุณควรเริ่มมองหาสัตวแพทย์ที่จะดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำ – ถ้าคุณได้อ่านคู่มือเล่มนี้ก็อ้วว่าได้เลือกตัวช่วยที่ถูกทางแล้ว สัตวแพทย์จะเป็นผู้รอบรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงได้ และเจ้าหน้าที่คุณิกกิจจะอัปเดตลูกแมวของคุณเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเอง



ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 เดือน

ลูกแมวที่อยู่ในวัยนี้เป็นวัยที่ยังต้องอยู่กับแม่แมว ร่างกายของลูกแมวจะยังปรับอุณหภูมิเองได้ไม่ดีนัก จึงควรเปิดไฟฟอกให้กับลูกแมวเพื่อเพิ่มความอบอุ่น ป้อนนมสดๆ แก่น้ำนมสำหรับลูกแมว โดยใช้ช้อนนมสำหรับลูกแมวทุก 1-2 ชั่วโมง และใช้สำลีชุบน้ำซีดทำความสะอาด กระตุนให้ลูกแมวขับถ่าย ที่สำคัญควรพาลูกแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย



2 เดือน


ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แนะนำให้เริ่มกำวัตซ์ และเป็นช่วงที่เริ่มป้องกัน ปรสิต ต่างๆ ซึ่งสามารถเริ่มป้องกันได้ตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ ดังนั้นการพบสัตวแพทย์จึงเป็นสิ่งที่แนะนำเป็นสำคัญ





2-4 เดือน

ช่วงเวลานี้เจ้าเหมียวจะเริ่มแสดงบุคลิกและพฤติกรรมต่างๆ ออกมาร่วมกับการสร้างสายใยแห่งมิตรภาพและความผูกพันรักที่เหนียวแน่นกับคนอีบุคคลในครอบครัวคุณ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสำคัญให้เจ้าเหมียวได้เรียนรู้ความเชื่อใจและสร้างอาณาเขตที่ตัวเองรู้สึกปลอดภัย และยังอยู่ในช่วงการกำวัดซึ่งตามโปรแกรม รวมถึงการเริ่มฝึกพฤติกรรม



4-8 เดือน


ถึงเวลาพาเจ้าเหมียวไปทำหมัน ช่วงหลังเดือนเป็นเวลาที่คุณอาจเริ่มปล่อยให้เจ้าเหมียวได้ออกผจญภัยโลกภายนอกโดยไม่ต้องค้อยกำกับ แต่การฝึกอบรมก็ยังต้องการทำต่อเนื่องไปด้วย



3

การเตรียมพร้อมต้อนรับ ลูกแมว สมาชิกใหม่

ไม่ต้องเตรียมอะไรมาก เราทำลิสต์รายการเบื้องต้นสำหรับของที่ต้องมี เพื่อช่วยคุณ และลูกแมวในการปรับตัวสู่บ้านใหม่



กรง/กระป๋าแมวพกพา - แบบที่เปิดได้จากทางด้านบนและด้านข้าง จะทำให้ลูกแมวของคุณ เครียดน้อยลง และยิ่งกระป๋าเมื่อที่ว่างเพื่อเวลา ลูกแมวตัวโตขึ้นก็ยิ่งดี

ที่นอนแสนสบาย - หาบายกึ่งสั่งของที่เจ้าตัวเลือก ให้ความรู้สึกนิ่มนุ่มคงและปลอดภัย ไม่ต้องแปลงใจ ก็คุณอาจพบว่าลูกแมวจะชอบกล่องที่ใส่มา แทนเบาะนอนที่คุณเตรียมไว้ให้

กระเบื้องด้าย - แมวเป็นสั่งมีเซ็ตที่รัก ความสะอาดมาก พอกมีบันจะใช้กระเบื้องใน การขับถ่าย (หรือพอโตขึ้นอาจไปขับถ่ายใน สวน) ดังนั้น การเตรียมกระเบื้อง และกระเบื้องด้าย คุณภาพดีให้ลูกแมวเป็นสิ่งสำคัญมาก ก็งแม้ คุณจะเลี้ยงแบบปล่อยให้ลูกแมวสามารถเข้าออกบ้านได้ก็ตาม

อาหาร ภาชนะใส่อาหาร และน้ำ - โภชนาการ มีบทบาทสำคัญมากต่อพัฒนาการของ เจ้าตัวเล็ก ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในตอนท้าย ของคู่มือ ส่วนภาชนะควรเตรียมกึ่งสำหรับใส่ อาหารและใส่น้ำแยกจากกัน



การป้องกันปรสิต – ลูกแมวของคุณจำเป็นต้องได้รับการป้องกันปรสิต ก่อครรภ์ กังไน้ หรือ หนี้ พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิภายใน และ พยาธิตัวตืด ตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ และ ป้องกันต่อเนื่องทุกเดือน เพราะว่า ลูกแมวเป็นวัยที่ซุกซ่อน และมีความเสี่ยงที่จะติดปรสิต ไม่ว่าลูกแมวจะ เสี้ยงในบ้าน หรือนอกบ้านก็ตาม ดังนั้นการเลือกแนวทางการป้องกัน ก่อครรภ์คลุมแบบไม่ต้องป้อน จึงเป็นวิธีการที่แนะนำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สัตวแพทย์



ประตูบ้องแมว – แมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระ ชอบการผจญภัย และการได้ออกไปสำรวจโลก ดังนั้นการมีประตูสำหรับแมวทำให้คุณไม่ต้องพะวง บ่อยครั้ง ปัจจุบันมีตัวเลือกให้มากหลาย รวมถึงประตูบ้องแมวที่ตอบสนอง ต่อไมโครชิพที่ฝังอยู่ในตัวสัตว์เสี้ยง ทำให้สัตว์ตัวอื่นไม่สามารถผ่านเข้ามาได้



เสาลับเล็บ – แมวชอบการเป็นป้ายและการได้ทางกรงเล็บของพวกลัน การมีสิ่งของซับน้ำจะช่วยเชฟเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่านของคุณได้ แนะนำว่า ยิ่งเสาสูงได้มากก็ยิ่งดี



ของเล่น – แบบชอบการได้เล่น ของเล่นจึงเป็นแหล่งให้พวกลันได้ปลดปล่อย พลังงาน และแสดงสัญชาตญาณอ่อนมา ซึ่งการเล่นกับแมวเป็นอีกวิธี ที่ช่วยสร้างความผูกพันอันหนึ่งแหนบระหว่างคุณกับสัตว์เสี้ยงอีกด้วย

ค้นหาคำแนะนำที่มีประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับการเตรียมความพร้อมดูแลได้ที่นี่



Facebook



Line



Website



4

การกำโปรแกรมวัคซีน—— ให้ลูกแมวของคุณมีการเริ่มต้นที่ดีที่สุด

ทำไมต้องอีดวัคซีนให้แมว ?

การอีดวัคซีนให้ลูกแมวตัวใหม่จะช่วยปกป้องพวกลันจากโรคภัยต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องพาลูกแมวไปอีดวัคซีนตามกำหนด รวมถึงรับการอีดวัคซีนเข็มกระตุบเมื่อกำลังเวลา นัดหมาย และต้องบันทึกลงสมุดวัคซีน

อีดวัคซีนแค่เข็มเดียวเพียงพอไหม ?

วัคซีนที่ต่างชนิด ก็ป้องกันโรคได้ต่างกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกัน สัตวแพทย์ที่คุณพาลูกแมวไปหาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับวัคซีนที่จำเป็นสำหรับ ไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อมของบ้านแมวได้

ในกำหนดเดียวกัน ความถี่ของการอีดวัคซีน และชนิดวัคซีนที่แมวแต่ละตัวต้องการ ก็จะแตกต่างกันไป

โดยปกติลูกแมวควรตอนอายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ และกระตุบวัคซีนเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่ง การกระตุบวัคซีนมักเว้นช่วงห่างกัน 2-4 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนแต่ละเข็ม โดยจำนวนครั้ง ในการกระตุบวัคซีนนั้น สัตวแพทย์จะเป็นคนวางแผนโปรแกรมให้เหมาะสมกับลูกแมวแต่ละตัว





การฉีดวัคซีนกระตุนภูมิ

เพื่อให้เจ้าเหมียวได้รับการป้องอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุนเมื่อครบกำหนด ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสัตวแพทย์จะแจ้งให้เจ้าของทราบว่าวัคซีนตัวไหน ต้องได้รับการกระตุนบ้าง นอกจากการฉีดวัคซีนประจำปีแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปีเองก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเช็คว่าแมวของคุณมีสุขภาพที่ดี คุณยังไม่ควรปล่อยให้ลูกแมวออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน ก่อนการฉีดวัคซีนเข็มแรกและหลังการฉีดอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถับสัตว์ตัวอื่น จนกว่าลูกแมวจะได้รับวัคซีนครบทั้งนั้น

เกื้ี้ดความรู้ : ถ้าคุณวางแผนจะพาบ้องแมวไปสถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ ส่วนมากแล้วจะต้องมีใบประวัติการฉีดวัคซีน หรือการรับรองจากสัตวแพทย์ว่าแมวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว



การป้องกัน ไร หู เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิตัวตืด และปรสิตอื่นๆ

พวกรสิตตัวเล็กเหล่านี้ชอบติดตามลูกแมวของคุณกลับไปที่บ้านด้วย ตั้งแต่แรกเกิด ลูกแมวของคุณเป็นสถานที่ที่ชอบอุ่นและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสำหรับปรสิตเหล่านี้ และเจ้าเหมียวตัวเล็กก็มีพฤติกรรมที่ชอบล่าสัตว์ ชอบตกแต่งขน รวมถึงการออกนำไปเที่ยวนอกบ้าน การออกนำไปพจญภัยของเหล่าแมวเหมียวทำให้มีโอกาสติดเชื้อพยาธิ หรือปรสิตอื่นๆมาได้

สิ่งที่เจ้าตัวบ้องแมวพึงชื่นชอบ เช่น การนำของขวัญ เล็กๆน้อยๆ ที่จับได้ อย่างพวงหรีด หรือ กกลับมาฝากคุณเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ หรือการได้ออกไปพจญภัยรอบบ้าน บริเวณสวน หรือกระถังสวนสาธารณะใกล้บ้าน

สถานที่ที่เจ้าตัวเล็กชอบไปเหล่านี้เอง ที่เป็นแหล่งปัญหาการติดพยาธิปรสิตกลับมา เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปจะค่อนข้างร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปรสิต ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อลูกแมว และสามารถกำจัดปรสิตได้ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างครอบคลุมแบบรายเดือนชนิดหยดหลังไม่ต้องใส่ปลอกคอ ไม่ต้องกินยา และไม่ก่อความเครียดทั้งสำหรับลูกแมวและคุณเจ้าของเอง



เสริมเกราะภูมิคุ้มกัน ให้น้องแมวด้วย วัคซีน

วัคซีนหลัก

วัคซีนที่น้องแมวทุกตัวควรได้รับ¹
ได้แก่ วัคซีนโรคหัดแมว, โรคหวัดแมว
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนโรคลิวคีเมีย

วัคซีนทางเลือก

วัคซีนที่แนะนำในน้องแมวที่
มีความเสี่ยง ได้แก่
วัคซีนโรคติดเชื้อคลามัยเดีย



ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีน ของน้องแมวในช่วงหอบเปรณ

อายุลูกแมว

ชนิดวัคซีน

8 สัปดาห์	โรควัคซีนรวมป้องกันหัด-หวัดแมว (เข็มที่ 1)
12 สัปดาห์	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หวัดแมว (เข็มที่ 2)
14 สัปดาห์	วัคซีนพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 1)
16 สัปดาห์	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หวัดแมว (เข็มที่ 3) วัคซีนโรคคลิวคีเมีย (เข็มที่ 1) ¹
18 สัปดาห์	วัคซีนพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 2)
20 สัปดาห์	วัคซีนโรคคลิวคีเมีย (เข็มที่ 2)
26 สัปดาห์	วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หวัดแมว (เข็มที่ 4) ²
52 สัปดาห์	วัคซีนพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 3)

หมายเหตุ : โปรแกรมวัคซีนอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับดุลพินิจของสัตวแพทย์

1. ตรวจโรคคลิวคีเมียก่อนให้วัคซีน

2. พิจารณากระดูน้ำหนักตามความเสี่ยงของน้องแมว



5

การป้องกันปรสิต สำคัญ สำหรับลูกแมว


ปรสิตเหล่านี้สามารถก่อความรำคาญให้สัตว์เลี้ยงและรักษาคุณได้ และยิ่งไปกว่านั้นพวกลมสามารถก่อโรคในน้องแมวได้ และในกรณีที่ร้ายแรงก่อให้สูดอาจถึงแก่ชีวิต หากไม่ได้รับการรักษา ดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาในภายหลัง - เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเห็นตัวเห็บ หมัด ໄส ไข่หมัด ตัวอ่อนพยาธิอยู่บนสัตว์เลี้ยง แสดงว่าอาจสายเกินไปก็จะป้องกัน และการกำจัดพวกลมให้หมดไปอาจต้องใช้เวลา

**การออกที่ดีที่สุด คือ การป้องกันปรสิตที่ ครอบคลุม
ทั้งปรสิตภายในและภายนอก**

ทุกที่มีความเชื่อง



ความเสี่ยงนอกบ้าน



จุดเสี่ยง : หญ้า สนามหญ้ารอบบ้าน พื้นดิน

ปรสิตที่มักพบ : เห็บ 4 ชนิด

ติดแมวโดย : เห็บจะเดินໄต่เขี้ยวไปบนตัวแมว

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

เห็บ ทำให้ผิวหนังระคายเคือง เป็นพาหะของพยาธิเม็ดเลือด
เห็บสามารถกัดคน และนำโรค Lyme Disease มาสู่คนได้

จุดเสี่ยง : พื้นดิน 旁น้ำขัง

ปรสิตที่มักพบ : พยาธิปากขอ 3 ชนิด

ติดแมวโดย : ตัวอ่อนพยาธิปากขอจะซ่อนใจ
เข้าสู่ผิวหนังแมวได้

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

พยาธิปากขอ เป็นพยาธิที่พบมากที่สุดในแมว
ทำให้ก่อเรื้อรัง โลหิตจาง ผนังลำไส้เป็นแผล¹
อาจทำให้มีเลือดออกจำนวนมาก
จนแมวเสียชีวิตได้ และสามารถติดสู่คนได้



**จุดเสี่ยง : หอยทาก ไส้เดือนดิน
หญ้า นก และแมลงต่างๆ บริเวณบ้าน**

ปรสิตที่มักพบ : พยาธิในปอด 2 ชนิด

ติดแมวโดย : แมวไปเล่น หรือกิน หอยทาก นก
หญ้าที่มีตัวอ่อนของพยาธิ

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :


ทำให้แมวมีอาการไอ หายใจลำบาก
ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้



ความเสี่ยงในบ้าน



จุดเสี่ยง : บริเวณที่มียุง
กั้งในบ้านและนอกบ้าน



ปรสิตที่มักพบ : พยาธิหนอนหัวใจ

ติดแมวโดย : ติดต่อจากแมวสู่แมว ผ่านการโดนยุงกัด

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ทำให้แมวมีอาการระบกทางเดินหายใจและหัวใจ

ทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้

จุดเสี่ยง : รองเท้า ใต้พื้นรองเท้า
จากเจ้าของที่เหยียบเข้าบ้าน

ปรสิตที่มักพบ : พยาธิตัวกลม 2 ชนิด

ติดแมวโดย : แมวกินไข่ของพยาธิหรือตัวอ่อน
ที่ปนเปื้อนมากับรองเท้า

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ทำให้แมวพอม พุงบ่อง เติบโตช้า

ร่างกายทรุดโทรม อาเจียน

ถ้ามีพยาธิจำนวนมากจะทำให้

อุดตันในลำไส้และเสียชีวิตได้

พยาธิชนิดนี้สามารถติดสู่คนได้



จุดเสี่ยง : พรม ใต้พรม โซฟ่า


ปรสิตที่มักพบ : หมัด ไข่หมัด ตัวอ่อนหมัด

ติดแมวโดย : หมัดตัวเต็มวัยจะกระโดดขึ้นตัวแมว
และออกไข่ในขนะอาศัยอยู่บนตัวแมว
จากนั้นจะพัฒนาเป็นดักแด้ใช้เวลา 8-325 วัน¹
แล้วเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ทำให้ผิวหนังระคายเคือง คัน

และสามารถกัดคนทำให้เกิดอาการแพ้ได้





เสี่ยงต่อคน แมวตายได้



จุดเสี่ยง : ห้องน้ำแมว

ปรสิตที่มักพบ : พยาธิกระเพาะปัสสาวะ

ติดแมวโดย : ติดจากการที่แมวใช้

กระบวนการรายร่วมกัน

แมวจะได้รับตัวอ่อนพยาธิที่ป่นเปื้อน

มากับปัสสาวะ

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีไข้
ปวดเบ่งปัสสาวะลำบาก มีเลือดปน

จุดเสี่ยง : บริเวณที่มีจังจก ขี้จังจก

ปรสิตที่มักพบ : พยาธิตัวตืด 5 ชนิด

ติดแมวโดย : แมวไปเล่น หรือกินจังจก

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ถ่ายเหลว ผอม เติบโตช้า ร่างกายกรุดโกร姆
ไม่แข็งแรง

จุดเสี่ยง : ที่นอนแมว

สั่งแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่

ปรสิตที่มักพบ : ไรหู ไรขี้เรือนแห้ง

ติดแมวโดย : ติดจากแมวตัวอื่นที่เป็นโรค

หรือเกิดขึ้นเองในกรณีที่ภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์

หรือติดจากแม่มดสู่ลูกแมวได้

ผลร้ายกับแมวและเจ้าของ :

ไรหูทำให้แมวคันหู เก้า สันหัวตลอด

ไรขี้เรือนแห้ง ทำให้แมวคัน เป็นสะเก็ด ขนร่วง
สามารถติดคนได้



เยี่ยมยอดมาก !! คุณได้เตรียมพร้อม ส่งจำเป็นสำหรับการต้อนรับเจ้าตัวเล็กสู่บ้านใหม่
เรียบร้อยแล้ว ก้าวการกำวัคซีน และการหยดยาเพื่อปกป้องเจ้าตัวน้อย รวมถึงคุณ
และคบในครอบครัวจากเหล่าปรสิตตัวร้าย ได้เวลาปรับตัวสู่บ้านใหม่!



6

เปิดประสบการณ์กับบ้านหลังใหม่

สิ่งนี้อาจทำให้เจ้าตัวน้อยรู้สึกตื่นกลัวได้ ลูกแมวมักมีบุคลิกเฉพาะตัว บางตัวชี้อย่างที่บ่งบอกถึงความต้องการ เช่น ที่คุณต้องการคือให้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดไม่ว่าเจ้าเหมียวจะบุคลิกแบบไหน ในฐานะของพ่อแม่เมื่อใหม่ คุณต้องเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อลูกแมวอย่างไรบ้าง และต้องทำให้บ้านเป็นสถานที่ที่เจ้าตัวเล็กรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย

1w

สำหรับช่วงสัปดาห์แรก

เลือกสักห้องในบ้านให้แก่ลูกแมว เพื่อให้เจ้าเหมียวค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงเป็นการช่วยฝึกใช้กระบวนการอีกด้วย





รายการสำคัญ

- ✿ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ – ตรวจสุขภาพในห้องให้ดี นำสั่งของที่อาจเสียหาย หรือ เป็นอันตรายออกไป และอย่าลืมว่าสุกแหนวนของคุณนั้นชอบพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
- ✿ หลีกเลี่ยงห้องที่มีผ้าม่านผืนยาว – เพราะสุกแหนวนนั้นชอบการปีนป่ายมาก
- ✿ วางกระเบื้องไว้บริเวณบุบ กีบสูบสูบ
- ✿ ชามสำหรับใส่อาหาร และน้ำ ควรวางให้ห่างไกลจากกระเบื้อง
- ✿ หากเป็นไปได้ควรจัดตำแหน่งที่นอนให้ห่างจากกันกระเบื้อง ชามใส่อาหารและน้ำ
- ✿ เมื่องให้เล่น – แม้จะเป็นแค่ลูกกระดาษแพ็คกิ้งก็ใช้ได้แล้ว
- ✿ กีบเล็บ – อะไรมาก็ได้ที่สามารถให้สุกแหนวนตัวใหม่ปีนป่าย หรือใช้กรงเล็บห่วงได้

สุกแหนวนต้องการซ่อมเวลาพักผ่อนมากกว่าแนวโน้มเสียอีก แต่ในระหว่างการนับหลับนั้น เจ้าเหมียวจะสามารถแสดงพลังอันเหลือล้นออกมาได้ด้วย แนวเด็กชอบการปีนป่ายอย่างมาก ดังนั้นให้เตรียมพร้อมสำหรับการซ่อมเหลือไว้เสมอ เพราะการปีนขึ้นไปง่ายกว่าต้องปีนลงยังไงล่ะ

อาณาเขตสำคัญยังไง

แนวเป็นสัตว์ที่หวงกันมาก พวกลับต้องการความรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ในบ้านและพยายามใช้เวลาอยู่ใต้อาณาเขตที่กว้างขวางของตัวเอง แนวจะชอบถูกล้อมกับพื้นผิวสั่งของ (โดยเฉพาะที่ขาเจาะของ) – เพื่อให้กลับฟีโรโมนติดอยู่ในบริเวณที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ และเพื่อให้ความรู้สึกปลอดภัย

การทำให้สมาชิกใหม่รู้สึกเป็นที่ต้อนรับ สามารถทำได้อีกหลายอย่าง เช่น แนะนำเจ้าเหมียวตัวใหม่กับเด็กๆ สุนัข หรือแนวตัวอื่นในบ้านให้ค่อยๆ ทำความรู้จักกัน – ดูคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่



Facebook



Line



Website





โภชนาการ เริ่มต้นชีวิตด้วยการมีสุขภาพดี

อาหารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพลูกแมว ยิ่งในช่วงchwบปีแรกก็มีการเจริญเติบโตและสร้างพัฒนาการมาก อาหารที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง และเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาด้วงตาและสมอง ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยเด็ก

ศาสตร์ด้านโภชนาการแมวนี้ความก้าวหน้ามากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่ออาหารสำเร็จรูปที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะสมกับช่วงอายุและไลฟ์สไตล์ของลูกแมวไปจนถึงแมวสูงอายุ รวมถึงสูตรอาหารพิเศษสำหรับแมวที่ป่วยเป็นโรคบางชนิด เพื่อให้แมวมีสุขภาพดี ยืนยาว มีสุขภาพดี และอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น เช่นเดียวกับการป้องกันปรสิต ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้คุณได้ สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในคลินิกสัตว์เลี้ยงจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการทางโภชนาการของเจ้าตัวเล็กได้



ข้อมูลสำคัญ

อาหารของน้องแมวต้องประกอบไปด้วย

- โปรตีน
- คาร์โบไฮเดรต
- ไขมัน
- วิตามินและแร่ธาตุ

สารอาหารทั้งหมดต้องรวมอยู่ในปริมาณที่ถูกต้องและมีสัดส่วนเหมาะสม ผู้ผลิตอาหารแมวที่ได้มาตรฐานจะผลิตสูตรอาหารที่องค์ประกอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว

แมวและลูกแมวมีความต้องการโภชนาการบางอย่างที่จำเพาะ ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพและการอยู่รอดของลูกแมว เช่น กอร์บิน





เคล็ดลับสำหรับ เมื่ออาหาร

ลูกแมวอายุ 8-12 สัปดาห์
ต้องการอาหารสี่มื้อต่อวัน
เมื่ออายุได้ 3-6 เดือน จะลด
เป็นสามมื้อต่อวัน และอายุ
6 เดือนขึ้นไปจะให้สองมื้อต่อวัน
แนวใช้ประสานสัมผัสการดูกลิ่น
ในการกินอาหาร พวกลันจึงเป็นสัตว์เลือกกิน
และใช้ใจรายละเอียดมาก แนวบางตัวชอบกินอาหารใส่ชาม
เพื่อเวลา กินหนวดจะไปสัมผัสถกับขอบด้านข้าง ในขณะที่
แนวบางตัวชอบกินอาหารที่ใส่ภาชนะลักษณะแบบมากกว่า
เพื่อให้หนวดไม่สัมผัสถกับอะไรเวลา กินอย่างลึก ล้ำ น้ำสะอาด
ให้ลูกแมวสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และเก็บภาชนะใส่อาหาร
บ้ำ และกระเบกรายให้ห่างไกลจากบริเวณที่น้องแมวไปนอน
หากต้องการป้อบนมอย่าให้นมวัว เพราะอาจทำให้ก้อนเสียได้
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสำหรับแมว
และหากเกิดอาการปวดท้องนานกว่า 24 ชม. ควรเข้ารับ
การดูแลกับสัตวแพทย์





กิจกรรมล่าสัตว์สุดหรรษา

แนวมักมีนิสัยชอบล่าเหยื่อ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏับได้ด้วยการเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้น ตามวิถีของแมวที่อาศัยในป่าจะล่าเพียงลำพัง ดังนั้น หากพวงมันร่องนิวค่อยออกหากาเหยื่อ จะส่งต่อการอดอาหารได้ ด้วยเหตุนี้น้องแมว จำเป็นต้องฝึกต่อการไล่จับสั่งเมเซ็ตตลอดเวลา หากเจ้าของกังวลกับพฤติกรรมนี้ สามารถลองวิธีที่อาจช่วยป้องกันได้ เช่น การจำกัดบริเวณ หรือห้ามลงเล่นเพื่อบรรเทาความสนใจเจ้าเหมียว



8

เคล็ดลับการฝึกลูกแมว ของคุณ

เวลาที่เหมาสนใจการฝึกฝนเจ้าเหมียว เริ่บตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุหกเดือน เพราะลูกแมวสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุน้อย ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรมและทักษะการเข้าสังคมของลูกแมว



เรียกเดียวๆเหมียวก็มา

ถึงเวลาฝึกฝนให้น้องแมวมาหา เวลาเจ้าของเรียก ซึ่งจะมีประโยชน์มากเวลาลูกแมวโตขึ้น และสามารถออกไปเที่ยวนอกบ้านได้ การให้ขนมเป็นสิ่งล่อตาล่อใจให้ลูกแมวตอบสนอง ต่อเจ้าของได้ดีที่สุด



กระเบื้องด้วยสีดวก

น้องแมว ส่วนมากสามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านได้ รวมถึงกำธูระ (ขับถ่าย) ในที่ส่วนตัวของพวกลันเอง แต่ก่อนหน้านั้น ลูกแมวตัวใหม่จะต้องการกระเบื้องเพื่อใช้ขับถ่ายภายในบ้าน และควรวางกระเบื้องกับภาชนะใส่อาหารและน้ำให้ห่างจากกัน



สิ่งที่ต้องคำนึง


จัดวางห้องน้ำน้องแมวอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก

- ขับถ่ายได้ทั้งในยามกลางวันหรือกลางคืน
- ตำแหน่งวางกระเบื้องเป็นสิ่งสำคัญ
 - การปรับเปลี่ยนที่ตั้งเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่ปัญหาไม่พึงประสงค์ในบ้านได้
- วางให้ห่างจากเด็กและสุนัขในบ้าน



- เลือกมุมที่เป็นส่วนตัว เพื่อให้ลูกแมวรู้สึกปลอดภัยเวลาใช้กระเบื้อง
- สุขอนามัย – หมีน้ำทำความสะอาดกระเบื้องแบบใหม่ไม่ชอบอยู่ในที่สกปรก ดังนั้นถ้ากระเบื้องไม่สะอาดพวกมันอาจเลือกไปขับถ่ายที่อื่นแทน

สิ่งสำคัญคือแมวหนึ่งตัวต้องมีกระเบื้องของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งอัน และอาจมีเพิ่มอีกหนึ่งอัน วางในจุดอื่นเพื่อให้มีบินใจว่าบ้องแมวจะรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเวลาเข้าห้องน้ำ



เคล็ดลับการวางแผน: ใส่อาหาร น้ำ และกระเบื้อง

สิ่งที่เจ้าของแมวมือใหม่บัง茫ทำผิดพลาด ได้แก่ การวางแผนใส่อาหาร น้ำ และกระเบื้องไว้ใกล้ๆ กัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้น้องแมวค้นหาและใช้งานได้ง่าย ซึ่งในความจริงแมวจะสามารถเดินน้ำได้ดีเมื่ออยู่ห่างจากกิ่บอาหาร รวมถึงแมวจะกินอาหารและน้ำในบริเวณที่ห่างจากกระเบื้องนั่นเอง



กรง/กระเพาเดินทางพกพา

หากคุณเจ้าของต้องการให้น้องแมวสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยกับภาระเคลื่อนย้ายสัตว์ ให้นำผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มที่คุณเคยมาวางไว้ภายในจะช่วยให้แมวมั่นใจมากขึ้น

- ตั้งกรง/กระเพาไว้ในบ้านบาริเวณที่แมวเดินไปเยี่ยมชมและสำรวจได้ จะช่วยให้แมวสามารถใช้เวลาเพื่อยอมรับสิ่งของชนนี้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านเจอร์อย่างหนึ่ง ถ้าหากโชคดีลูกแมวตัวน้อยอาจใช้มันเป็นสถานที่พักผ่อนเลยก็ได้ !

วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ลูกแมวคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยกรงพกพา คือการก้าวเดินสั้นๆ และมอบรางวัลให้แก่เจ้าตัวเล็กเมื่อหยุดเดินแต่ละก้าว ขณะที่กรงไม่เคลื่อนไหว วิธีนี้ช่วยให้ลูกแมวเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีนั่นเอง



- เดิน, หยุด, นอบร่างวัด – ทำไปทีละขั้นตอน วนให้ครบรอบเวลาระบวนการจนกว่าจะถึงรถของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น พร้อมวีดีโອվิธุ์ที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว และง่ายต่อใช้จริง ได้ที่ International Cat Care: <https://icatcare.org>

- การนำน้องแมวเข้ากรง/กระเบ้าพกพา – video
- การทำให้แมวคุณเคยกับการเดินทาง – video
- ช่วยให้แมวอยู่ในกรงพกพาอย่างมีความสุข – video
- กำให้บ้านคุณเป็นมิตรกับน้องแมว
- กระเบกราย – เลือกกระเบกรายอย่างไรให้ถูกอัน, ตำแหน่งการวางกระเบกราย และกระเบกสำหรับน้องแมว



9

สุขภาพที่ว้าวและความเป็นอยู่ที่ดี

ถึงแม้แมวเป็นสัตว์ที่รักอสratioอย่างมาก เจ้าของบางคนก็ยังรู้สึกต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสมาชิกตัวใหม่ในครอบครัว

การตกแต่งบัน

ช่วยเจ้าเหมียวให้มีชนบทเปล่งประกายงานได้ดี แต่สัปดาห์แรก ด้วยการแปลงบัน โดยใช้ชนบทแปลงโฉมอ่อน ๆ และ บันแปลงยาง หรือแปลงชนบทอ่อน รวมถึงการตัดแต่งบันลูกแมวทุกวันถ้าบันยาวมาก หรือแค่สัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง เพียงเท่านี้ เจ้าเหมียว ก็พร้อมจะส่งเสียงเพอร์ (Purr) เพื่อแสดงความรัก และคำขอบคุณด้วยความเต็มใจแล้ว

การดูแลฟัน

แมวต้องการการดูแลเช่นปาก เช่นเดียวกับในคน มีแมวจำนวนมากที่เจอปัญหาทันตกรรมตั้งแต่ยังอายุน้อย ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะแมวส่วนมากไม่ชอบการขัดฟัน จึงมีการพัฒนาอาหารบางประเภทขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคทางทันตกรรมลง ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่จะพาลูกแมวตัวน้อยไปทำความคุ้นเคยกับการดูแล ตรวจสุขภาพช่องปาก และทักษิรให้สัตวแพทย์ตรวจเช็คฟันของเจ้าเหมียว เป็นประจำทุกปี

การดูแลเล็บและอุ้งเท้า


อุปกรณ์ตัดเล็บพิเศษจะใช้สำหรับตัดเล็บกี๊ยวมาก ๆ ซึ่ง สัตวแพทย์จะเป็นคนแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ตัดเล็บชนิดไหน กี๊ยวเหมาะสมกับแมวของคุณ และควรตัดให้สับแค่ไหน สำหรับ การดูแลอุ้งเท้า ให้จำไว้ว่าพื้นผิวใดก็ตามที่คุณรู้สึกร้อนเกินไป ก็จะสัมผัส ก็ร้อนเกินไปสำหรับอุ้งเท้าลูกแมว เช่นกัน





การดูแลทุก

ตรวจสุขภาพของน้องแมวอย่างอ่อนโยน หากสังเกตพบความผิดปกติ ควรพาไปให้สัตวแพทย์ตรวจเช็คดู



อาการเจ็บปวดเรื้อรังและโรคภัย

ในบางคราวอาจพบว่าแมวเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หมายถึง การเป็นโรคในระยะเวลารายวัน บ่อยครั้งที่นักเป็นไปตลอดชีวิต ตัวอย่างเช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคลมชัก โรคไต และโรคความดับโลหิตสูง โชคดีที่ศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยาสมัยใหม่ได้พัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเหล่านี้ได้ สัตวแพทย์จะช่วยอันจัดัยในสิ่งที่เจ้าของเป็นกังวลเวลาที่พาน้องมาตรวจสุขภาพประจำปี หรือเวลาที่คุณพาน้องไปหาหมอเมื่อสังเกตพบสิ่งผิดปกติ



10

สรุปสิ่งสำคัญ สำหรับลูกแมว

การฉีดวัคซีน

โดยทั่วไปการฉีดวัคซีนจะเริ่มเมื่อลูกแมวอายุ 6-8 สัปดาห์ จนกระทั่งครบโปรแกรมวัคซีนสำหรับวัยเด็ก (ปกติจะสับสุดก่อนอายุ 16 สัปดาห์) และให้ฉีดวัคซีนเข็บกระตุบเพื่อเสริมการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

การป้องกัน ไข้ เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิตัวตืด และปรสิตอื่นๆ

การป้องกันปรสิต เป็นประจำทุกเดือน สามารถช่วยควบคุมเห็บ หมัด ไข้ พยาธิหนอนหัวใจ พวกพยาธิตัวตืด รวมถึงพยาธิกายในปอด และหากลูกแมวนี้อายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์ เจ้าของสามารถเลือกใช้ FRONTLINE ชนิดสเปรย์เพื่อจัดการปรสิตแบบตัวสัตว์เลี้ยงได้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้แม้กับลูกแมว

การให้อาหาร

การปรับโปรแกรมการให้อาหารเมื่อลูกแมวโตขึ้น จะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วน ปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ และโรคอื่นๆ กثيرตามมา เช่น โรคเบาหวาน โดยเจ้าของสามารถพูดคุย ขอคำแนะนำร่วมกับสัตวแพทย์ว่าอาหารชนิดไหนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงอายุของน้องแมว

การเคลื่อนย้าย

แม้แต่แมวที่สงบเสงี่ยมในเวลาปกติก็อาจพบความตื่นตระหนกได้ขณะขนย้าย ควรใช้กรงแมวที่แข็งแรงปลอดภัย และมีอากาศถ่ายเท ถ้าเป็นไปได้ควรปีช่องเปิดที่ด้านบนและด้านล่าง จะทำให้สามารถอุ่นน้องแมวที่ตื่นกลัวออกจากกรงได้ง่ายขึ้น





การกำหมัน

ลูกแมวจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุระหว่าง 5-8 เดือน การกำหมัน กั้งตัวผู้ และตัวเมียตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แมวส่วนใหญ่ชอบการถูกเย่าใจใส่ และจะส่งเสียงเพอร์ออกมาเมื่อพึง พอใจ สายสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นระหว่างคุณกับเพื่อนสี่ขาจะสร้างขึ้นเมื่อพวกมัน รู้สึกปลอดภัยและพอใจเมื่ออยู่ใกล้ๆ ตัวคุณ



แมวของเรารายุเท่าไหร่กันนะ ?



ช่วงชีวิตของแมว



อายุของแมว

0-1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
6 เดือน

อายุของมนุษย์

0-1 เดือน
2 ปี
4 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี



7 เดือน
12 เดือน
18 เดือน
2 ปี



3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี



ចំណែកអាយុម៉ោងម៉ោង



អាយុម៉ោងម៉ោង

7 ឆ្នាំ
8 ឆ្នាំ
9 ឆ្នាំ
10 ឆ្នាំ

អាយុម៉ោងបុច្ច័យ

44 ឆ្នាំ
48 ឆ្នាំ
52 ឆ្នាំ
56 ឆ្នាំ



11 ឆ្នាំ
12 ឆ្នាំ
13 ឆ្នាំ
14 ឆ្នាំ



15 ឆ្នាំ
16 ឆ្នាំ
17 ឆ្នាំ
18 ឆ្នាំ
19 ឆ្នាំ
20 ឆ្នាំ
21 ឆ្នាំ
22 ឆ្នាំ
23 ឆ្នាំ
24 ឆ្នាំ
25 ឆ្នាំ



NEXT
COMBO 

