

数学整理

o7k40shen

2020 年 11 月 21 日

目录

1	不等式	3
1.1	均值不等式	3
1.2	对数平均不等式	3
1.3	柯西不等式	3
1.4	排序不等式	4
1.5	权方和不等式	4
1.6	舒尔不等式	5
1.7	琴生不等式	5
2	函数	5
2.1	拉格朗日中值定理	5
2.2	拉格朗日乘数法	5
2.3	高次韦达定理	6
2.4	切比雪夫最佳逼近	7
2.5	泰勒展开	7
2.6	极值点偏移	7
2.7	最值函数基本定理	7
3	数列	7
3.1	不动点原理	7
4	组合数学	7
4.1	容斥原理	7

目录	2
4.2 伯努利装错信封问题	8
5 向量	8
5.1 极化恒等式	8
5.2 分点恒等式	8
5.3 三点共线定理	8
5.4 向量中值定理	8
5.5 向量数乘余弦定理	9
6 方法	9
6.1 主元法	9

1 不等式

1.1 均值不等式

H_n 为调和平均数、 G_n 为几何平均数、 A_n 为算数平均数、 Q_n 为平方平均数。任意 $x_i > 0$ 都成立时，有

$$H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$$

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

$$A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

$$Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

$$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$$

当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时取等号

1.2 对数平均不等式

$a \neq b$ 时，有

$$\sqrt{ab} < \frac{a-b}{\ln a - \ln b} < \frac{a+b}{2}$$

1.3 柯西不等式

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2$$

当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$ 时取等号

其中二维形式如下

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

当且仅当 $ad = bc$ 即 $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ 时取等

1.4 排序不等式

排序不等式表示如下

设有两组数 a_1, a_2, \dots, a_n 和 b_1, b_2, \dots, b_n , 满足 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ 且 $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, c_1, c_2, \dots, c_n 是 b_1, b_2, \dots, b_n 的乱序排列, 则有:

$$a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 \leq a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \dots = b_n$ 时取等号。便于记忆, 常记为:

反序和 \leq 乱序和 \leq 顺序和

1.5 权方和不等式

若 $a_i > 0$, $b_i > 0$, $m > 0$, 则有

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^{m+1}}{b_i^m} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^{m+1}}{\left(\sum_{i=1}^n b_i\right)^m}$$

即为

$$\frac{a_1^{m+1}}{b_1^m} + \frac{a_2^{m+1}}{b_2^m} + \dots + \frac{a_n^{m+1}}{b_n^m} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^{m+1}}{(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^m}$$

当且仅当 $a_i = \lambda b_i$ 时取等号

其中二维形式如下

对于正数 a, b, x, y , 有

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$$

当且仅当 $a:b = x:y$ 时取等号

也有

$$\frac{a^2}{ax} + \frac{b^2}{by} = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{ax+by}$$

当且仅当 $x = y$ 时取等号

1.6 舒尔不等式

$a, b, c \geq 0$ $t \in R$ 时, 有

$$a^t(a-b)(a-c) + b^t(b-a)(b-c) + c^t(c-a)(c-b) \geq 0$$

当且仅当 $a = b = c$, 或其中两个数相等且另一个等于零时, 取等号。特别的, 当 t 为非负偶数时, 此不等式对任意实数 a, b, c 成立。

1.7 琴生不等式

设 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸函数, 则对任意 $x_i \in I$ 及 $p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 有

$$\frac{\sum_{i=1}^n p_i \cdot f(x_i)}{\sum_{i=1}^n p_i} \geq f\left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n p_i}\right)$$

其中等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时成立, 若 $f(x)$ 在区间 I 上是上凸函数, 则不等号反向。

2 函数

2.1 拉格朗日中值定理

设 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

2.2 拉格朗日乘数法

【例题】若正数 a, b 满足 $2a + b = 1$, 则 $\frac{a}{2-2a} + \frac{b}{2-b}$ 的最小值为?
解: 构造拉格朗日函数

$$L(a, b, \lambda) = \frac{a}{2-2a} + \frac{b}{2-b} - \lambda(2a + b - 1)$$

令

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial a} = L_a &= \frac{1}{2(1-a)^2} - 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial b} = L_b &= \frac{2}{(2-b)^2} - \lambda = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = L_\lambda = -(2a + b - 1) = 0$$

联立解得

$$a = \frac{5 - 3\sqrt{2}}{2}, b = 3\sqrt{2} - 4, \lambda = \frac{1}{27 - 18\sqrt{2}}$$

从而

$$\frac{a}{2 - 2a} + \frac{b}{2 - b} = \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2}$$

此即为所求的最小值。

2.3 高次韦达定理

设 x_1, x_2, \dots, x_n 为如下方程的根

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

则有

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \dots + x_n &= -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_n x_{n-1} &= \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ &\dots \\ x_1 x_2 \dots x_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{aligned}$$

其中三次的形式如下

若 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$) 的 3 个根分别为 x_1, x_2, x_3 则有

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 &= \frac{c}{a} \\ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 &= -\frac{d}{a} \end{aligned}$$

2.4 切比雪夫最佳逼近

2.5 泰勒展开

2.6 极值点偏移

2.7 最值函数基本定理

定理一:

$$\min\{a, b\} \leq \frac{a+b}{2} \leq \max\{a, b\}$$
$$\min\{a, b\} \leq \sqrt{ab} \leq \max\{a, b\} \quad (a > 0, b > 0)$$

定理二:

$$\max\{|a+b|, |a-b|\} = |a| + |b|$$
$$\min\{|a+b|, |a-b|\} = ||a| - |b||$$

定理三:

$$\max\{|a|, |b|\} = \frac{|a+b|}{2} + \frac{|a-b|}{2}$$
$$\min\{|a|, |b|\} = \left| \frac{|a+b|}{2} - \frac{|a-b|}{2} \right|$$

3 数列

3.1 不动点原理

【例题】求 $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$ 的通项公式

其特征函数为 $f(x) = 2x + 1$, 令 $f(x) = x$, 解得 $x = -1$

带入得 $a_{n+1} - (-1) = 2(a_n - (-1))$, 即 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$, 之后根据等比数列可得 $a_n = 2^n - 1$

4 组合数学

4.1 容斥原理

建议根据韦恩图解题

4.2 伯努利装错信封问题

n 封信与 n 个信封全部错位的组合数为

$$f(n) = n! \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$

5 向量

5.1 极化恒等式

重要恒等式: $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$

极化恒等式: $4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 - (\mathbf{a} - \mathbf{b})^2$

5.2 分点恒等式

在 $\triangle ABC$ 中, M 为 BC 上一等分点

当 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{MC}$, 有

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{1+\lambda} \overrightarrow{AB} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overrightarrow{AC}$$

5.3 三点共线定理

在平面中 A, B, P 三点共线的充要条件是: 对于该平面内任意一点 O , 存在唯一的实数 x, y 使得:

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$$

且

$$x + y = 1$$

特别的有: 当 P 在线段 AB 上时, $x > 0, y > 0$

P 在线段 AB 之外时, $xy < 0$

5.4 向量中值定理

在 $\triangle ABC$ 中, M 为 BC 的中点, 则

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

对应的向量公式有:

$$a^2 + b^2 = 2 \left[\left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 \right]$$

5.5 向量数乘余弦定理

在 $\triangle ABC$ 中, 有

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2}$$

6 方法

6.1 主元法

【例题】 已知函数 $f(x) = \lg \frac{1+2^x+4^x \cdot a}{a^2-a+1}$, 其中 a 为常数, 若当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $f(x)$ 有意义, 求实数 a 的取值范围

由 $\frac{1+2^x+4^x \cdot a}{a^2-a+1} > 0$, 且 $a^2 - a + 1 = (a - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$

得 $1 + 2^x + 4^x \cdot a > 0$, 故 $a > -(\frac{1}{4^x} + \frac{1}{2^x})$

当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $y = \frac{1}{4^x}$ 和 $y = \frac{1}{2^x}$ 都是减函数, 所以 $y = -(\frac{1}{4^x} + \frac{1}{2^x})$ 单增, 且其最大值为 $-\frac{3}{4}$, 所以 a 取值为 $(-\frac{3}{4}, +\infty)$