

卒論中間発表

池上 慧

November 9, 2017

発表の流れ

1 目的

2 モデル

3 実証

研究対象

- 混雑現象の構造推定
- 混雑現象：プレイヤーは選択肢のうちどれかを必ず選ばなければならない、かつ選んだ選択肢を選んだ人数が多いほど効用が下がる状況を指す。

具体例

- 満員電車
- 私立大学の入試日決定
- テーマパークへの来場日決定
- 流行

先行研究

1 Viauoux (2007)

バスと車の移動手段選択における混雑現象の影響を推定。個人が混雑回避的行動を取っていることを明らかにした。

2 柳沼・福田 (2007,8)

Viauoux (2007) を定式化し直し、シミュレーションデータで推定が行えることを確認した。

3 松村他 (2009)

乗車する電車の選択における混雑モデルを推定。混雑に対する不効用を個人が持つことを明らかにした。

先行研究の課題と問題意識

- 何のデータも個人の意思決定に関するデータを用いている。
- 通勤時間などのデータについては他のデータソースから流用している。
- 推定手法の PML は収束が保障されない。

着眼点

より簡単にアグリゲートされたデータから混雑現象の構造推定はできないか。

モデルのポイント

- 「何割のプレイヤーがどの選択肢を選んだか」のデータと選択肢についてのデータのみを使用して推定できる。
- 個人についての heterogeneity を推定に利用する。
- わかりやすいのでラッシュ時の電車選択を考える。
- まだ2 選択肢についてしかできてない。

設定

- M 駅の T 日分の乗客数データ
- $m \in \{1 \cdots M\}$ で 1 つの駅を示すとして、そこで乗車する総人数は N_m
- X_i はプレイヤーの属性を含むベクトル
- Z_j は電車 j の属性を含むベクトル
- η_j^i はプレイヤーごとに持つ電車 j に対する観測不可能な選好 (public information)
- B_j^m は駅 m における電車 j への実現した乗車人数
- ϵ_j^i はプレイヤーが私的情報として持つ電車 j への選好

効用

駅 m を利用する個人 i の電車 j に対しての効用

$$X_i' \beta + Z_j' \gamma + \eta_j^i + \alpha B_j^m + \epsilon_j^i$$

ベイジアンナッシュ均衡

- ϵ_j^i は i, j それぞれに対して独立に同じ第 1 種極値分布に従う
- rational expectation の仮定の下では以下の方程式を満たすように毎日均衡としての電車 1 の期待乗車割合 ($E[b_{t,m}^{N_m}]$) が決定する
- $d_i^t = \eta_2^i - \eta_1^i$ とする

駅 m における t 日の均衡

$$E[b_{t,m}^{N_m}] = \frac{1}{N_m} \sum_{i=1}^{N_m} \frac{1}{1 + \exp\left((z_2^m - z_1^m)' \gamma + d_{i,m}^t + \alpha N(1 - 2E[b_{t,m}^{N_m}])\right)}$$

考え方

- データとして得られた毎日の電車 1 の乗車割合は先の均衡である
- 日々の均衡として得られた電車 1 の乗車割合をたくさん集めたものの平均 ($\widehat{E[b_m^{N_m}]}$) は t によらないモデルの均衡に収束するはず (要証明)
- t によらないモデルの均衡を出すために public information である個人の heterogeneity が従う分布 $F(\cdot)$ を仮定する
- この操作は最尤推定量のアナロジー

t によらないモデルの均衡

駅 m を利用する個人 i が電車 1 を利用する確率を離散選択の定式化で求めたものを $p_{1,m}^i$ で記す。この時以下が成立する。

$$p_{1,m}^i > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{1 + \exp \left((z_2^m - z_1^m)' \gamma + d_i + \alpha N (1 - 2E[b_m^{N_m}]) \right)} > \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow d_i < \alpha N_m (2E[b_m^{N_m}] - 1) - (z_2^m - z_1^m)' \gamma$$

ただし、 $E[b_m^{N_m}]$ は今知りたいモデルの均衡として求まる乗車割合である。

t によらないモデルの均衡

ここから即座に以下を得る。

$$E[b_m^{N_m}] = \frac{1}{2} + \frac{(z_2^m - z_1^m)' \gamma + F^{-1}(E[b_m^{N_m}])}{2\alpha N_m}$$

これより、分布 $F(\cdot)$ がサポートが有限で、 $\{z_j\}$ が有限のサポートを持ちかつパラメータ γ も有限であるなら、 $N \rightarrow \infty$ で $E[b_m^{N_m}] \rightarrow \frac{1}{2}$ であることがわかる。



