NOTE 01 TARIFICATION AUTOMOBILE

Du profil assuré à une prime expliquée.

GLM, Poisson et binomiale négative, prime bayésienne et crédibilité sur les coûts.

Objectif. Estimer le coût attendu des sinistres d'un contrat, puis ajuster cette estimation à son expérience. Le projet comprend un moteur Python, son équivalent navigateur et une interface métier.

Ce qui est effectivement réalisé

- Audit de la source originale `freMTPL2` : **677 991 contrats** et **26 444 sinistres**, sans incohérence entre les nombres et les montants disponibles.
- GLM Poisson pour la fréquence et Gamma pour le coût moyen ; comparaison d'un challenger NB2 et d'une sévérité plafonnée avec recharge des excédents.
- Calibration de l'hétérogénéité Poisson–Gamma ; prime bayésienne et crédibilité *structurelle* calculables depuis un historique saisi.
- Coefficients versionnés, exports traçables, tests de calcul et de parité Python/navigateur.

Un protocole séparant estimation et évaluation

	Apprentissage	Validation	Test
Contrats	407 317	135 471	135 203
Sinistres	15 909	5 302	5 233

Découpage stable par identifiant de contrat : environ 60 / 20 / 20. Les sinistres suivent le découpage de leur contrat. La préparation est ajustée sur l'apprentissage ; les variantes sont choisies sur la validation. Le test initial ne sert pas au réglage.

Résultat de validation à conserver. Sur le test : **10,33 M€ observés contre 12,54 M€ prédits**. Le ratio de charge observée/prédite est de **82,4 %**. Le projet est un démonstrateur calibré sur données historiques, sans approbation de tarif commercial actuel.

Source : CASdatasets, commit `227fb56b8734bdb7c0327a41180e01d2ddaeaf26`. Données approximativement 2011–2013. Modèle : `fremtpl2-2026-11-v1`. Les montants ne sont pas automatiquement actualisés aux conditions économiques de 2026.

1 Construire la prime pure avec deux GLM

Pour un assuré i, x_i décrit le profil, e_i l'exposition en années, N_i le nombre de sinistres et Y_{ik} leur coût. La charge est

$$S_i = \sum_{k=1}^{N_i} Y_{ik}.$$

Sous indépendance conditionnelle du nombre et des coûts, avec des coûts de même espérance,

$$\boxed{\mathbb{E}[S_i \mid x_i, e_i] = e_i \lambda_i m_i, \qquad \pi_i^0 = \lambda_i m_i.}$$

π_i^0 est la prime pure *annuelle*. $e_i \pi_i^0$ est la charge attendue sur la période.

Famille exponentielle et lien logarithmique

$$f(y;\theta,\phi) = \exp\left\{\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y,\phi)\right\}, \quad \mathbb{E}[Y] = b'(\theta), \quad \mathrm{Var}(Y) = a(\phi) b''(\theta).$$

Un GLM pose $g(\mu_i) = x_i^\top \beta$. Avec $g = \log$, la moyenne vaut $\exp(x_i^\top \beta) > 0$. Cela ne suppose pas une *loi exponentielle* pour les observations.

Fréquence : Poisson avec exposition

$$N_i \mid x_i, e_i \sim \mathrm{Poisson}(\mu_i), \quad \lambda_i = \exp(x_i^\top \beta_N), \quad \log \mu_i = \underbrace{\log e_i}_{\text{offset}} + x_i^\top \beta_N.$$

L'ajustement sur N_i/e_i, pondéré par e_i, donne les mêmes équations de moyenne. Le coefficient de l'offset est fixé à 1 ; l'exposition n'est pas une variable explicative libre.

Sévérité : Gamma à lien log

Pour chaque sinistre strictement positif :

$$Y_{ik} \mid x_i \sim \mathrm{Gamma}\left(\text{forme} = \frac{1}{\phi_Y}, \ \text{taux} = \frac{1}{\phi_Y m_i}\right), \quad m_i = \exp(x_i^\top \beta_Y), \quad \mathrm{Var}(Y_{ik} \mid x_i) = \phi_Y m_i^2.$$

La convention est *forme/taux*. Le lien log de la Gamma est valide et non canonique. Les coefficients de moyenne sont ajustés par minimisation de la perte Gamma, éventuellement pénalisée en L^2. Un facteur de niveau est calculé sur l'apprentissage uniquement pour équilibrer la somme des coûts prédits par sinistre.

Variables : tranches d'âge conducteur et véhicule, puissance fiscale, carburant, zone et région historique. L'identifiant est exclu. Le bonus-malus est exclu pour éviter de réutiliser explicitement le même historique dans l'ajustement a posteriori. Les bornes sont fixes ; l'encodage est ajusté sur l'apprentissage.

2 Poisson, NB2 et validation de la charge

Une variance plus souple ne garantit pas une meilleure prime

Pour une même forme de moyenne $\mu_i = e_i \exp(x_i^\top \beta)$:

$$\begin{aligned} \text{Poisson :} \quad & \operatorname{Var}(N_i \mid x_i, e_i) = \mu_i, \\ \text{NB2 :} \quad & \operatorname{Var}(N_i \mid x_i, e_i) = \mu_i + \mu_i^2/r, \quad r > 0. \end{aligned}$$

La dispersion de Pearson du Poisson sur apprentissage vaut environ $1{,}764$. Le challenger NB2 réestime conjointement β et r par maximum de vraisemblance, en conservant le modèle de coût. Il donne $\widehat{r} \simeq 0{,}6950$.

Indicateur	Poisson	NB2
Log-vraisemblance négative moyenne, validation	0,162524	0,161743
O/P nombre, test déjà consulté	98,92 %	98,07 %
O/P charge, test déjà consulté	82,41 %	81,56 %
Déviance Tweedie de prime pure, test	80,511	80,544

Décision mesurée : conserver Poisson comme référence. La NB2 améliore ici la description probabiliste des nombres, mais pas la prime pure. Le test ayant déjà été vu, cette comparaison supplémentaire est un diagnostic, pas une nouvelle validation indépendante.

Le point sensible : les gros sinistres

Le coût moyen observé est d'environ **2 367€** en apprentissage, **2 248€** en validation et **1 974€** en test. Les dix plus gros sinistres représentent **21,4 %** de la charge d'apprentissage.

La dispersion Gamma estimée par vraisemblance est $\widehat{\phi}_Y \simeq 1{,}3154$, alors que le second moment relatif empirique atteint environ $30{,}0965$. Cet écart signale que la Gamma ajustée ne décrit pas bien toute la queue des coûts.

Une variante a testé un plafond à 100 000€ avec recharge des excédents. Elle n'a pas été retenue sur la validation. La décomposition à étudier reste

$$\mathbb{E}[Y \mid x] = \mathbb{E}[\min(Y, u) \mid x] + \mathbb{E}[(Y - u)_+ \mid x].$$

Un plafonnement sans recharge change la cible. Multiplier les primes par le ratio 0,824 observé sur le test ferait aussi perdre l'indépendance de cette évaluation. Les corrections futures doivent être choisies ailleurs, puis évaluées sur de nouvelles données.

3 Prime bayésienne : apprendre du nombre

Un effet individuel multiplicatif

La fréquence du GLM décrit la moyenne du profil. On introduit un risque latent U_i :

$$U_i \mid x_i \sim \text{Gamma}(r, r), \qquad \mathbb{E}[U_i] = 1, \quad \text{Var}(U_i) = 1/r,$$

$$N_i(t_i) \mid U_i, x_i \sim \text{Poisson}(t_i \lambda_i U_i).$$

En intégrant U_i, le nombre suit une NB2. La surdispersion est donc cohérente avec une hétérogénéité individuelle, sans prouver que celle-ci persiste dans le temps.

Le modèle livré estime r par vraisemblance marginale sur l'apprentissage, *en maintenant les moyennes du GLM Poisson figées* : $\widehat{r} \simeq 0{,}6984$. Cette estimation diffère du r du challenger NB2, où les coefficients sont réestimés conjointement.

Conjugaison et fréquence ajustée

Après observation de n_i sinistres sur t_i années assurées, à profil comparable :

$$\boxed{U_i \mid n_i, t_i, x_i \sim \text{Gamma}(r + n_i,\ r + t_i \lambda_i).}$$

La fréquence annuelle future ajustée est

$$\widetilde{\lambda}_i = \lambda_i \frac{r + n_i}{r + t_i \lambda_i} = \frac{\alpha_i + n_i}{\beta_i + t_i}, \quad \alpha_i = r, \quad \beta_i = \frac{r}{\lambda_i}.$$

Le coût moyen m_i reste celui du modèle initial :

$$\boxed{\pi_i^B = m_i \frac{\alpha_i + n_i}{\beta_i + t_i} = (1 - Z_i)\pi_i^0 + Z_i\, m_i \frac{n_i}{t_i}, \qquad Z_i = \frac{t_i}{\beta_i + t_i}.}$$

L'écriture de droite vaut pour $t_i > 0$. Sans historique, la formule de gauche redonne π_i^0.

Illustration calculée, historique fictif. Profil : conducteur de 45 ans, véhicule de 7 ans, 6 CV, diesel, zone C, région Centre. Le modèle donne $\lambda \simeq 0{,}08054$, $m \simeq 1\,959{,}86$ et $\beta \simeq 8{,}672$.
Prime pure initiale : **157,84€/an**. En supposant trois années sans sinistre, la prime bayésienne vaut **117,27€/an**, dans la base économique historique du modèle.

Cette version ajuste la fréquence, pas la sévérité individuelle. Elle suppose un profil comparable sur l'historique et la période future. La performance de renouvellement n'est pas validée sur un panel longitudinal.

4 Crédibilité : apprendre des coûts

Le cadre non paramétrique de référence

Pour une charge annuelle X et un risque latent Θ, on définit

$$v = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(X \mid \Theta)], \qquad a = \mathrm{Var}(\mathbb{E}[X \mid \Theta]), \qquad K = v/a.$$

La prime de crédibilité de Bühlmann s'écrit

$$\pi^C = (1 - Z)\mu + Z\overline{X}, \qquad Z = \frac{t}{t + K}.$$

Estimer v et a non paramétriquement exige des observations répétées de risques comparables. La seule coupe annuelle `freMTPL2` ne fournit pas cette validation longitudinale.

Ce qui est implémenté : une crédibilité structurelle

Sous le modèle collectif avec fréquence $\lambda_i U_i$, coûts conditionnellement indépendants et moyenne m_i :

$$v_i = \lambda_i \mathbb{E}[Y^2 \mid x_i], \qquad a_i = \lambda_i^2 m_i^2 / r.$$

On en déduit

$$\boxed{K_i = \frac{r}{\lambda_i}\, q_i, \qquad q_i = \frac{\mathbb{E}[Y^2 \mid x_i]}{m_i^2}.}$$

Le moteur estime sur l'apprentissage un second moment relatif commun aux profils :

$$\widehat{q} = \frac{1}{M_{\text{train}}} \sum_{k \in \text{train}} \left(\frac{Y_k}{\widehat{m}(x_k)} \right)^2 \simeq 30{,}0965.$$

Il suppose donc une stabilité du second moment relatif entre profils, à vérifier. Cette estimation empirique de queue n'est pas remplacée par le moment théorique $1 + \widehat{\phi}_Y$ de la Gamma ajustée.

Pour une charge historique totale S_i^{hist} et une exposition totale t_i :

$$\boxed{\pi_i^C = (1 - Z_i)\pi_i^0 + Z_i \frac{S_i^{\text{hist}}}{t_i}, \qquad Z_i = \frac{t_i}{t_i + K_i}.}$$

Pour des périodes partielles, cette pondération suppose une variance du coût annualisé inversement proportionnelle à l'exposition, comme dans une extension de type Bühlmann–Straub.

Sur le profil illustré précédemment, $K \simeq 260{,}996$ années. Avec trois années sans sinistre, la prime de crédibilité vaut **156,05€/an**. Le faible poids des coûts individuels reflète ici leur forte variabilité et les hypothèses structurelles ; il ne s'agit pas d'un réglage arbitraire $K = 4$.

5 Du coût attendu au montant proposé

Base économique et durée de couverture

Le tarif est exprimé dans la base économique historique de la source. Si le métier fournit un facteur d'évolution des coûts I, le moteur utilise $m_i^{\text{cible}} = I\, m_i$. Ce facteur doit être justifié ; $I = 1$ n'actualise rien. Les charges historiques saisies doivent être exprimées dans la même base.

Pour une exposition future $e_i^\star$ et la prime annuelle retenue π_i :

$$P_i^{\text{pure}} = e_i^\star \pi_i.$$

Avec des frais fixes F, un taux de frais variables f et une marge g, exprimés en proportions du montant HT :

$$P_i^{HT} = P_i^{\text{pure}} + F + (f+g)P_i^{HT}, \qquad \boxed{P_i^{HT} = \frac{e_i^\star \pi_i + F}{1-f-g}}, \quad f+g<1.$$

Ces chargements sont des hypothèses métier, initialisées à zéro. La base de sinistres ne permet pas de calibrer les frais compagnie, la fiscalité, la réassurance ou les objectifs de capital. La mensualisation affichée est un quotient, sans frais de fractionnement.

Traçabilité et contrôles livrés

- Source figée, empreintes des fichiers, versions des dépendances et coefficients exportés.
- Contrôles de domaine : âges, puissance, modalités, expositions et nombres entiers.
- Séparation annuel/période ; historique sans exposition refusé ; absence d'historique correctement traitée.
- Parité Python/navigateur vérifiée sur 36 situations de calcul et 24 profils synthétiques.
- Dossier JSON contenant version du modèle, empreinte, hypothèses, profil et résultats ; absence de stockage automatique des historiques dans l'application.

Avant un usage compagnie : obtenir un portefeuille récent avec garanties et maturité des coûts comparables ; revoir la queue de sévérité ; acquérir un panel de renouvellements ; fixer les hypothèses économiques ; obtenir une revue actuarielle indépendante. Le test actuel est connu et ne peut plus servir d'évaluation finale indépendante d'un nouveau réglage.

Code, résultats et références

- Dépôt : kelian19/assurance-tarification. Voir `reports/MODEL_CARD.md`, `reports/POISSON_VS_NB.md` et `artifacts/model.json`.
- CASdatasets : documentation freMTPL2.
- Scikit-learn : fréquence, sévérité et régression Tweedie.
- Statsmodels : paramétrisation NB2.
- Nicolas Baradel, *Mathématiques de l'assurance dommages*, cours fourni, version du 8 septembre 2026, p. 3–24.