

Nama :Ariski Myardi

Kelas : TK-46-04

Nim : 1103220019

A. Definisi cardiac arrest

Cardiac Arrest atau henti jantung adalah hilangnya fungsi jantung secara mendadak dan tiba-tiba yang dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari apakah mereka telah didiagnosis menderita penyakit jantung atau tidak. Henti jantung ditandai dengan henti napas dan henti jantung Hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan sangat mendadak . Gagal jantung adalah hilangnya kemampuan jantung secara tiba-tiba untuk mempertahankan aliran darah normal dan memasok oksigen ke otak dan organ vital lainnya karena jantung tidak berkontraksi secara efektif.

Pada henti jantung, jantung berhenti berdetak dan harus dihidupkan kembali. Hal ini disebabkan oleh masalah pada sistem kelistrikan jantung yang disebabkan oleh irama jantung yang tidak normal (aritmia). Jantung tidak hanya berhenti berdetak, tetapi organ lain seperti otak dan paru-paru juga berhenti karena tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen. Dalam beberapa kasus, serangan jantung adalah kondisi sementara selama keadaan darurat medis. Banyak pasien memiliki gejala peringatan hingga sebulan sebelumnya, bahkan jika mereka tidak memiliki penyakit jantung. Namun jika pasien tidak segera diobati, serangan jantung bisa berakibat fatal dalam hitungan menit.

B. Kondisi Kesehatan apa saja yang meningkatkan resiko terjadinya kondisi cardiac arrest?

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung mendadak adalah:

- Kebiasaan merokok
- Obesitas dan obesitas morbid
- Diabetes
- Apnea tidur
- Gagal ginjal kronis
- Tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Kadar kolesterol tinggi
- Sindrom Serigala Parkinson Putih
- Ketidakseimbangan kadar kalium dan magnesium dalam darah
- Penggunaan narkoba, seperti kokain atau amfetamin

- Riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau serangan jantung mendadak
- Jarang berolahraga dan tidak aktif bergerak

C. Apakah jenis kelamin (laki-laki/perempuan) menentukan tingkat kerentanan terkena kondisicardiac arrest? Jelaskan jawabanmu!

Henti jantung (Cardiac Arrest) adalah kondisi yang sangat serius dengan tingkat kejadian yang cukup tinggi. Diperkirakan bahwa hingga 7 juta serangan jantung fatal terjadi setiap tahun. Apalagi kondisi tersebut lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita, dengan rasio 3: 1. Kasus henti jantung juga umum terjadi pada orang berusia 45 hingga 75 tahun. Orang dengan masalah atau penyakit jantung juga rentan terhadap kondisi ini.

D. Mengapa kondisi kerumunan dengan densitas manusia yang tinggi (crowded) memicu terjadinyakondisi cardiac arrest? Jelaskan jawabanmu!

Semakin besar kerumunan, semakin tinggi risiko kerumunan. Terjebak dalam kerumunan atau jatuh menekan dada Anda, tidak menyisakan ruang bagi paru-paru Anda untuk mengembang dan mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya, orang tersebut mengalami kesulitan bernapas. Kadar oksigen dalam tubuh mulai turun, menyebabkan kondisi yang disebut hipoksia. Kehilangan kendali, kepanikan, dan ketegangan juga meningkatkan jumlah karbon dioksida melalui jumlah pegawai dan adrenalin. \

Akibatnya, pembuluh darah menyempit dan sirkulasi oksigen terganggu. Hal ini menyebabkan orang pingsan atau mengalami serangan jantung saat mereka didorong ke kerumunan. Ketika jantung tiba-tiba berhenti berdetak, darah berhenti mengalir ke otak dan organ vital lainnya. Tanpa pengobatan segera, serangan jantung mendadak biasanya dapat menyebabkan kematian dalam beberapa menit.

E. Apa yang dimaksud CPR?

CPR atau resusitasi jantung paru merupakan pertolongan pertama yang sangat penting untuk menyelamatkan pasien henti jantung. Prosedur ini terdiri dari kompresi dada, pembukaan jalan napas, dan pernapasan buatan.

F. Jelaskan mengapa CPR dapat menjadi pertolongan pertama untuk kondisi cardiac arrest

Jika keadaan darurat diidentifikasi saat pasien tidak responsif atau tidak bernapas, resusitasi jantung paru (RJP), atau dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai resusitasi jantung paru (RJP), dapat dilakukan terlebih dahulu. Langkah bantuan medis. Sambil menunggu ambulans atau bantuan medis tiba, prosedur CPR membantu memulihkan kemampuan tubuh untuk bernapas dan mengedarkan darah. Ini membuat organ tetap hidup dan berfungsi.

tidak menjamin 100% keamanan pribadi, tetapi setidaknya CPR meningkatkan keselamatan pasien dibandingkan tanpa CPR sama sekali.

G. Bagaimana metode CPR yang benar?

Secara umum, prosedur CPR dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kompresi, saluran udara, dan

pernapasan. Berikut langkah-langkahnya:

- Kompresi Dada (Compression)

Untuk melakukan kompresi dada, pertama-tama letakkan satu telapak tangan di tengah dada pasien, dan tangan lainnya di atasnya. Kemudian, tekan dada pasien henti jantung 100-120 kali per menit. Kecepatan tekanan adalah 1-2 tekanan per detik. Lakukan kompresi dada ini sampai perhatian medis tiba, atau sampai pasien merespons.

- Membuka Saluran napas (Airways)

Jika pasien henti jantung tidak menunjukkan respon, langkah selanjutnya adalah airways atau membuka jalan napas. Caranya, angkat kepala pasien dengan meletakkan tangan di dahi, lalu angkat dagu pasien secara perlahan.

- Bantuan Pernapasan (Breathing)

Setelah dua langkah ini, pasien belum menunjukkan tanda-tanda pernapasan? Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan pernapasan dari mulut. Caranya, cubit hidung pasien henti jantung, lalu posisikan mulut Anda di mulutnya. Berikan napas dengan menghembuskan udara dari mulut dua kali. Lakukan ini sambil memperhatikan apakah dada pasien mengembang dan berkontraksi seolah-olah dia bernafas. Jika dada pasien tidak mengembang dan mengempis, berarti pernapasan buatan tidak benar. Coba perbaiki posisi leher pasien, atau periksa apakah ada sumbatan pada jalan napas. Setelah itu, lakukan lagi 30 kali kompresi dada, lalu bergantian dengan 2 napas buatan. Ulangi siklus ini sampai bantuan medis atau ambulans tiba, atau sampai pasien mulai bernapas dan bergerak. Penting untuk dipahami bahwa jika Anda belum terlatih atau belum menguasai prosedur CPR, Anda hanya boleh melakukan kompresi dada (CPR hanya dengan tangan). Jangan berikan pernapasan buatan.