

2023 年度
芝浦工業大学 システム理工学部
数理科学科

総合研究論文

多様体の次元を調べる方法

Methods for Investigating the Dimension of
Manifolds



BV20052

あ お み け ん し
青見 健志

指導教員： 亀子 正樹 教授

目次

1	はじめに	2
2	準備	3
2.1	連続写像と C^r 級写像	3
2.2	位相空間	3
3	C^r 級多様体と C^r 級写像	4
3.1	C^r 級多様体	4
3.2	C^s 級写像	7
4	接ベクトル空間	8
4.1	接ベクトル空間	8
4.2	C^r 級写像の微分	12
5	多様体の次元を調べる方法	15
5.1	写像の局所的性質	15
5.2	C^r 級部分多様体	18
5.3	多様体の次元の具体的な計算	20
6	おわりに	21

1 はじめに

2 準備

2.1 連続写像と C^r 級写像

2.2 位相空間

3 C^r 級多様体と C^r 級写像

3.1 C^r 級多様体

定義 3.1. 位相空間 X の開集合 U から m 次元数空間 \mathbb{R}^m のある開集合 U' への同相写像

$$\varphi : U \rightarrow U'$$

があるとき, (U, φ) を m 次元座標近傍といい, φ を U 上の局所座標系という.

(U, φ) には局所座標系 (x_1, \dots, x_m) が描かれていると考え, $(U; x_1, \dots, x_m)$ とも表すこととする.

定義 3.2. (U, φ) を位相空間 X 内の局所座標近傍とする. U 内の任意の点 p に対して $\varphi(p) \in \mathbb{R}^m$ であるから,

$$\varphi(p) = (x_1, \dots, x_m)$$

と書ける. (x_1, \dots, x_m) を (U, φ) に関する p の局所座標という.

定義 3.3. 位相空間 M が次の条件 (1), (2) を満たすとき, M を m 次元位相多様体という.

(1) M はハウスドルフ空間である.

(2) M 内の任意の点 p に対して, p を含む m 次元座標近傍 (U, φ) が存在する.

定義 3.4. m 次元位相多様体 M の 2 つの座標近傍 (U, φ) , (V, ψ) が交わっているとき, 同相写像

$$\psi \circ \varphi : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

を (U, φ) から (V, ψ) への座標変換という.

定義 3.5. $r \geq 1$ を自然数または ∞ とする. 位相空間 M が次の条件 (1), (2), (3) を満たすとき, M を m 次元 C^r 級多様体という.

(1) M はハウスドルフ空間である.

(2) M は m 次元座標近傍により被覆される. すなわち, M の m 次元座標近傍からなる族 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ があって,

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$$

が成り立つ.

(3) $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ であるような任意の α, β に対して, 座標変換

$$\psi \circ \varphi : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

は C^r 級写像である.

定理 3.6. m 次元球面 $S^m \in \mathbb{R}^{m+1}$ を

$$S^m = \{(x_1, \dots, x_{m+1}) | x_1^2 + \dots + x_{m+1}^2 = 1\}$$

と定義すると, S^m は m 次元 C^∞ 級多様体である.

証明. 定義 3.5 の条件 (1), (2), (3) を確かめる.

(1) \mathbb{R}^{m+1} はハウスドルフ空間であるから, その部分空間として, S^m はハウスドルフ空間である.

(2) S^m の $2(m+1)$ 個の開集合 U_i^+, U_i^- ($i = 1, \dots, m+1$) を次のように定義する.

$$U_i^+ = \{(x_1, \dots, x_i, \dots, x_{m+1}) \in S^m | x_i > 0\}$$

$$U_i^- = \{(x_1, \dots, x_i, \dots, x_{m+1}) \in S^m | x_i < 0\}$$

S^m はこれら U_i^+, U_i^- ($i = 1, \dots, m+1$) で被覆される. 写像 $\varphi_i^+ : U_i^+ \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\varphi_i^- : U_i^- \rightarrow \mathbb{R}^m$ をそれぞれ次のように定義する.

$$\varphi_i^+(x_1, \dots, x_i, \dots, x_{m+1}) = (x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1})$$

$$\varphi_i^-(x_1, \dots, x_i, \dots, x_{m+1}) = (x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1})$$

ここで, \hat{x}_i は x_i を取り去るという意味である. このとき,

$$(\varphi_i^+)^{-1}(x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1}) = (x_1, \dots, \sqrt{1 - \|(x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1})\|^2}, \dots, x_{m+1})$$

$$(\varphi_i^-)^{-1}(x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1}) = (x_1, \dots, -\sqrt{1 - \|(x_1, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_{m+1})\|^2}, \dots, x_{m+1})$$

であり, φ_i^+, φ_i^- はそれぞれ, U_i^+, U_i^- から \mathring{D}^m への同相写像である. ただし, \mathring{D}^m は \mathbb{R}^m の原点を中心とする m 次元単位開円板である. よって, S^m は $2(m+1)$ 個の座標近傍 $(U_1^+, \varphi_1^+), (U_1^-, \varphi_1^-), \dots, (U_{m+1}^+, \varphi_{m+1}^+), (U_{m+1}^-, \varphi_{m+1}^-)$ で被覆される.

(3) $2(m+1)$ 個の座標近傍の間の座標変換がすべて C^∞ 級であることを示す.

$1 \leq a, b \leq 2(m+1)$ を満たす互いに異なる自然数 a, b に対して,

(i) (U_a^+, φ_a^+) と (U_b^+, φ_b^+)

(ii) (U_a^-, φ_a^-) と (U_b^-, φ_b^-)

(iii) (U_a^+, φ_a^+) と (U_b^-, φ_b^-)

の間の座標変換を調べればよい.

(i) の場合,

$$\begin{aligned} U_a^+ \cap U_b^+ &= \{(x_1, \dots, x_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1}) \in S^m \mid x_a > 0, x_b > 0\} \\ \varphi_a^+(U_a^+ \cap U_b^+) &= \{(x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1}) \in \mathring{D}^m \mid x_b > 0\} \\ \varphi_b^+(U_a^+ \cap U_b^+) &= \{(x_1, \dots, x_a, \dots, \hat{x}_b, \dots, x_{m+1}) \in \mathring{D}^m \mid x_a > 0\} \\ &(\varphi_a^+)^{-1}x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1}) \\ &= (x_1, \dots, \sqrt{1 - \|(x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1})\|^2}, \dots, x_b, \dots, x_{m+1}) \end{aligned}$$

この式から

$$\begin{aligned} \varphi_b^+ \circ (\varphi_a^+)^{-1}(x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1}) \\ = (x_1, \dots, \sqrt{1 - \|(x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1})\|^2}, \dots, \hat{x}_b, \dots, x_{m+1}) \end{aligned}$$

これは $\|(x_1, \dots, \hat{x}_a, \dots, x_b, \dots, x_{m+1})\|^2 < 1$ の範囲で C^∞ 級なので,

$\varphi_b^+ \circ (\varphi_a^+)^{-1}$ は定義域 $\varphi_a^+(U_a^+ \cap U_b^+) \subset \mathring{D}^m$ で C^∞ 級である.

同様にして (ii), (iii) の場合についても座標変換が C^∞ 級であることが分かる.

以上より, S^m は m 次元 C^∞ 級多様体であることが分かった. □

定義 3.7. $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ を m 次元 C^r 級多様体 M の 1 つの m 次元 C^r 級座標近傍とする. M の開集合 V と V から \mathbb{R}^m への写像 ψ の対 (V, ψ) が次の条件 (1), (2) を満たしているとき, (V, ψ) は $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ と両立するという.

(1) $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^m$ の像 $\psi(V)$ は \mathbb{R}^m の開集合で ψ は V から $\psi(V)$ への同相写像である.

(2) $V \cap U_\alpha \neq \emptyset$ となる α に対しては, $\psi \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi(V \cap U_\alpha) \rightarrow \psi(V \cap U_\alpha)$ は C^r 級写像である.

命題 3.8. $(V_1, \psi_1), (V_2, \psi_2)$ がともに与えられた座標近傍系 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ と両立していて, $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ とすると, $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ は C^r 級写像となる.

証明. 任意の点 $x \in V_1 \cap V_2$ に対し, $x \in U_\alpha$ となる $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ が座標近傍系の中に存在する.

$$\psi_2 \circ \psi_1^{-1} : \psi_1(V_1 \cap V_2 \cap U_\alpha) \rightarrow \psi_2(V_1 \cap V_2 \cap U_\alpha)$$

は $(\psi_2 \circ \varphi_\alpha^{-1}) \circ (\psi_1 \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}$ と分解され, $(\psi_2 \circ \varphi_\alpha^{-1}), (\psi_1 \circ \varphi_\alpha^{-1})^{-1}$ はそれぞれ $x \in V_1 \cap V_2$ に関して C^r 級であるから, $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ も x に関して C^r 級である. いま, $x \in V_1 \cap V_2$ は任意であったから, $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ は C^r 級写像である. □

定義 3.9. 位相空間 M 上に C^r 級座標近傍系 $\mathcal{S} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ が与えられているとする. \mathcal{S} と両立する (V, ψ) の全体集合 $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{S})$ を M 上の極大な C^r 級座標近傍系とする. ここで, 極大とは \mathcal{M} と両立する全ての (U, φ) が $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{S})$ に属することをいう. この $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\mathcal{S})$ のことを \mathcal{S} から決まる M の C^r 級極大座標近傍系という.

以降, C^r 級多様体 M が C^r 級座標近傍系 \mathcal{S} によって定義されたとき, M には \mathcal{S} から決まる C^r 級極大座標近傍系 $\mathcal{M}(\mathcal{S})$ を与え, $(M, \mathcal{M}(\mathcal{S}))$ を考えるものとする.

3.2 C^s 級写像

M, N を m 次元, n 次元の C^r 級多様体とし, f を連続写像とする.

定義 3.10. M, N の C^r 級座標近傍 $(U, \varphi), (V, \psi)$ が存在し,

$$f(U) \subset V$$

が成り立つ. U と V の中には座標近傍系 $(x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_n)$ があるから, $f|U : U \rightarrow V$ を

$$(y_1, \dots, y_n) = \psi^{-1} \circ f \circ \varphi(x_1, \dots, x_m)$$

と表示することができる. この表示の $\psi^{-1} \circ f \circ \varphi$ を f に書き直したものの $((y_1, \dots, y_n) = f(x_1, \dots, x_m))$ を $(U; x_1, \dots, x_m)$ と $(V; y_1, \dots, y_n)$ に関する f の局所座標表示という.

定義 3.11. 連続写像 $f : M \rightarrow N$ が 1 点 $p \in M$ において C^s 級であるとは, p を含む M の C^r 級座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ と $f(p)$ を含む N の座標近傍 $(V; y_1, \dots, y_n)$ が存在して,

$$(1) f(U) \subset V$$

$$(2) (U; x_1, \dots, x_m) \text{ と } (V; y_1, \dots, y_n) \text{ に関する } f \text{ の局所座標表示が } C^s \text{ 級である. (ただし, } 0 \leq s \leq r \leq \infty)$$

この 2 つの条件が成り立つことである. f が任意の点 $p \in M$ で C^s 級であるとき, f は C^s 級写像であるという.

命題 3.12. 連続写像 $f : M \rightarrow N$ が 1 点 $p \in M$ において C^s 級であるという性質は, $p, f(p)$ をそれぞれ含む C^r 級座標近傍 $(U, \varphi), (V, \psi)$ の選び方によらない. (ただし, $0 \leq s \leq r \leq \infty$)

証明. f は $p \in M$ において $(U, \varphi), (V, \psi)$ に関して C^s 級であると仮定する. $f(U') \subset V', U' = U, V' = V$ となるような $p, f(p)$ をそれぞれ含む別の C^r 級座標近傍 $(U', \varphi'), (V, \psi')$ をとると, $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}$ は

$$\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \varphi')$$

と分解される. $\psi' \circ \psi^{-1}$, $\varphi \circ \varphi'$ はそれぞれ M , N における座標変換であるから C^r 級であり, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ は仮定より C^s 級であるから, $\psi' \circ f \circ \varphi'^{-1}$ は C^s 級である. よって命題は証明された. \square

命題 3.13. M , N , Q を C^r 級多様体とする. $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow Q$ がともに C^s 級写像なら, 合成写像 $g \circ f: M \rightarrow Q$ も C^s 級である. (ただし, $0 \leq s \leq r \leq \infty$)

証明. (1) p を M の任意の点とすると, g は C^s 級写像より, $g(V) \subset W$ となうような $f(p)$, $g(f(p))$ を含む座標近傍 (V, ψ) , (W, ω) が存在する. また, f は C^s 級写像より, $f(U) \subset V$ となうような p を含む座標近傍 (U, φ) が存在する. よって, 任意の点 $p \in M$ において $g \circ f(p) \in W$ となるような p , $g \circ f(p)$ を含む座標近傍 (U, φ) , (W, ω) の存在を示せた.

(2) $\omega \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1}$ は

$$\omega \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1} = (\omega \circ g \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ f \circ \varphi^{-1})$$

と分解される. g は C^s 級写像より, $\omega \circ g \circ \psi^{-1}$ は C^s 級, f は C^s 級写像より, $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ は C^s 級であるから, $\omega \circ (g \circ f) \circ \varphi^{-1}$ は C^s 級となる.

以上より, 合成写像 $g \circ f: M \rightarrow Q$ は C^s 級である. \square

定義 3.14. M , N を C^r 級多様体とする. $f: M \rightarrow N$ が C^s 級微分同相写像であるとは, 次の条件 (1), (2) を満たすことをいう.

(1) $f: M \rightarrow N$ は全単射 (1 対 1 かつ上への写像) である.

(2) $f: M \rightarrow N$ と $f^{-1}: N \rightarrow M$ はともに C^s 級写像である.

命題 3.15. M を m 次元 C^r 級多様体, V を M の開集合, V' を \mathbb{R}^m の開集合とする. また, $\varphi: V \rightarrow V'$ を同相写像とする. このとき, (V, φ) が M の C^r 級座標近傍になるための必要十分条件は, $\varphi: V \rightarrow V'$ が, C^r 級微分同相写像であることである.

証明. まず, (V, φ) が C^r 級座標近傍なら, $\varphi: V \rightarrow V'$ が, C^r 級微分同相写像であることを証明する. $\varphi^{-1} \circ \varphi: V' \rightarrow V'$ が C^r 級であることを示せばよい. \square

4 接ベクトル空間

4.1 接ベクトル空間

M を m 次元 C^r 級多様体とし ($1 \leq r \leq \infty$), M の 1 点 p を通る C^r 級曲線 c を考える. ここで, c のパラメータ t は $-\epsilon \leq t \leq \epsilon$ の範囲を動くとし, $c(0) = p$ であるとする.

定義 4.1. 点 p における方向微分 \mathbf{v} とは, 点 p の開近傍上で定義された C^r 級関数 f に実数 $\mathbf{v}(f)$ を対応させる操作であって, 次の性質 (0), (1), (2) をもつものである.

(0) f と g が点 p の十分小さな近傍で上で一致すれば, $\mathbf{v}(f) = \mathbf{v}(g)$.

(1) $\mathbf{v}(af + bg) = a\mathbf{v}(f) + b\mathbf{v}(g)$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

(2) $\mathbf{v}(fg) = \mathbf{v}(f)g(p) + \mathbf{v}(g)f(p)$

例 4.2. c に沿う ($t = 0$ における) 方向微分点 $p \in M$ の開近傍 U で定義された任意の C^r 級関数 f を考える. $c: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow U$ と $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ の合成関数 $f(c(t))$ の $t = 0$ における通常の微分係数

$$\left. \frac{df(c(t))}{dt} \right|_{t=0} \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(c(t)) - f(c(0))}{t} \right)$$

を考える. 関数 f に上の微分係数を対応させる対応

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} : f \mapsto \left. \frac{df(c(t))}{dt} \right|_{t=0}$$

を曲線 c の $t = 0$ における速度ベクトルという. 曲線 c の $t = 0$ における速度ベクトルは方向微分である. 実際,

(0) f, g が点 p の開近傍上で定義された C^r 級関数で, p のある十分小さな開近傍上で $f = g$ ならば,

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (f) = \left. \frac{df(c(t))}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{dg(c(t))}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (g)$$

(1) f, g が点 p の開近傍上で定義された C^r 級関数で, $a, b \in \mathbb{R}$ のとき,

$$\begin{aligned} \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (af + bg) &= \left. \frac{d(af(c(t)) + bg(c(t)))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= a \left. \frac{df(c(t))}{dt} \right|_{t=0} + b \left. \frac{dg(c(t))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= a \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (f) + b \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (g) \end{aligned}$$

(2) f, g が点 p の開近傍上で定義された C^r 級関数で, fg をそれらの積とすれば,

$$\begin{aligned} \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (fg) &= \left\{ \frac{df(c(t))}{dt} g(c(t)) + f(c(t)) \frac{dg(c(t))}{dt} \right\}_{t=0} \\ &= \left. \frac{df(c(t))}{dt} \right|_{t=0} g(p) + f(p) \left. \frac{dg(c(t))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (f) g(p) + f(p) \left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} (g) \end{aligned}$$

例 4.3. p を含む座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ を 1 つ固定する. p のまわりで定義された C^r 級関数 f に, p における x_i 方向の偏微分係数を対応させる操作を $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ と書く. すなわち,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p : f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$$

. このとき, $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ は p における方向微分の性質 (0), (1), (2) を満たす.

定義 4.4. 点 $p \in M$ における方向微分全ての集合を

$$D_p^r(M)$$

と表す. $D_p^r(M)$ の 2 元 u, v と実数 a に対して, 和 $u + v$ と実数倍 au を

$$(u + v)(f) = u(f) + v(f)$$

$$au(f) = a(u(f))$$

と定めると, $D_p^r(M)$ は \mathbb{R} 上のベクトル空間となる. ただし, $D_p^r(M)$ のゼロベクトルは任意の f に 0 を対応させる自明な方向微分 $\mathbf{0}$ である.

命題 4.5. ベクトル空間 $D_p^r(M)$ の元として, m 個のベクトル $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$ は 1 次独立である.

証明. 実数 a_1, \dots, a_m に対して $a_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p + \dots + a_m \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p = \mathbf{0}$ ならば, $a_1 = \dots = a_m = 0$ であることを示せばよい. $a_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p + \dots + a_m \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p = \mathbf{0}$ と仮定すると, 点 p のまわりで定義された任意の C^r 級関数 f について $a_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p(f) + \dots + a_m \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p(f) = 0$ が成り立つ. つまり, $a_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(p) + \dots + a_m \frac{\partial f}{\partial x_m}(p) = 0$ となる. f は任意であったから, $f = x_1$ という関数をとってくると,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x_i} &= 0 \quad (i \geq 2) \end{aligned}$$

であるから, 最初の項のみが a_1 となっており, あとは消える. よって $a_1 = 0$ がわかる. 同様に $f = x_2, \dots, x_m$ を次々に代入して, $a_1 = \dots = a_m = 0$ が示される. これで命題が証明された. \square

定義 4.6. m 個のベクトル $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$ の張る $D_p^r(M)$ の部分ベクトル空間を, 点 p における M の接ベクトル空間とよび,

$$T_p(M)$$

という記号で表す. 接ベクトル空間 $T_p(M)$ の元を接ベクトルとよぶ.

命題 4.7. $T_p(M)$ は点 p のまわりの局所座標系のとり方によらず一意に定まる. つまり, 点 p のまわりで (x_1, \dots, x_m) と別の局所座標系 (y_1, \dots, y_m) を選んだとき, 方向微分

$$\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m}\right)_p$$

の張る $D_p^r(M)$ の部分ベクトル空間は,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$$

の張る部分ベクトル空間に一致する.

証明. 点 p のまわりで定義された任意の C^r 級関数 f について, 次の変換公式が成り立つ.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y_j}{\partial x_i}(p) \frac{\partial f}{\partial y_j}(p).$$

方向微分の記号を使ってかくと,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y_j}{\partial x_i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial y_j}\right)_p$$

を得る. 右辺の $\frac{\partial y_j}{\partial x_i}(p)$ を単なる実数と思うと, この式は, 方向微分 $\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$ ($i = 1, \dots, m$) が $\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m}\right)_p$ の 1 次結合で表されるということを意味している. したがって, $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$ は $\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m}\right)_p$ の張るベクトル空間に属している. (x_1, \dots, x_m) と (y_1, \dots, y_m) の役割を入れ換えて同じ議論をすれば, 逆に $\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m}\right)_p$ が $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p$ の張るベクトル空間に属していることも証明される. したがって, 両者の張るベクトル空間は一致する. \square

上の証明中に出てきた基底の変換公式は重要であるから改めて命題の形で述べておく.

命題 4.8. 点 p のまわりに 2 つの局所座標系 $(x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_m)$ があると, それに応じて $T_p(M)$ の基底

$$\left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)_p \right\rangle, \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y_m}\right)_p \right\rangle$$

が定まる. それらの間には次の関係式が成り立つ.

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p = \sum_{j=1}^m \frac{\partial y_j}{\partial x_i}(p) \left(\frac{\partial}{\partial y_j}\right)_p$$

命題 4.9. 曲線 c の $t = 0$ における速度ベクトル $\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}$ は $T_p(M)$ の元, すなわち接ベクトルである.

証明. 点 p のまわりの局所座標系 (x_1, \dots, x_m) を任意に固定する. $\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}$ が $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right), \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)$ という形の方向微分の 1 次結合として表されていることを証明すればよい. p のまわりで定義された任意の C^r 級関数 f をとり, 関数 f と曲線 c を局所座標表示したものがそれぞれ,

$$f(x_1, \dots, x_m), \quad c(t) = (x_1(t), \dots, x_m(t))$$

であったとすると,

$$\begin{aligned} \frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}(f) &= \frac{d}{dt}f(x_1(t), \dots, x_m(t))\Big|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{dx_i}{dt}(0) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) \end{aligned}$$

と計算される (合成関数の微分法). f は任意であったから, 方向微分としての等式

$$\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0} = \sum_{i=1}^m \frac{dx_i}{dt}(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_p$$

を得る. 右辺の $\frac{dx_1}{dt}(0), \dots, \frac{dx_m}{dt}(0)$ を単なる実数と思うと, $\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0}$ が $\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right), \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_m}\right)$ の 1 次結合で表されることがわかる. これで命題が証明された. \square

4.2 C^r 級写像の微分

M, N をそれぞれ m 次元, n 次元の C^r 級多様体, $f: M \rightarrow N$ を C^r 級写像とし ($1 \leq r \leq \infty$), 点 $p \in M$ を通る M 上の C^r 曲線を

$$c: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M, \quad c(0) = p$$

とする. この曲線を写像 f でうつすと, 点 $q = f(p)$ を通る N 上の C^r 曲線

$$f \circ c: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow N, \quad f \circ c(0) = q$$

が得られる. $t = 0$ における曲線 c の速度ベクトル

$$\frac{dc}{dt}\Big|_{t=0} \in T_p(M)$$

と, $t = 0$ における曲線 $f \circ c$ の速度ベクトル

$$\frac{d(f \circ c)}{dt}\Big|_{t=0} \in T_q(M)$$

の関係を調べる.

命題 4.10. $t = 0$ における c と $f \circ c$ の速度ベクトルをそれぞれ

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^m v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_p, \quad \left. \frac{d(f \circ c)}{dt} \right|_{t=0} = \sum_{j=1}^n w_j \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q$$

とおくと、係数 v_1, \dots, v_m と w_1, \dots, w_n の間には次の関係がある。

$$w_j = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(p) v_i \quad (j = 1, \dots, n)$$

またこの式を、縦ベクトルと行列を使って書くと

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$$

となる。

証明. 点 p を含む M の座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ と、 $q = f(p)$ を含む N の座標近傍 $(V; y_1, \dots, y_n)$ を $f(U) \subset V$ となるようにとる。 f を $(U; x_1, \dots, x_m)$ と $(V; y_1, \dots, y_n)$ に関して局所座標表示したものが

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, \dots, x_m) \\ &\vdots \\ y_n &= f_n(x_1, \dots, x_m) \end{aligned}$$

であるとする。右辺の関数は (x_1, \dots, x_m) に関して C^r 級である。パラメータ t の動く範囲 $-\epsilon \leq t\epsilon$ を十分小さくとれば、曲線 c は $(U; x_1, \dots, x_m)$ の中に含まれるとしてよい。局所座標系 (x_1, \dots, x_m) に関する c の局所座標表示を

$$c(t) = (x_1(t), \dots, x_m(t))$$

とすると、曲線 $f \circ c$ の (y_1, \dots, y_n) に関する局所座標表示は

$$\begin{aligned} f \circ c(t) &= (y_1(t), \dots, y_n(t)) \\ &= (f_1(x_1(t), \dots, x_m(t)), \dots, f_n(x_1(t), \dots, x_m(t))) \end{aligned}$$

で与えられる。曲線 c の $t = 0$ における速度ベクトルを

$$\left. \frac{dc}{dt} \right|_{t=0} = v_1 \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)_p + \cdots + v_m \left(\frac{\partial}{\partial x_m} \right)_p$$

とおく. ただし v_1, \dots, v_m は実数である. 命題 4.9 より, $v_i = \frac{dx_i}{dt}(0)$ ($i = 1, \dots, m$) である. 曲線 $f \circ c$ の速度ベクトルを求めると

$$\begin{aligned}
 \left. \frac{f \circ c}{dt} \right|_{t=0} &= \sum_{j=1}^n \frac{dy_j}{dt}(0) \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q \\
 &= \sum_{j=1}^n f_j(x_1(t), \dots, x_m(t))|_{t=0} \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q \\
 &= \sum_{j=1}^n \left\{ \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(p) \frac{dx_i}{dt}(0) \right\} \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q \\
 &= \sum_{j=1}^n \left\{ \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(p) v_i \right\} \left(\frac{\partial}{\partial y_j} \right)_q
 \end{aligned}$$

となる. 速度ベクトル $\left. \frac{f \circ c}{dt} \right|_{t=0}$ の係数を w_1, \dots, w_n とすると,

$$w_j = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(p) v_i \quad (j = 1, \dots, n)$$

を得る. よって命題は証明された. □

5 多様体の次元を調べる方法

5.1 写像の局所的性質

定理 5.1. $(df)_p : T_p(M) \rightarrow T_p(N)$ が線形写像として同型なら, f は p のある開近傍から $f(p)$ のある開近傍への C^r 級微分同相写像である. すなわち, p の開近傍 U と $f(p)$ の開近傍 V が存在して, $f(U) = V$ となり, かつ, $f|_U : U \rightarrow V$ は C^r 級微分同相写像である.

定理 5.2. $f : M \rightarrow N$ を C^r 級写像とする. ある点 $p \in M$ における微分 $(df)_p : T_p(M) \rightarrow T_p(N)$ が上への線形写像なら, 点 p 付近での f の様子は, 射影: $\mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_{m-n+1}, \dots, x_m)$ と同じである. すなわち, p のまわりの局所座標系 (x_1, \dots, x_m) と $f(p)$ のまわりの局所座標系 (y_1, \dots, y_n) をうまく選んで, f の局所座標表示 $(y_1, \dots, y_n) = (c)$ が

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, \dots, x_m) = x_{m-n+1} \\ &\vdots \\ y_n &= f_n(x_1, \dots, x_m) = x_m \end{aligned}$$

であるようにできる.

証明. C^r 級写像 $f : M \rightarrow N$ が与えられており, ある点 $p \in M$ における微分 $(df)_p : T_p(M) \rightarrow T_p(N)$ が上への線形写像であるとする. このとき, $\text{rank}(df)_p = n$ (ただし, $m = \dim M \geq n = \dim N$.) 点 p , 点 $f(p)$ のまわりに, それぞれ座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$, $(V; y_1, \dots, y_n)$ をとり, f を局所座標表示すると

$$(y_1, \dots, y_n) = (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m))$$

ヤコビ行列 $(Jf)_p$ は $(df)_p$ を表す行列で, n 行 m 列である. $\text{rank}(df)_p = n$ であるから, $(Jf)_p$ から n 本の列ベクトルを選んで, 作った正方行列は正則である. 必要なら適当に列を入れ替えて

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_{m-n+1}}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(p) \\ & \cdots & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_{m-n+1}}(p) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(p) \end{pmatrix}$$

とおくと, $\det B \neq 0$ であって,

$$(Jf)_p = \left(\begin{array}{ccc|c} * & \cdots & * & \\ & & & B \\ * & \cdots & * & \end{array} \right)$$

と仮定してよい. p のまわりの座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ から, \mathbb{R}^m への写像 $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ を

$$\varphi(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_{m-n}, f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m))$$

と定義する. ヤコビ行列 $(J\varphi)_p$ は

$$(J\varphi)_p = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ \hline * & \cdots & * & \\ & \cdots & & \\ * & \cdots & * & \end{array} \begin{array}{c} O \\ \\ B \end{array} \right)$$

となり, $\det(J\varphi)_p = \det B \neq 0$ である. したがって, 逆関数の定理 (定理??) により, 点 p を含む U を十分小さくとれば, $\varphi|U: U \rightarrow \varphi(U)$ は C^r 級微分同相写像である. よって, /refprop: cord-nabor condition より, $(U, \varphi|U)$ は p のまわりの新しい C^r 級座標近傍と思える. $(U, \varphi|U)$ の局所座標系を (z_1, \dots, z_m) とすると, 上の φ の定義式から,

$$(z_1, \dots, z_m) = \varphi(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_{m-n}, f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m))$$

を得る. とくに, $(z_{m-n+1}, \dots, z_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m))$ であるから,

$$\begin{aligned} f \circ \varphi(z_1, \dots, z_m) &= f(x_1, \dots, x_m) \\ &= (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m)) \\ &= (z_{m-n+1}, \dots, z_m) \end{aligned}$$

となる. よって, (z_1, \dots, z_m) と (y_1, \dots, y_n) に関する $f: M \rightarrow N$ の点 p のまわりでの局所座標表示

$$(z_1, \dots, z_m) \mapsto (z_{m-n+1}, \dots, z_m) = (y_1, \dots, y_n)$$

である. (z_1, \dots, z_m) を改めて (x_1, \dots, x_m) と書き直せば, 定理 5.2 の主張が得られる. □

定理 5.3. $f: M \rightarrow N$ を C^r 級写像とする. $(df)_p: T_p(M) \rightarrow T_{f(p)}(N)$ が 1 対 1 の線形写像なら, 点 p の付近での f の様子は, 包含写像 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ と同じである. すなわち, p のまわりの局所座標系 (x_1, \dots, x_m) と $f(p)$ のまわりの局所座標系 (y_1, \dots, y_n) をうまく選んで, f の局所座標表示 $(y_1, \dots, y_n) \mapsto$

$(f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_n(x_1, \dots, x_m), 0)$ が,

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, \dots, x_m) = x_1 \\ &\vdots \\ y_m &= f_m(x_1, \dots, x_m) = x_m \\ y_{m+1} &= f_{m+1}(x_1, \dots, x_m) = 0 \\ &\vdots \\ y_n &= f_n(x_1, \dots, x_m) = 0 \end{aligned}$$

であるようにできる.

証明. 問題は局所的であるから $M = \mathbb{R}^m$, $N = \mathbb{R}^n$ と仮定してよい. ($m \leq n$) また, $p = \mathbf{o}$, $f(p) = \mathbf{o}$ としてよい. \mathbb{R}^m の自然な座標 (x_1, \dots, x_m) と, \mathbb{R}^n の自然な座標に関して, 与えられた C^r 級写像 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ を局所座標表示したものを

$$u_1 = f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, u_n = f_n(x_1, \dots, x_m)$$

とする. $(df)_\mathbf{o}: T_\mathbf{o}(\mathbb{R}^m) \rightarrow T_\mathbf{o}(\mathbb{R}^n)$ は 1 対 1 であるから, ヤコビ行列 $(Jf)_\mathbf{o}$ から, 適当な m 行を選び出して作った m 次正方行列は正則である. 必要なら, (u_1, \dots, u_m) の並び方を変えて, $(Jf)_\mathbf{o} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ (A は m 行 m 列の正則行列) と仮定してよい. (x_1, \dots, x_m) に新しく, (x_{m+1}, \dots, x_n) を付け加えて, $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ を構成し, 新しい写像 $F: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ を,

$$\begin{aligned} &F(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) \\ &= (f_1(x_1, \dots, x_m), \dots, f_m(x_1, \dots, x_m), f_{m+1}(x_1, \dots, x_m) + x_{m+1}, \dots, f_n(x_1, \dots, x_m) + x_n) \end{aligned}$$

と定義する. F のヤコビ行列

$$(JF)_\mathbf{o} = \left(\begin{array}{c|ccc} A & & & O \\ \hline & 1 & & \\ B & & \vdots & \\ & & & 1 \end{array} \right)$$

であり, 正則である. 逆関数の定理 5.1 により, $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$ における, \mathbf{o} の近傍 U と, \mathbb{R}^n における \mathbf{o} の近傍 V が存在して, $F|_U: U \rightarrow V$ は C^r 級微分同相写像になる. $\psi = (F|_U)^{-1}: V \rightarrow U$ とおく. (V, ψ) は \mathbf{o} のまわりの \mathbb{R}^n の C^r 級座標近傍と思える. この座標近傍に関する局所座標系を (y_1, \dots, y_n) とし, (x_1, \dots, x_m) と

(y_1, \dots, y_n) に関して, $f: U \cap (\mathbb{R}^m \times \{\mathbf{o}\}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ を局所座標表示すると,

$$\begin{aligned} (y_1, \dots, y_n) &= \psi(f(x_1, \dots, x_m)) \\ &= \psi(F(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)) \\ &= (F|U)^{-1}(F(x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)) \\ &= (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

となる. したがって, 定理 5.3 の主張する通りの局所座標表示が得られた. \square

5.2 C^r 級部分多様体

定義 5.4. n 次元 C^r 級多様体 N の部分集合 L が N の l 次元 C^r 級部分多様体であるとは,

- (1) $l = n$ のとき: L が N の開集合であることである.
- (2) $0 \leq l < n$ のとき: L の任意の点 p に対し, p を含む N の座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_n)$ が存在して,

$$L \cap N = \{(x_1, \dots, x_n) \in U \mid x_{l+1} = \dots = x_n = 0\}$$

が成り立つことである.

命題 5.5. n 次元 C^r 級多様体 N の l 次元 C^r 級部分多様体 L は, それ自身 l 次元 C^r 級多様体である.

証明. (1) $l = n$ のとき, N からの相対位相によって, L は位相空間となり, N の C^r 級座標近傍を $\mathcal{S} = \{U_\alpha, \varphi_\alpha\}_{\alpha \in A}$ とすると, \mathcal{S} を L に制限した $\{U_\alpha \cap L, \varphi_\alpha|_{U_\alpha \cap L}\}_{\alpha \in A}$ は L の C^r 局所座標系になる. よって, L はそれ自身, $l (= n)$ 次元 C^r 級多様体である.

- (2) $0 \leq l < n$ のとき, L には N からの相対位相を入れる. N がハウスドルフ空間であるから L もそうである.

L の任意の点 p に対し, p を含む N の局所座標系 $(U; x_1, \dots, x_n)$ で定義 5.4 の条件を満たすものを選び, $(U_p; x_1^p, \dots, x_n^p)$ とする. $V_p = L \cap U_p$ とおくと, V_p は L の開集合である. V_p 上の U_p の局所座標系 (x_1^p, \dots, x_n^p) の x_1^p から x_l^p までを制限したもの $(V_p; x_1^p, \dots, x_l^p)$ を考える.

$\{(V_p; x_1^p, \dots, x_l^p)\}_{p \in L}$ が L を被覆することは明らかである.

V_p と V_q が交わるとする. 対応する $(U_p; x_1^p, \dots, x_n^p)$ と $(U_q; x_1^q, \dots, x_n^q)$ は, N の適当な座標近傍 $(U_\alpha; x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha)$, $(U_\beta; x_1^\beta, \dots, x_n^\beta)$ である. この間の座標変換はある C^r 級関数 f を用いて,

$$(x_1^\beta, \dots, x_n^\beta) = (f_1(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha), \dots, f_n(x_1^\alpha, \dots, x_n^\alpha))$$

と書ける. $V_p \cap V_q$ 上では, $x_{l+1}^\alpha = x_n^\alpha = 0$, $x_{l+1}^\beta = x_n^\beta = 0$ が成り立つので, $V_p \cap V_q$ 上では

$$\begin{aligned} x_1^\beta &= f_1(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ x_l^\beta &= f_l(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0) \\ 0 &= f_{l+1}(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ 0 &= f_n(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

となっている. 改めて関数 g を

$$\begin{aligned} g(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha) &= (g_1(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha), \dots, g_l(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha)) \\ &= (f_1(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0), \dots, f_l(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha, 0, \dots, 0)) \end{aligned}$$

と定義すると, この関数は C^r 級である. そして,

$$(x_1^\beta, \dots, x_l^\beta) = g(x_1^\alpha, \dots, x_l^\alpha)$$

が $(V_p; x_1^p, \dots, x_l^p)$ から $(V_q; x_1^q, \dots, x_l^q)$ の座標変換を与えている.

ゆえに, $\{(V_p; x_1^p, \dots, x_l^p)\}_{p \in L}$ は L の C^r 級座標近傍になっている.

以上より, L は l 次元 C^r 級多様体である.

□

定理 5.6. M, N を m 次元, n 次元の C^r 級多様体, $f: M \rightarrow N$ を C^r 級写像とする. N のある点 q について, $f(p) = q$ となる M の各点 p が常に $\text{rank}(Jf)_p = n$ を満たすとき, 逆像 $f^{-1}(q)$ は $(m - n)$ 次元 C^r 級多様体である.

証明. 定義 5.4, 命題 5.5 より, 次のことを証明すればよい.

$q \in N$ の逆像 $f^{-1}(q)$ に属する任意の点 p に対し, p のまわりの座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ が存在して,

$$f^{-1}(q) \cap U = \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid x_{m-n+1} = \dots = x_m = 0\}$$

が成り立つ.

今, $f(p) = q$ を満たす $p \in M$ について, 常に $\text{rank}(Jf)_p = n$ であるから, $(df)_p$ は上への写像である. よって, 定理 5.2 より, p のまわりの座標近傍 $(U; x_1, \dots, x_m)$ と $q (= f(p))$ のまわりの座標近傍 $(V; y_1, \dots, y_n)$ が存在して, $f|U: U \rightarrow V$ は

$$(y_1, \dots, y_n) = f(x_1, \dots, x_m) = (x_{m-n+1}, \dots, x_m)$$

と座標表示される.

$(U; x_1, \dots, x_m)$ は任意にとってきた $(V; y_1, \dots, y_n)$ に応じて選べるから, $(V; y_1, \dots, y_n)$ は点 q で $y_1 = \dots = y_n = 0$ となるようにとっておくと,

$$\begin{aligned} f^{-1}(q) \cap U &= \{p \in U \mid f(p) = q\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid f(x_1, \dots, x_m) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid (x_{m-n+1}, \dots, x_m) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_m) \in U \mid x_{m-n+1} = \dots = x_m = 0\} \end{aligned}$$

となり, 条件を満たす U が存在することがわかる. これで定理 5.6 が証明できた. \square

5.3 多様体の次元の具体的な計算

6 おわりに

参考文献

- [1] 松本幸夫, [第 30 版] 多様体の基礎, 東京大学出版会, 2018.
- [2] 【論文の場合】 著者名, タイトル, 雑誌名, 巻・号, 出版年度, 頁.
- [3] 【Web ページの場合】 タイトル, ページ制作者 (機関) 等, URL: <http://www.shibaura-it.ac.jp/>, 最終アクセス日時: 2021/12/28 16:33.